



ADAMA

NIMROD® QUATTRO

Para un plan antioidio realmente eficaz en viña

Único fungicida perteneciente a la familia de los pirimidoles

Modo de acción único

Evita la aparición de resistencias y mejora el efecto de los IBS y estrobilurinas.

Nimrod Quattro contiene bupirimato, una materia activa diferente a los triazoles y estrobilurinas. Su modo de acción único, inhibe la síntesis de ácidos nucleicos del hongo impidiendo así su desarrollo.

Nimrod Quattro rompe con la inercia de otros tratamientos y ayuda a que mejore el efecto de dichos tratamientos antioidio.


	Nimrod Quattro	Estrobilurinas	IBS* Pirimidinas, imidazoles, triazoles...
Modo de acción	Síntesis ácidos nucleicos	Respiración	Biosíntesis de esteroles en membranas
Código FRAC	4	11	3

Actúa impidiendo el desarrollo del hongo

En caso de infección, la aplicación de Nimrod Quattro detiene el desarrollo del hongo, evitando una nueva producción de esporas y, por tanto, la contaminación secundaria.


Este bloqueo de la germinación de las esporas controla el oidio establecido y frena la aparición de resistencias.

ANTIGERMINACIÓN DE ESPORAS




No se produce la contaminación

INHIBICIÓN DE APRESORIOS



Impide que se establezca el oidio

INHIBICIÓN DE HAUSTORIOS



Impide la progresión del hongo



Su sistemía ascendente permite que Nimrod Quattro llegue a los puntos de crecimiento.

Es absorbido llevando su acción a todas las partes de la planta.



Nimrod Quattro crea un efecto vapor alrededor de la hoja, penetrando incluso en las zonas más inaccesibles.



Por su movimiento traslaminar hace que llegue hasta al envés protegiendo toda la hoja.

Quattro estrategias de aplicación de NIMROD

quattro 1

DURANTE EL INICIO DEL CULTIVO



Impidiendo el establecimiento del Oídio y su posterior avance.

quattro 2

ALTERNÁNDOLO con otras materias activas



No presenta resistencia cruzada con IBS ni con Estrobilurinas.

quattro 3

MEZCLÁNDOLO con otras materias activas



Se consigue un plus de eficacia cuando es necesario. Su modo de acción se complementa con IBS y Estrobilurinas.

quattro 4

AL FINAL DEL CULTIVO



Gracias a sus corto Plazo de Seguridad en viña (15 días)



NIMROD QUATTRO se recomienda aplicar especialmente en los primeros estadios sensibles de la viña: Brotes de 10-20 cm hasta la Floración.

Se recomienda una dosis de 100 cc/HA, con un consumo por hectárea entre 300 y 600 cc, según estado de la viña.

Los tratamientos deben adaptarse a la incidencia del Oídio (en la campaña anterior), a la sensibilidad varietal al oídio (Chardonnay, Cariñena...) y a las condiciones climáticas presentes.