

# EMBRELIA®

Fungicida indicado para combatir las principales enfermedades de frutales con alta eficacia tanto en frutos como en hojas.

## Cultivos

Manzano, peral,  
melocotonero, nectarino...  
(para otros cultivos ver interior de etiqueta).

---

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.  
Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.  
Agítese antes de usar.

---

**FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN**  
Ver marcado impreso

---



## 5 Litros



**FUNGICIDA**  
Preventivo - Curativo

# ADAMA

# EMBRELIA®



## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### COMPOSICIÓN

Isoirazam 100 g/l (10% p/v) +  
Difenoconazol 40 g/l (4% p/v)

H318 - Provoca lesiones oculares graves • H332 - Nocivo en caso de inhalación • H351 - Se sospecha que provoca cáncer • H361d - Se sospecha que daña al feto • H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos • EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona y alcohol graso etoxilado de cadena larga (CAS 146340-16-1). Puede provocar una reacción alérgica • P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad • P261 - Evitar respirar la niebla • P273 - Evitar su liberación al medio ambiente • P280 - Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección • P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración • P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado • P391 - Recoger el vertido. El preparado no se usará en combinación con otros productos.

### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

#### Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase • **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

#### Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

#### Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático

### EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase a la etiqueta.

### CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

#### Mitigación de riesgos en la manipulación

**Seguridad del aplicador:** Durante la mezcla/carga y aplicación se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

**Seguridad del trabajador:** Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m<sup>2</sup>) o de algodón y poliéster (> 200 g/m<sup>2</sup>) y calzado resistente).

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:** Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas • En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación • Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación • No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización • Se limita el número de aplicaciones a una única aplicación y no se superará la dosis de 1,2 l p/ha • El trabajador respetará un plazo de reentrada (PR) de 41 días para tareas de duración superior a 2 horas

#### Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 m de los cuales 20 m de cubierta vegetal o de 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% hasta las masas de agua superficial • Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

**ATENCIÓN**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n° ES-00549

ADAMA Agriculture España, S.A.  
C/Príncipe de Vergara, 110 - 5ª planta  
28002 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

# EMBRELIA®



## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### COMPOSICIÓN

Isopirazam 100 g/l (10% p/v) +  
Difenoconazol 40 g/l (4% p/v)

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

### NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

### GESTIÓN DE ENVASES



Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n°: ES-00549

ADAMA Agriculture España, S.A.  
C/ Príncipe de Vergara, 110 – 5ª planta  
28002 Madrid  
Tel.: 91 585 23 80

Embrelia es una marca registrada  
por una compañía del grupo  
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

# EMBRELIA®



## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### COMPOSICIÓN

Isopirazam 100 g/l (10% p/v) +  
Difenoconazol 40 g/l (4% p/v)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

### CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

#### Mitigación de riesgos en la manipulación

**Seguridad del aplicador:** Durante la mezcla/carga y aplicación se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

**Seguridad del trabajador:** Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m<sup>2</sup>) o de algodón y poliéster (> 200 g/m<sup>2</sup>) y calzado resistente).

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:** Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas • En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación • Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación • No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización • Se limita el número de aplicaciones a una única aplicación y no se superará la dosis de 1,2 l p/ha • El trabajador respetará un plazo de reentrada (PR) de 41 días para tareas de duración superior a 2 horas.

#### Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 m de las cuales 20 m de cubierta vegetal o de 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% hasta las masas de agua superficial • Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n° ES-00549

ADAMA Agriculture España, S.A.  
C/ Príncipe de Vergara, 110 – 5ª planta  
28002 Madrid – Tel.: 91 585 23 80

**ATENCIÓN**

EMBRILIA®



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Isopirazam 100 g/l (10% p/v) +  
Difenoconazol 40 g/l (4% p/v)

OBSERVACIONES

Se aconseja el uso del producto en un programa de defensa con otros productos que contengan diferentes modos de acción. Para una correcta prevención de la resistencia se aconseja seguir las directrices específicas de la FRAC.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO 7 | 3 FUNGICIDA

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD

Fungicida preventivo y curativo con actividad de contacto, translaminar y sistémico.

De uso profesional para aplicación mediante pulverización foliar.

| CULTIVO                                         | PLAGA                                                                                                                                       | DOSIS<br>ml/Hl | CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS                                                                                                          | P.S.<br>días |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manzano, membrillero, nashi y níspero del Japón | Oidio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ) y <i>Venturia inaequalis</i>                                                                       | 100            | Realizar una única aplicación, de BBCH 69 a 85, empleando un volumen de caldo de 400-1200 l/ha sin superar la dosis máxima de 1,2 l/ha | 41           |
| Peral                                           | Oidio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ) y <i>Venturia pyrina</i>                                                                           |                |                                                                                                                                        |              |
| Melocotonero y nectarino                        | Oidio ( <i>Sphaeroteca pannosa</i> ) y <i>Monilia</i> (incluye <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fruticola</i> y <i>Monilia fructigena</i> ) |                | Realizar una única aplicación, de BBCH 71 a 85, empleando un volumen de caldo de 400-1200 l/ha sin superar la dosis máxima de 1,2 l/ha |              |