

KAMPAI®

Doble eficacia. Mayor control.



Controla más de 25 especies de malas hierbas de hoja ancha y hoja estrecha. Se puede aplicar desde las 3 hojas hasta la hoja bandera

Escuchamos ▶ Aprendemos ▶ Respondemos



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Control avanzado de las malas hierbas

Herbicida sistémico de postemergencia cuya acción es principalmente foliar, KAMPAI® se absorbe rápidamente y se traslada a las partes en crecimiento de las malas hierbas. La decoloración, clorosis y finalmente la muerte de la planta se produce entre 2 y 3 semanas tras la aplicación. Todos los cultivos probados podrían entrar en una rotación típica del cereal.

KAMPAI®
ES-01209

COMPOSICIÓN:

Pinoxaden 30 g/L
Florasulam 1.75 g/L
Fluroxipir-meptyl 75 g/L
(Fluroxipir 52.5)
Cloquintocet-mexyl 7.5 g/L

CULTIVOS

Cebada,
centeno,
trigo

OBJETIVO

Malas hierbas de
hoja ancha y hoja
estrecha

MOMENTO DE APLICACIÓN RECOMENDADO


FIN DE AHIJADO

KAMPAI® BBCH 13-37

CONSEJOS RÁPIDOS

- Para malas hierbas como *VIOAR*, *FUMOF*, *CHEAL*, *LAMAM*, se recomienda Trimmer SX.
- Aplicar antes del encañado (BBCH 29) para obtener resultados óptimos.
- Desde BBCH30, la dosis recomendada es de 2.0 l/ha.
- Mejores resultados con crecimiento activo de la planta y condiciones ambientales adecuadas.
- La eficacia puede verse afectada sobre biotipos con resistencia a alguna de las materias activas del producto, debido a su uso repetitivo, especialmente con malas hierbas de hoja estrecha como el vallico. Consulte la etiqueta o a su asesor técnico sobre casos de resistencia. ADAMA no se responsabiliza de fallos por resistencias.

EFICACIA HOJA ESTRECHA



EFICACIA HOJA ANCHA

