



SONAVIO®



**La PIEZA CLAVE
para el control de malas hierbas
en hortícolas al aire libre**



HERBICIDA

ADAMA.COM

SONAVIO®

SONAVIO® es un herbicida residual y de contacto con control preemergente y postemergente de malas hierbas en estados iniciales, que proporciona un alto nivel de control de malas hierbas frecuentes en hortícolas de aire libre.

Actúa sinérgicamente en mezcla con otros herbicidas registrados y mantiene una alta persistencia debido a la película que forma en el suelo.



DOBLE ACCIÓN



CONTACTO

Inhibe la fotosíntesis de malas hierbas jóvenes ya germinadas en el momento de la aplicación.

REMANENCIA

A través de la película que forma en la superficie del suelo, inhibe el desarrollo de las malas hierbas germinadas después del tratamiento.

Composición

Bifenox 480 g/l (40,7% p/p)

Formulación

Suspensión Concentrada (SC)

Nº de R.O.P.M.F.

ES-01867

Clasificación según HRAC


Grupo 14




Veronica hederifolia



Fumaria officinalis




Fallopia convolvulus



Papaver rhoeas



Amaranthus spp.



Chenopodium spp.

Momento de aplicación


Preemergencia

1 aplicación
0,75 - 1 l/ha



Postemergencia


2 aplicaciones
BBCH 13-14
a 0,5 l/ha



SONAVIO® es un herbicida exclusivo y único en el mercado para la aplicación en pre y postemergencia en el cultivo del ajo, eficaz sobre diversas dicotiledóneas difíciles como *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Chenopodium* spp. (Cenizo), *Fallopia convolvulus* (Albolol), *Fumaria officinalis* (Palomilla), *Galium aparine* (Amor del hortelano), *Papaver roheas* (Amapola), *Polygonum aviculare* (Centinodia), *Veronica hederifolia*, *Salsola Kali* (Cardo ruso), *Senecio vulgaris* (Hierba cana) y *Urtica urens* (Ortiga).

SONAVIO® es un herbicida fácil de usar gracias a la alta compatibilidad y complementariedad con múltiples materias activas.

Se recomienda el uso en un programa de control de preemergencia junto con BASTOS® y ORDAGO® CAPS.



RÁPIDO

Elimina malas hierbas en estados iniciales en 5-7 días.

REMANENTE

Controla nascencias* hasta 60 días después del tratamiento.

* MH de su espectro de control

SINÉRGICO

Actúa sinérgicamente incrementando la eficacia de las materias activas por separado.

Eficacia del tratamiento con SONAVIO® 1L/ha + ORDAGO® CAPS 2,5 L/ha + BASTOS® 3 L/ha



APLICACIONES AUTORIZADAS

Cultivo	Dosis (L/ha)	Condicionamientos específicos
Ajo	0,75 - 1	Uso menor por jerarquía. Realizar una única aplicación en post-trasplante de los bulbos, preemergencia de las plantas (BBCH 00), con dosis de 0,75-1 l/ha. Alternativamente, se pueden realizar 2 aplicaciones de 0,5 l/ha con intervalo de 7 días entre ellas, en BBCH 13-14. Sólo cuando se utilizan bulbos de siembra.
Alcachofa	0,80 - 1	Uso menor por jerarquía. Aplicar bien en pre-trasplante (BBCH 00) o bien durante el periodo de reposo de las plantas (BBCH 90).
Canónigo	0,80 - 1	Uso menor por jerarquía. Aplicar en pre-trasplante, al menos 5-7 días antes del trasplante (BBCH 00).
Cebolla	0,75 - 1	Realizar una única aplicación en post-trasplante de los bulbos, pre-emergencia de las plantas (BBCH 00), con dosis de 0,75-1 l/ha. Alternativamente, se pueden realizar 2 aplicaciones de 0,5 l/ha con intervalo de 7 días entre ellas, en BBCH 13-14. Sólo cuando se utilizan bulbos de siembra.
Chalote	0,75 - 1	Uso menor por jerarquía. Realizar una única aplicación en post-trasplante de los bulbos, preemergencia de las plantas (BBCH 00), con dosis de 0,75-1 l/ha. Alternativamente, se pueden realizar 2 aplicaciones de 0,5 l/ha con intervalo de 7 días entre ellas, en BBCH 13-14. Sólo cuando se utilizan bulbos de siembra.
Escarola	0,80 - 1	Uso menor por jerarquía. Aplicar en pre-trasplante, al menos 5-7 días antes del trasplante (BBCH 00).
Lechuga	0,80 - 1	Aplicar en pre-trasplante, al menos 5-7 días antes del trasplante (BBCH 00).
Tomate	0,80 - 1	Aplicar en pre-trasplante, al menos 5 días antes del trasplante (BBCH 00).
Zanahoria	0,80 - 1	Aplicar durante BBCH 13-14.

En todos los cultivos realizar una única aplicación contra dicotiledóneas anuales a la dosis indicada, con un volumen de caldo de 100-400 L/ha. Plazo de seguridad: no procede.

- En el momento de aplicación debe haber buenas condiciones de humedad que permitan la incorporación del producto.
- SONAVIO® puede causar manchas en las hojas bajas del cultivo. Dada la baja movilidad en la planta, los efectos observados han sido transitorios y no han tenido efecto en la calidad ni en el rendimiento del cultivo.
- No aplicar SONAVIO® si se esperan lluvias fuertes y localizadas.
- Las lluvias fuertes y localizadas, hasta 60 días después de la aplicación, pueden causar fitotoxicidad al cultivo en forma de decoloración, necrosis ocasional y/o pérdida de vigor.
- SONAVIO® forma una película en el suelo. Su alteración (por ejemplo, a través de labores del suelo después de la aplicación) provocará una reducción significativa de la eficacia.



Escuchamos • Aprendemos • Respondemos

TUS ENVASES IMPORTAN:

- Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- Enjuaga enérgicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
- En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.
- No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.



Antes de utilizar el producto lea detenidamente su etiqueta.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El contenido del folleto tiene solamente fines informativos y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en las respectivas etiquetas.

La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.