

Más ventajas, más tranquilidad.



Programa OTOÑO + PRIMAVERA: control de más de 30 especies problemáticas en olivar, incluidas gramíneas resistentes al glifosato.

	OTOÑO	RECOLECCIÓN	TRAS RECOLECCIÓN
Lluvias tempranas o antes de recolección	ANIBAL® + Flazasulfuron		AGIL®
Lluvias tardías o después de recolección			ANIBAL® + AGIL®

Ante la presencia de hoja ancha reforzar con HERBOLEX® y/o DISCOVERY®



Fácil para el cultivo, fácil para ti.

Siguiendo unas sencillas pautas, podrás mantener tu olivar libre de malas hierbas y despreocuparte hasta la recogida del fruto:



Es recomendable aplicar ANIBAL® en fase de **pre-emergencia** o post-emergencia precoz, cuidando que el suelo tenga unas condiciones de humedad suficientes para que el herbicida se pueda incorporar.



Para obtener los **mejores resultados** utiliza una dosis de 3,0-4,5 l/ha en función del tipo de suelo y de las malas hierbas a controlar.



Efectuando **una sola aplicación por campaña** podrás controlar la aparición de malas hierbas, facilitando el proceso de recolección.



← Conoce más
sobre el producto.

TUS ENVASES IMPORTAN:

- Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- Enjuaga energicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
- En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.
- No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.



Utilice los productos fitosanitarios con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de utilizarlo, prestando especial atención a las instrucciones adicionales, los pictogramas y las indicaciones de peligro para un uso seguro del producto.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. El contenido del folleto tiene solamente fines informativos y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en las respectivas etiquetas. La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.

ADAMA Agriculture España, S.A. | C/ Ramírez de Arellano N° 29 - 2ª | 28043 Madrid | España | adama.com



ANIBAL®



**La tranquilidad de tener
las malas hierbas
bajo control**

Controla Vallico y otras 25 malas hierbas hasta 120 días después de la aplicación.



HERBICIDA

Escuchamos • Aprendemos • Respondemos

ADAMA.COM

RB4741026

Tenemos la fórmula para que disfrutes tu cosecha.

Sabemos que tus cultivos requieren cuidado, tiempo y dedicación; pero nosotros creemos que **tú también mereces disfrutar del tiempo que tanto necesitas:** para pasear, ver todas las temporadas de tu serie favorita o cumplir tu promesa de ir al gimnasio todos los días.

Por eso te traemos la solución para tener las malas hierbas bajo control y que tú estés tranquilo.

ANIBAL® es un herbicida indicado para controlar la aparición de malas hierbas en tu olivar. Aplicado en fase de pre-emergencia o post-emergencia precoz, evita la competencia de malas hierbas con tu cultivo y facilita la recolección.

NI MODA, NI MILAGROS. Estrategia ÚNICA para olivar.

ANIBAL® representa un pilar fundamental de una propuesta de manejo de malas hierbas que posiciona a ADAMA como empresa impulsora y referente en el desarrollo de UNA ESTRATEGIA ÚNICA, **NI MODA NI MILAGROS**, para el desafío del olivar actual.

ANIBAL® es el principal herbicida de remanencia para mezclar con otras materias activas remanentes, registradas en el olivar, para tener más de un **90% de eficacia y control durante + 120 días** saltándote la primavera.

ANIBAL® siempre PRIMERO en tu estrategia de control de malas hierbas difíciles.



Más sobre nuestra estrategia
NI MODA, NI MILAGROS

Eficacia demostrada en olivar.

Con ANIBAL® las malas hierbas no serán un problema, porque **tendrás bajo control la aparición de todas estas especies.**

- Eficacia excelente
- Eficacia buena
- Eficacia moderada



Mala hierba	Eficacia Anibal	
	(3,75 L/ha)	(4,5 L/ha)
Anacyclus sp., ANYSS		
Anagallis arvensis, ANGAR		
Anchusa azurea, ANCIT		
Borago officinalis, BOROF		
Calendula arvensis, CLDAR		
Carduus nutans, CRUNU		
Cerastium glomeratum, CERGL		
Chenopodium murale, CHEMU		
Cnicus benedictus, CXDBE		
Diplotaxis sp., DIPSS		
Erigeron canadensis, ERICA		
Erodium ciconium, EROCC		
Erodium sp., EROSS		
Fumaria officinalis, FUMOF		
Galium sp., GALSS		
Lactuca serriola, LACSE		
Lactuca sp., LACSS		
Lamium amplexicaule, LAMAM		
Linaria sp., LINSS		
Lolium rigidum, LOLRI		
Malva sp., MALSS		
Matricaria sp., MATSS		
Mercurialis annua, MERAN		
Mibora minima, MIPMI		
Myosotis arvensis, MYOAR		
Papaver rhoeas, PAPRH		
Poa annua, POAAN		
Scandix pecten-v. macro., SCAPM		
Senecio vulgaris, SENVU		
Silybum marianum, SLYMA		
Sinapsis alba, SINAL		
Sinapsis arvensis, SINAR		
Sonchus sp., SONSS		
Stellaria media, STEME		
Urtica urens, URTUR		
Veronica hederifolia, VERHE		