

Ingrediente Activo	Azoxistrobin 20% + Protiokonazol 15%
Formulación	SC
Vol. Caldo	100-400 l/ha
Envase	5 litros
Nº de registro	ES-01717

Cultivo	Dosis	Enfermedades registradas
Cebada	0,8-1	Helminthosporium - <i>Pyrenophora teres</i> Oídio - <i>Blumeria graminis</i> Rincosporium - <i>Rhynchosporium secalis</i> Royas - <i>Puccinia spp</i>
Centeno	0,8-1	Rincosporium - <i>Rhynchosporium secalis</i> Royas - <i>Puccinia spp</i>
Trigo	0,8-1	Helminthosporium - <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> Oídio - <i>Blumeria graminis</i> Fusariosis - <i>Fusarium spp</i> <i>Microdochium spp</i> Septoriosis - <i>Septoria spp</i> Royas - <i>Puccinia spp</i>
Triticale	0,8-1	Oídio - <i>Blumeria graminis</i> Septoriosis - <i>Septoria spp</i> Royas - <i>Puccinia spp</i>



RÁPIDO

En menos de 1h
dentro de la planta



VERSÁTIL

Más de 80 escenarios
Mayor espectro
de control



ROBUSTO

Eficacia mejorada
en un 11%

TUS ENVASES IMPORTAN:

- ④ Almacena los envases en un lugar cubierto y seco.
- ④ Enjuaga enérgicamente tres veces cada envase utilizado, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
- ④ En caso de bolsas y sacos, sepáralos de las garrafas y botes.
- ④ Deposita posteriormente el envase en un punto de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.
- ④ No olvides pedir el albarán de entrega en tu punto de recogida.

Utilice los productos fitosanitarios con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso, prestando especial atención a las instrucciones adicionales, los pictogramas y las indicaciones de peligro para un uso seguro del producto.

El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos actualizados a **octubre de 2026** y en ningún caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en la etiqueta del producto.

La información contenida en la etiqueta prevalecerá sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia. La imagen de portada se trata de una creatividad.

ADAMA.COM
Adama Agriculture España, S.A.
C. de Ramírez de Arellano, 29, piso 2, 28043 Madrid



FUNGICIDA

ADAMA.COM

Ahora SORATEL[®] es MAX



Rápido



Versátil



Robusto

La rapidez de siempre.
Más potente que nunca.

TAP4731026

¿QUÉ ES SORATEL® MAX?

SORATEL® MAX es un fungicida de amplio espectro diseñado para el control de las principales enfermedades de los cereales.



MAX RÁPIDO

En menos de 1h dentro de la planta

SORATEL® MAX presenta un triple modo de acción: **contacto, sistémico y translaminar**, que combina acción preventiva y curativa para ofrecer una mayor rapidez y un control superior.

Contacto

Protege la superficie de la hoja e impide la germinación de las esporas.



Translaminar

Penetra en el tejido de la hoja y se redistribuye en ambas caras.

Sistémico

Se mueve por el xilema, desde la base hacia la parte aérea, protegiendo el crecimiento nuevo.



Mayor capacidad de contener enfermedades progresivas y explosivas.



Mayor protección del tejido joven.



MAX VERSÁTIL

Más de 80 escenarios
Más espectro de control

Gracias a su amplio espectro de control, SORATEL® MAX actúa frente a un mayor número de enfermedades, adaptándose a más situaciones.

	SORATEL®		SORATEL® MAX
CEBADA		Helminthosporiosis	
		Oídio	
		Rincosporiosis	
		Ramularia	
		Roya parda	
CENTENO		Roya amarilla	
		Rincosporiosis	
		Septoria	
		Roya parda	
TRIGO		Roya amarilla	
		Helminthosporiosis	
		Oídio	
		Fusariosis	
		Microdochium	
		Septoria	
TRITICALE		Roya parda	
		Roya amarilla	
		Oídio	
		Septoria	
		Roya parda	
		Roya amarilla	




MAX ROBUSTO


Eficacia mejorada en un 11%

Más eficacia. Más consistencia.
SORATEL® MAX mejora la eficacia media un 11% y reduce la variabilidad entre aplicaciones, ofreciendo un control más consistente y fiable.

Eficacia media a la dosis máxima de SORATEL® MAX y SORATEL® para todas las enfermedades evaluadas en España



TESTIGO



SORATEL® MAX