



ADAMA

# Coltrane®



**SNAŽNO I  
DUGOTRAJNO**

Aktivne materije:  
dikamba 120 g/l  
mezotrión 50 g/l



HERBICID

Listen • Learn • Deliver

ADAMA.COM

# COLTRANE®

Coltrane® je selektivni, sistemični herbicid.

Primenjuje se u kukuruzu za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova uključujući i one najtvrdokornije.

HERBICID

## Aktivna materija

dikamba 120 g/l  
(derivati benzoeve kiseline,  
HRAC grupa: 0)  
mezotrión 50 g/l  
(triketon, HRAC grupa: F2)

## Formulacija

koncentrovana suspenzija - SC

## Karenca

obezbeđena vremenom  
primene za kukuruz

## Proizvođač

Syngenta Crop Protection AG,  
Švajcarska




## JEDINSTVENA KOMBINACIJA PROVERENIH I POTVRĐENIH AKTIVNIH MATERIJA


Coltrane® na korove ispoljava dvostruko delovanje, folijarno

(preko lista) i rezidualno delovanje (preko zemljišta).

Coltrane® rešava sve one korove koji su u vreme prskanja prisutni u usevu kukuruza i istovremeno svojim proženim delovanjem sprečava nicanje novih korova 4 do 6 nedelja nakon tretmana.




## FLEKSIBILAN U VREMENU PRIMENE



Coltrane® u svom sastavu ima dve visokoefikasne aktivne materije, koje su veoma kompatibilne, međusobno se dopunjaju, čime obezbeđuju herbicidu veoma širok spektar delovanja. Preparat predstavlja rešenje za sve ekonomski značajne i ključne korove u usevu kukuruza.

**Mezotrión** dobro suzbija: lipiku, štir, pepeljugu običnu, pepeljugu sročislju, palamidu, čičak, tatulu, gorušicu, pomoćnicu, samonikli suncokret....

**Dikamba** dobro suzbija: ambroziju, njivski vijušac, sve divlje paprika (dvornike), poponac, palamidu, lubeničarku, samonikli suncokret, štireve, pepeljuge, pomoćnicu, čičak...



Ukoliko dođe do preoravljivanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, može se sejati suncokret, dok se ne preporučuje setva šećerne repe, spanaća, graška i pasulja.

## Primena:

### KUKURUZ

- Jednokratna primena u količini od 2 l/ha kada je KUKURUZ u fazi od 2 do 9 listova.

- Dvokratna primena prvo tretiranje obaviti u količini od 1,2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2 do 6 listova, a drugo tretiranje u količini od 0,8 l/ha u fazi od 6 do 9 listova kukuruza.

HERBICID

## SPEKTAR DELOVANJA


- teofrastova lipica  
(*Abutilon theophrasti*)
- štir  
(*Amaranthus retroflexus*)
- divlji broć  
(*Gallium sp.*)
- troskot  
(*Polygonum aviculare*)
- njivski vijušac  
(*Polygonum convolvulus*)
- obični dvornik  
(*Polygonum persicaria*)
- divlja rotkva  
(*Raphanus raphanistrum*)
- kostrиш  
(*Senecio vulgaris*)
- pomoćnica  
(*Solanum nigrum*)
- obična gorčika  
(*Sonchus oleraceus*)
- čičak  
(*Xanthium sp.*)
- ladolež  
(*Calystegia sepium*)

## PREDNOSTI PREPARATA COLTRANE®

- Fleksibilnost u primeni do 9 listova kukuruza
- Dvostruki mehanizam delovanja, dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe herbicida povećavaju spektar delovanja i smanjuju mogućnost pojave rezistentnosti
- Folijarno delovanje preko lista i produženo zemljjišno delovanje na korove

**Coltrane®** je veoma kompatibilan sa herbicidom **Nicogan®**, namenjenim za suzbijanje uskolisnih korova (sirak rizomski). Kombinacija **Coltrane® + Nicogan®** je kompletno rešenje za sve korove i pravi izbor za Vaš usev.

**Coltrane® 2 l/ha + Nicogan® 1,2 l/ha**



**KONTROLNA**



**REZULTATI OGLEDA SA HERBICIDIMA, 2019. (25 dana nakon aplikacije)**

ADAMA SRB DOO · BULEVAR MIHAILA PUPINA 6 · PC UŠĆE, X SPRAT

11070 BEOGRAD, SRBIJA