

ЕВЕНТУС®

Селективни фолијарни хербицид за сузбијање широколисних и травних корова у усеву соје.

АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ: Бентазон 480 g/l
Кломазон 50 g/l

Формулација: Микро емулзија - МЕ
Класификација резистентности (HRAC): 13 (F3)

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!

Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину!

Произвођач: Adama Agan Ltd., P.O.Box 262, Ashdod 77102, Израел

Заступник: Adama SRB doo Beograd, Булевар Михаила Пупина 6, ПЦ Ушће, X спрат, 11070 Нови Београд, тел. +381 11 785 8500, преко Adama Agricultural Solutions Ltd, Израел

Решење број:

Обавештења о опасности (H): Штетно ако се прогута. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Доводи до јаке иритацје ока. Веома токсично по живи свет у води са дуготрцијним последицама.

Обавештења о мерама предострожности (P): Носити заштитне рукавице/ одећу/ наочаре / заштиту за лице. Не јести, не пушити и не пити приликом руковања овим производом.

АКО СЕ ПРОГУТА: Испрати уста. Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара/.../ ако се осећате лоше.


АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде/... **АКО ДОСПЕ У ОЧИ:** Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.

Одлагање садржаја амбалаже на место намењено за прикупљање ризичног или опасног отпада у складу са националним прописима.

Додатне ознаке безбедности: Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу. Због заштите акватичних организама треба поштовати зоне безбедности од 20 м до водене површине.

Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. Рок употребе: 3 године

Пажња



Примена:

ЕВЕНТУС® је селективни хербицид намењен за сузбијање широколисних и травних корова у усеву СОЈЕ:

Примењује се фолијарно једнократно и двократно

Спектар деловања	Јенократна примена	Двократна примена
Добро сузбија	у количини 2 l/ha Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), <i>штур</i> бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>), Штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>), пепељуга (<i>Chenopodium album</i>) пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), дворник велики (<i>Polygonum lapathifolium</i>), чистац једногодишњи (<i>Stachys annua</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>). у количини 3 l/ha Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), <i>штур</i> бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>), Штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>),	у количини 1 l/ha+1 l/ha Штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>), пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), дворник птчији (<i>Polygonum aviculare</i>), дворник велики (<i>Polygonum lapathifolium</i>), чистац једногодишњи (<i>Stachys annua</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>) у количини 1 l/ha+1,5 l/ha Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), <i>штур</i> бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>), Штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>), пепељуга (<i>Chenopodium album</i>) пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), дворник велики (<i>Polygonum lapathifolium</i>), чистац једногодишњи (<i>Stachys annua</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>). у количини 1,5 l/ha+1,5 l/ha Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), <i>штур</i> бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>), Штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>), пепељуга (<i>Chenopodium album</i>) пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), дворник велики (<i>Polygonum lapathifolium</i>), чистац једногодишњи (<i>Stachys annua</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>).
Задовољавајуће сузбија	у количини 2 l/ha мухар лепљиви (<i>Setaria verticillata</i>), <i>сирак дивљи из семена</i> (<i>Sorghum halepense</i>), у количини 3 l/ha пепељуга (<i>Chenopodium album</i>), пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), просо коровско (<i>Echinochloa crus-galli</i>), дворник велики (<i>Polygonum lapathifolium</i>), дворник птчији (<i>Polygonum aviculare</i>) мухар лепљиви (<i>Setaria verticillata</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), <i>сирак дивљи из семена</i> (<i>Sorghum halepense</i>), чистац једногодишњи (<i>Stachys</i>	у количини 1 l/ha+1 l/ha Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), у количини 1 l/ha+1,5 l/ha амброзија (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), просо коровско (<i>Echinochloa crus-galli</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), мухар лепљиви (<i>Setaria verticillata</i>), <i>сирак дивљи из семена</i> (<i>Sorghum halepense</i>), у количини 1,5 l/ha+1,5 l/ha просо коровско (<i>Echinochloa crus-galli</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), мухар лепљиви (<i>Setaria verticillata</i>), <i>сирак дивљи из семена</i> (<i>Sorghum halepense</i>),

	<i>annua</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>).	
Слабо сузбија	у количини 2 l/ha попонац њивски (<i>Convolvulus arvensis</i>), просо коровско (<i>Echinochloa crus-galli</i>), дворник птичији (<i>Polygonum aviculare</i>) сирак дивљи из ризома (<i>Sorghum halepense</i>), у количини 3 l/ha попонац њивски (<i>Convolvulus arvensis</i>), сирак дивљи из ризома (<i>Sorghum halepense</i>),	у количини 1 l/ha+1 l/ha Штир бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>), пепељуга обична срцолисна (<i>Chenopodium album</i>), попонац њивски (<i>Convolvulus arvensis</i>), просо коровско (<i>Echinochloa crus-galli</i>), дворник птичији (<i>Polygonum aviculare</i>), мухар лепљиви (<i>Setaria verticillata</i>), у количини 1 l/ha+1,5 l/ha попонац њивски (<i>Convolvulus arvensis</i>), сирак дивљи из ризома (<i>Sorghum halepense</i>), у количини 1,5 l/ha+1,5 l/ha попонац њивски (<i>Convolvulus arvensis</i>), сирак дивљи из ризома (<i>Sorghum halepense</i>),
Усев у коме се примењује	Соја	
Количина и време примене	Једнократно: 2-3 l/ha (2 – 3 ml у 100m²) У фази између првог и трећег тролиста 12-14 ВВСН скале). Двократно: 1+1 l/ha; 1+1,5 l/ha ; 1,5+1,5 l/ha (10+10ml у 100m² ; 10+15ml у 100m²; 15+15ml у 100m²;) 7-14 дана после првог третмана	
Начин примене	Са земље, тракторским прскалицама.	
Утрошак воде	200 - 400 l/ha (2 - 4 l на 100 m ²).	
Максималан број третирања на истој површини у току године	Једном у току године	

Мешање са другим средствима за заштиту биља: Могућност мешања треба претходно испитати на мањим површинама

Каренца:

Обезбеђена временом примене

Радна каренца: 48 часова

Напомене:

Забрањена је примена средства средста за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање.

У пролеће наредне године могу се сејати кукуруз, шећерна репа, соја, кромпир и пасуљ.

У јесен наредне године могу се сејати озима жита луцерка и детелина.

Негативно деловање: На водене организме (токсичност) Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде (водотоци, језера, изворишта воде, бунари) и канализациону мрежу

На воде (контаминација) : Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара) третирајући најмање 20 м удаљено од њих.

Додатне ознаке безбедности:

SP 1 - Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Spo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу

Spe3 Због заштите водених организама треба поштовати зоне безбедности од 20м до водене површине.

Складиштење: Средство за заштиту биља складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији одвојено од људске и сточне хране, на прохладном и сувом месту, под кључем, ван домаћаја деце. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача.

Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за заштиту биља: Са остацима средства за заштиту биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр.36/09,88/10, 14/16 и 95/18), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр.36/09 и 95/18). Неискоришћени производ употребити поново, када је то могуће. Остатаке производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада од овог производа треба да се процени у складу са важећим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са важећим прописима. Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља потребно је испрати одмах након пражњења, како се средство за заштиту биља не би осушило у унутрашњости амбалаже. Испражњену амбалажу испрати коришћењем поступка троструког испирања или поступка испирања под притиском и ту течност додати течности за прскање.

Испирање испражњене амбалаже поступком троструког испирања врши се на следећи начин:

1) садржај амбалаже се испразни у резервоар прскалице и остави да се оцеди 30 секунди; 2) дода се вода до 1/3 запремине амбалаже; 3) амбалажа се затвори и садржај снажно промућка, тако да вода дође до свих унутрашњих површина; 4) затварач амбалаже се скине и пусти се да вода којом је извршено испирање исцури у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и амбалажа се остави 30 секунди да се оцеди; 5) поступак се понови се још два пута, с тим да се, сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим се испрана амбалажа пробуши на три места и тако учини неупотребљивом.

Испирање испражњене амбалаже поступком под притиском врши се коришћењем специјалног распршивача који се налази на уређајима за примену средстава за заштиту биља на следећи начин:

1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се причврсти специјални распрскивач - дизна уређаја за примену средстава за заштиту биља; 2) кроз специјални распрскивач - дизну пропушта се вода у трајању од око 30 секунди; 3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се оцеди и осуши, пробуши се на три места и тако учини неупотребљивом.

Празну амбалажу и преостале количине средства за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере, односно на за то одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Уништавање се може вршити спаљивањем у затвореном (лиценцираном) систему уз употребу филтра за уклањање отровних гасова (до прописаних граница емисије).

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у друге сврхе!

Поступак чишћења уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Испрати читав систем чистом водом. Предузети све неопходне мере предострожности при чишћењу прскалице. Опрему не чистити у близини језера, бунара, водотокова и других водених површина. Воду са којом је вршено чишћење треба утросити на површини на којој је третман извршен.

Симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење:

Симптоми: У случају несреће или лошег здравственог стања одмах потражите медицинску помоћ (покажите упутство или безбедносни лист уколико сте у могућности). Водите рачуна о самозаштити, користите заштитну опрему како је прописано

Прва помоћ и лечење: У случају удисања: Изнети експонирану особу на чист ваздух, а ако је дисање неправилно или заустављено примените вештачко дисање и потражите помоћ лекара.

У случају контакта са кожом: Може изазвати алергијске реакције на кожи. Након контакта са кожом потребно је одмах скинути евентуално контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом и сапуном.

У случају контакта са очима: Доводи до јаке иритације ока. Ако препарат доспе у очи, неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-так минута (уз отворене очне капке). Уколони контактна сочива уколико постоје и наставите испирањем.

У случају гутања: Штетан ако се прогута. Испрати уста. Попити доста воде. Одмах се обратити лекару.

У случају потребе детаљнија упутства са могу добити од Националног центра за контролу тровања,

Превентивне мере и поступци: Током рада са средством за заштиту биља придржавати се мера хигијенско техничке заштите. Не дозволити да дође у додир са кожом и слузницама. Препоручује се ношење заштитног одела, рукавица и наочара или штитника за очи/лице. За време рада не јести, не пити и не пушити. После рада обавезно опрати водом и сапуном руке, лице и по потреби друге делове тела.

Поступак у случају испуштања средства за заштиту биља у животну средину: Приликом третирања спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера, изворишта воде, канализационе мреже) Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Уколико овај производ доспе у канализацију или водене токове, обавестити о томе надлежне органе.