

Embrelia® 140 SC

Изопиризам 100 g/L
Дифеноконазол 40 g/L

Системични фунгицид са протективним, куративним и ерадикативним деловањем намењен за сузбијање проузроковача болести у засаду јабуке, брескве и нектарине.

Формулација: Концентрирана суспензија – SC

Класификација резистентности (FRAC): изопиризам 7, дифеноконазол 3

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!

Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину!

Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Произвођач: Adama Makhteshim Ltd., P.O.Box 60, Beer-Sheva 84100, Izrael

Заступник: Adama SRB doo Beograd, Булевар Михаила Пупина 6, ПЦ Ушће, X спрат, 11070 Нови Београд, тел. +381 11 785 8500, преко Adama Agricultural Solutions Ltd, Израел

Решење број 321-01-481/2012-11 од 28.01.2013. и све важеће измене и допуне

Обавештења о опасности (H): Доводи до тешког оштећења ока. Штетно ако се удише. Може да изазове иритацију респираторних органа. Сумња се да може штетно да утиче на плод. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештења о мерама предострожности (P): Чувати ван домаћаја деце. Избегавати удисање прашине/дима/гаса/магле/паре/спреја. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице. АКО СЕ УДИШЕ: Изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/ мишљење. Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/амбалаже на место намењено за одлагање опасног отпада.



Опасност

Примена:

Embrelia® 140 SC је системични фунгицид са са протективним, куративним и ерадикативним деловањем. Примењује се:

1) У засаду **јабуке** за сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова (*Venturia inaequalis*) превентивно, пре остваривања услова за инфекцију, током периода примарних зараза јабуке од фенофазе отварања првих лисних пупољака, па током целе вегетације (фаза 11/51-89 ВВСН скале) и проузроковача пепелнице (*Podosphaera leucotricha*) од фенофазе отварања првих лисних пупољака, па током целе вегетације (фаза 11/51-89 ВВСН скале) у количини 1 L/ha (10 mL на 100m²). Примењује се прскањем или орошавањем, уз утрошак 1000 L/ha воде (10 L воде на 100m²).

2) У засаду **breskve и neктарине** за сузбијање проузроковача пепелнице (*Sphaerotheca pannosa*) превентивно, у зависности од инфекционог потенцијала и услова за развој болести (од фаза 11 ВВСН скале) у количини од 0,1% (0,1 L у 100 L воде) и проузроковача трулежи плодова (*Monilinia* spp, *Botrytis* spp, *Rhizopus* spp, *Penicillium expansum*) једном: 7 дана пред бербу плодова; двапут: 21 дан и 7 дана пред бербу плодова (фенофаза 81-89 ВВСН скале) у количини од 0,1% (0,1 L у 100 L воде). Примењује се прскањем или орошавањем, уз утрошак 1000 L /ha воде (10 L воде на 100m²)

Максималан број третирања на истој површини у току године: за јабуку три пута, за брескву и нектарину два пута.

Мешање са другим пестицидима: Може се мешати са већином фунгицида и великим бројем других пестицида.

Фитотоксичност: Уколико се примењује према упутству за употребу нема опасности од појаве фитотоксичних ефеката.

Каренца:

21 дан за јабуку

7 дана за брескву и нектарину

Радна каренца: Један дан

Складиштење: Средство за заштиту биља складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији одвојено од људске и сточне хране, на прохладном и сувом месту, под кључем, ван домаћаја деце. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача.

Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за заштиту биља: Са остацима средства за заштиту биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр.36/09, 88/10 и 14/16), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр.36/09). Неискоришћени производ употребити поново, када је то могуће. Остатаке производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада од овог производа треба да се процени у складу са важећим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са важећим прописима. Испражњену амбалажу потребно је још једном добро протрести да се до краја испразни и затим пробušити на три места и тако учинити неупотребљивом. Празну амбалажу и преостале количине средства за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере, односно на за то одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Уништавање се може вршити спаљивањем у затвореном (лиценцираном) систему уз употребу филтра за уклањање отровних гасова (до прописаних граница емисије).

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у друге сврхе!

Поступак чишћења уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Испрати читав систем чистом водом. Предузети све неопходне мере предострожности при чишћењу прскалице. Опрему не чистити у близини језера, бунара, водотокова и других водених површина. Воду којом је вршено чишћење треба утрошити на површини на којој је третман извршен.

Симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење:

Симптоми: мучнина, гађење, повраћање, главобоља, малаксалост, хиперсаливација, гречање у грлу и бол у трбуху. Након контакта са кожом могуће је црвенило и свраб. Приликом контакта са очима може доћи до појачаног сузења и хиперемije коњуктива.

Прва помоћ и лечење: Прекинути даљи унос отрова у организам, испрати кожу и слузнице ока обичном чистом водом. Приликом гутања пестицида добро испрати уста и попрати 2-3 чаше воде, а након тога, уколико је потребно, узети медицински угаљ.

У случају потребе детаљнија упутства се могу добити од Националног центра за контролу тровања, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд, (011) 3608-440.

Превентивне мере и поступци: Током рада са средством за заштиту биља придржавати се мера хигијенско техничке заштите. Не дозволити да дође у додир са кожом и слузницама. Препоручује се ношење заштитног одела, рукавица и наочара или штитника за очи/лице. За време рада не јести, не пити и не пушити. После рада обавезно опрати водом и сапуном руке, лице и по потреби друге делове тела.

Поступак у случају испуштања средства за заштиту биља у животну средину: Приликом третирања спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера, изворишта воде, канализационе мреже) третирајући најмање 20m од њих. Уколико овај производ доспе у канализацију или водене токове, обавестити о томе надлежне органе.