

TELAVEX[®]

Селективан, транслокациони хербицид за сузбијање широколисних и травних корова у меркатилном и силажном кукурузу.

АКТИВНА СУПСТАНЦЕ: Мезотрион 100 g/l

Тиенкарбазон метил 30 g/l

Ципросулфамид 45 g/l протектант

Формулација: Концентрирана уљана суспензија - OD

Класификација резистентности (HRAC): Мезотрион 27 (F2)

Тиенкарбазон метил 2 (B)

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!

Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину!

Произвођач: Adama Agan Ltd., P.O.Box 262, Ashdod 77102, Израел

Заступник: Adama SRB doo Београд, Булевар Михаила Пупина 6, ПЦ Ушће, X спрат, 11070 Нови Београд, тел. +381 11 785 8500, преко Adama Agricultural Solutions Ltd, Израел

Решење број:

Обавештења о опасности (H): Сумња се да може штетно да утиче на плод. Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног и вишекратног излагања. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештења о мерама предострожности (P): Чувати ван домаћаја деце. Прибавити посебна упутства пре употребе. Не удисати прашину/ дим/ гас/ маглу/ пару/ спреј. Носити заштитне рукавице/ одећу/ наочаре / заштиту за лице. Одлагање садржаја амбалаже на место намењено за прикупљање ризичног или опасног отпада у складу са националним прописима.

Додатне ознаке безбедности: Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. Рок употребе: 3 године

Пажња



Примена:

® је селективни хербицид намењен за сузбијање широколисних и травних
TELAVEX

корова у усеву кукуруза (меркантилног и силажног):

Спектар деловања		Једногодишњи и вишегодишњи широколисни и усколисни корови у меркантилном и силажном кукурузу.
Добро сузбија (<90%):	у количини 0,8 l/ha	Штир бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>) штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>), пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), лубеничарка њивска (<i>Hibiscus trionum</i>), трскот (<i>Polygonum aviculare</i>), дивља паприка (<i>Polygonum lapathifolium</i>), пољска горушица (<i>Sinapis arvensis</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>)
	у количини 1,0 l/ha	Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), штир бљутави (<i>Amaranthus blitoides</i>) штир обични (<i>Amaranthus retroflexus</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisifolia</i>), пепељуга (<i>Chenopodium album</i>) пепељуга срцолисна (<i>Chenopodium hybridum</i>), татула обична (<i>Datura stramonium</i>), лубеничарка њивска (<i>Hibiscus trionum</i>), трскот (<i>Polygonum aviculare</i>), дивља парика (<i>Polygonum lapathifolium</i>), велики мухар (<i>Panicum crus-galli</i>), пољска горушица (<i>Sinapis arvensis</i>), пасије грожђе (<i>Solanum nigrum</i>), боца обична (<i>Xanthium strumarium</i>)
Задовољавајуће сузбија (75-95%):	у количини 0,8 l/ha	Теофрастова липица (<i>Abutilon theophrasti</i>), амброзија (<i>Ambrosia artemisifolia</i>), пепељуга (<i>Chenopodium album</i>), велики мухар (<i>Panicum crus-gali</i>) Усколисни корови, као што је: сирак дивљи из семена (<i>Sorghum halepense</i>).
	у количини 1,0 l/ha	Сирак дивљи из семена (<i>Sorghum halepense</i>).
Слабо сузбија (<75%) :	У количини 0,8 l/ha	Сирак дивљи из ризома (<i>Sorghum halepense</i>)
	У количини 1,0 l/ha	Сирак дивљи из ризома (<i>Sorghum halepense</i>)
Усев у коме се примењује		Кукуруз меркантилни и силажни

Количина и време примене	У количини 0,8 – 1,0 l/ha (8 – 10 ml у 100m ²), третирањем после сетве а пре ницања или непосредно после ницања када је усев у фази 1-3 листа (фазе 00-13 ВВСН скале).
Начин примене	Са земље, тракторским прскалицама.
Утрошак воде	200 - 400 l/ha (2 - 4 l на 100 m ²).
Максималан број третирања на истој површини у току године	Једном.

Мешање са другим средствима за заштиту биља: Могућност мешања треба претходно испитати на мањим површинама

Фитотоксичност: није утврђено фитотоксично деловање препарата

Каренца:

Обезбеђена временом примене

Радна каренца: до сушења депозита

Напомене:

Ако дође до преоравња и превременог скидања усева на третираним површинама може се сејати кукуруз.

У јесен исте године, односно 4 месеца након третирања могу се сејати уљана репица, луцерка, озима и стрна жита. У пролеће наредне године, након дубоког орања могу се сејати јара стрна жита, кукуруз, соја, сунцокрет и кромпир. Спречити заносење на осетљиве усеви и засаде.

Додатне ознаке безбедности:

SP 1 - Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Складиштење: Средство за заштиту биља складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији одвојено од људске и сточне хране, на прохладном и сувом месту, под кључем, ван домаћаја деце. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача.

Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за заштиту биља: Са остацима средства за заштиту биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр.36/09,88/10, 14/16 и 95/18), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр.36/09 и 95/18). Неискоришћени производ употребити поново, када је то могуће. Остатаке производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада од овог производа треба да се процени у складу са важећим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са важећим прописима. Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља потребно је испрати одмах након пражњења, како се средство за заштиту биља не би осушило у унутрашњости амбалаже. Испражњену амбалажу испрати коришћењем поступка троструког испирања или поступка испирања под притиском и ту течност додати течности за прскање.

Испирање испражњене амбалаже поступком троструког испирања врши се на следећи начин:

1) садржај амбалаже се испразни у резервоар прскалице и остави да се оцеди 30 секунди; 2) дода се вода до 1/3 запремине амбалаже; 3) амбалажа се затвори и садржај снажно промућка, тако да вода дође до свих унутрашњих површина; 4) затварач амбалаже се скине и пусти се да вода којом је извршено испирање исцури у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и амбалажа се остави 30 секунди да се оцеди; 5) поступак се понови се још два пута, с тим да се, сваки пут при

повнављању поступка испирања користи чиста вода, а затим се испрана амбалажа пробуши на три места и тако учини неупотребљивом.

Испирање испразњене амбалаже поступком под притиском врши се коришћењем специјалног распршивача који се налази на уређајима за примену средстава за заштиту биља на следећи начин: 1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се причврсти специјални распрскивач - диза уређаја за примену средстава за заштиту биља; 2) кроз специјални распрскивач - дизну пропушта се вода у трајању од око 30 секунди; 3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се оцеди и осуши, пробуши се на три места и тако учини неупотребљивом.

Празну амбалажу и преостале количине средства за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере, односно на за то одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Уништавање се може вршити спаљивањем у затвореном (лиценцираном) систему уз употребу филтра за уклањање отровних гасова (до прописаних граница емисије).

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испразњене амбалаже у друге сврхе!

Поступак чишћења уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Испрати читав систем чистом водом. Предузети све неопходне мере предострожности при чишћењу прскалице. Опрему не чистити у близини језера, бунара, водотокова и других водених површина. Воду са којом је вршено чишћење треба утрошити на површини на којој је третман извршен.

Симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење:

Симптоми: У случају несреће или лошег здравственог стања одмах потражите медицинску помоћ (покажите упутство или безбедносни лист уколико сте у могућности). Водите рачуна о самозаштити, користите заштитну опрему како је прописано

Прва помоћ и лечење: У случају удисања: Изнети експонирану особу на чист ваздух, а ако је дисање неправилно или заустављено примените вештачко дисање и потражите помоћ лекара. **У случају контакта са кожом:** Након контакта са кожом потребно је одмах скинути евентуално контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом. **У случају контакта са очима:** Ако препарат доспе у очи, неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-так минута (уз отворене очне капке). Уколонити контактна сочива уколико постоје и наставите испирањем.

У случају гутања: Испрати уста. Попити доста воде. Одмах се обратити лекару.

У случају потребе детаљнија упутства са могу добити од Националног центра за контролу тровања, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд, 011/662-381 или 3608-440

Превентивне мере и поступци: Током рада са средством за заштиту биља придржавати се мера хигијенско техничке заштите. Не дозволити да дође у додир са кожом и слузницама. Препоручује се ношење заштитног одела, рукавица и наочара или штитника за очи/лице. За време рада не јести, не пити и не пушити. После рада обавезно опрати водом и сапуном руке, лице и по потреби друге делове тела.

Поступак у случају испуштања средства за заштиту биља у животну средину: Приликом третирања спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера, изворишта воде, канализационе мреже) Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Уколико овај производ доспе у канализацију или водене токове, обавестити о томе надлежне органе.