



MEDIFAM 320 SC



ADAMA



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
HERBICID

Valmistetyyppi: SC/
Preparattyyppi: SC



Tehoaine/Verksamma ämne:

- fenmedifaami 320 g/l/fenmedifam 320 g/l
sisältää myös 1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-onia /
innehåller också 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on



Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registreringsnummer: 2834

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä pakkauksesa/

Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



**Skannataan käytettäväksi/
Scanna för användning**



L112626IPFR_07



FINLAND

NO VARNISH
AREA

5 Le



MEDIFAM 320 SC



**VAIKUTUSTAPA
VERKINNINGSMEKANISM**

5

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
HERBICID**

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Användargrupp: Yrkesanvändning

Käyttötarkoitus

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä ä

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

Vaurioittaa vakavasti silmiä • Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Säilytä lasten ulottumattomissa • Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin • Valumat on kerättävä.

Sisältää 1,2-bentsisotiasolin-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi

Orsakar allvarliga ögonskador • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Förvaras oåtkomligt för barn • Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Samla upp spill • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga handskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som förorsakar fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd användas och vid arbetssituationer som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.



**VAARA
FARA**



UFI: 9MNX-KD0T-XV0W-HC3P

UN3082



8 718077 006123



SUOMI

SVENSKA

avaa tästä
öppnas här



MEDIFAM 320 SC



VAIKUTUSTAPA
VERKNIINGSMEKANISM

5

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
HERBICID

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä

Vaurioittaa vakavasti silmiä • Erittäin myrkyllistä vesilielleille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Säilytä lasten ulottumattomissa • Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista • Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin • Valumat on kerättävä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

Orsakar allvarliga ögonskador • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • Förvaras oåtkomligt för barn • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare • Samla upp spill • För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen • Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga handskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som förorsakar fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd användas och vid arbetssituationer som exponerar andningsvägarna bör andningskydd försett med filter P2/A2 användas.

L12626IPBB_07



VAARA
FARA

UFI: 9MNX-KDT0-XV0W-HC3P

UN3082



8 718077 006123

SUOMI

KÄYTTÖTARKOITUS

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriuriskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaineen käytössä pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II) on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaa on läpäisevää maalajia (HHT tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta käyttää enintään joka toinen vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella.

- Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaan maalaji on HHT:ä hienojakoisempaa, tai jos ruiskutuksessa käytetään riviuriskua, voidaan valmistetta käyttää tarvittaessa joka vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella.

- Salaojittamattomilla pelloilla valmistetta ei saa käyttää.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

RESISTENSSIN HALLINTA

Tehoaine kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään 5 (entinen C1; fotosynteesin esto). Riski resistenstien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuonna.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTTÖOHJE

Sokerijuurikas:

Medifam 320 SC:tä voidaan käyttää tankkiseoksena metamitroni -valmisteiden (esim. Goltixit, KVK-meta, Meta), etofumesaatti -valmisteiden (esim. Tramet 500 SC) ja triflusalufuroni-metyyli -valmisteiden (esim. Safari) kanssa 2-3 ruiskutuksena. Tankkiseoksiin tarvitaan aina PowerOil -öljyä.

Kevyet kivennäismaat:

Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Käytä tankkiseokseen Medifam 320 SC:tä 0,8 – 1,0 l/ha, etofumesaatti -valmistetta 0,1–0,2 (–0,3) l/ha ja metamitroni -valmistetta 1,0 – 1,5 l tai kg/ha. PowerOil -öljyn määrä ensimmäisessä ruiskutuksessa on 0,5–1,0 (–1,5) l/ha.

Toinen ruiskutus tehdään 7 – 10 vrk:n kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta. Medifam 320 SC:tä käytetään 1,0 – 1,2 l/ha, etofumesaatti -valmistetta 0,2–0,3 (–0,4) l/ha, metamitroni -valmistetta 0,8 –1,0 l tai kg/ha) sekä PowerOil -öljyä 0,5–1,0 (–1,5) l/ha.

Kolmas ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käyttömäärät ovat samat kuin toisessa ruiskutuksessa.

Savi- ja multamaat:

Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Käytä tankkiseokseen Medifam 320 SC:tä 1,0 – 1,2 l/ha, metamitroni -valmistetta 1,0 – 1,5 l tai kg/ha, etofumesaatti -valmistetta 0,2–0,3 (–0,4) l/ha ja PowerOil -öljyä 1,0–1,5 (–2,0) l/ha.

Toinen ruiskutus tehdään 7 – 10 vrk:n kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta. Medifam 320 SC:tä käytetään 1,2 – 1,5 l/ha. Tankkiseosta täydennetään etofumesaatti -valmistella 0,3–0,4 (–0,5) l/ha sekä metamitroni -valmistella 0,8 –1,0 l tai kg/ha). PowerOil -öljyn määrä ruiskutuksessa on 1,0–1,5 (–2,0) l/ha.

Kolmas ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käyttömäärät ovat samat kuin toisessa ruiskutuksessa.

Huomautus 1: Jos rikkakasvistossa on runsaasti saunioita, linnunkaalia, rusokkia, ukontatarta ja/tai ristikkukaisia rikkakasveja kuten rypsiä, rapsia, lutukkaa ja peltotaskuruohoa, metamitroni -valmisteen määrä on 0,5 l tai kg/ha ja tankkiseokseen lisätään triflusaluroni-metyyliä (Safari 20 – 30 g/ha).

Huomautus 2: PowerOil –öljyn määrä on suhteutettava ruiskutusoloihin. Pienempiä öljymääriä käytetään hyvissä ruiskutusoloissa ja suurempia kuivissa ja viileissä oloissa. Suurimmat suluissa merkityt öljymääriä käytetään vain kuivissa ja kylmissä olosuhteissa (lämpötila noin +10 °C).

Huomautus 3: Etofumesaatti -valmisteen suurinta suluissa merkittyä määrää käytetään vain runsaasti tattareita (pihatatar, kiertotatar, ukontatar) ja mataraa sisältävälle rikkakasvistolle.

Huomautus 4: Medifam 320 SC:tä voidaan käyttää myös täydentävänä ruiskutuksena etofumesaatin ja/tai triflusaluroni-metyylin kanssa (0,1 – 0,2 l/ha). Tällöin käyttömäärä kevyillä kivennäismailla on 1,0 – 1,5 l/ha ja savi- ja multamailla 1,5 – 2,0 l/ha. Tankkiseokseen on lisättävä PowerOil -öljyä 0,5 – 1,0 l/ha.

Vesimäärä ruiskutuksissa on 150–200 l/ha.

Punajuurikas:

Kahden ruiskutuksen ohjelma

Kun Medifam 320 SC:tä käytetään yksin, käyttömäärä kummassakin ruiskutuksessa on 1,25 –1,5 l/ha + PowerOil -öljy 0,5 – 1,0 l/ha. Ensimmäinen ruiskutus tehdään, kun punajuurikas ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käsittely uusitaan, kun rikkakasvit ovat uudelleen sirkkalehtiasteella. Tehon laajentamiseksi on suositeltavampaa käyttää tankkiseosta metamitronivalmisteiden kanssa seuraavasti.

Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Käytä tankkiseosta Medifam 320 SC kevyillä kiinnäisimillä 0,75 – 1,0 l/ha ja savi- ja multamilla 1,0 – 1,25 l/ha + metamitronivalmiste 0,5 – 1,0 l/ha + PowerOil öljy 0,5 – 1,0 l/ha.

Toinen ruiskutus tehdään 7 – 10 vrk:n kuluttua samoilla käyttömäärillä kuin ensimmäinen ruiskutus.

Mansikka:

Käsittely tehdään rikkakasvien ollessa enintään 2-lehtiasteella.

Medifam 320 SC:n käyttömäärä on 1,5 l/ha. Mansikan ruiskutusnesteeseen ei suositella sekoitettavaksi kiinniteöljyä. Käsittely usitaan tarvittaessa 1-2 viikon kuluttua. Käytä Medifam 320 SC –valmistetta uusilla istutuksilla taimien juurruttua, satoa tuottavilla viljelyksillä viimeistään mansikan kukinnan alussa ja/tai sadonkorjuun jälkeen. Valmistetta voi käyttää myös muovikateviljelyksillä.

RUISKUTUSNESTEEN VALMISTUS

Ravistettava ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään sekoituspumpun käydessä. Tankkiseosta tehtäessä sekoitetaan veteen ensin Medifam 320 SC, etofumesaattitai seosvalmiste, triflusaluroni-metyyli -valmiste ja sen jälkeen metamitronivalmiste. Käytettäessä Medifam 320 SC:tä seoksena muiden aineiden kanssa on otettava huomioon niiden käytöstä annetut ohjeet. Biologinen PowerOil - lisätään ruiskun säiliöön viimeiseksi.

HUOMAUTUKSET

Vaarallista muille viljelykasveille.

Medifam 320 SC vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15°C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Kuivissa oloissa voi teho jäädä heikoksi. Suuriin (enemmän kuin kaksi kasvulehteä) rikkakasveihin valmisteen teho on riittämätön. Ei tehoa juuririkkakasveihin.

Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia taimipolteen, hyönteisvioletuksen, huonojen kasvuolosuhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet.

Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä. Hellepäivänä ruiskutus on tehtävä aikaisin aamulla. Ankan halkan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankan halkan jälkeen on odotettava 2-3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa.

Kiinniteöljy parantaa tehoa rikkakasveihin etenkin kylmissä oloissa, mutta lisää vaitusriskiä yli +20 °C lämpötiloissa. Käytä öljyä sitä vähemmän mitä korkeampi on lämpötila. Punajuurikas on herkempi vaituksille kuin sokerijuurikas.

Suojattava pakkaselta.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 16.11.2005.

SVENSKA

ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

BEGRENSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Förhindrande av skador på miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Vid användning av bekämpningsmedlet på grund-vattenområden (grundvattenklasserna I och II) bör följande råd efterföljas:

- På täckdikade åkrar, vars bottenjord är en genomsläpplig jordart (finmo eller grövre), kan preparatet användas högst vart annat år med lägsta möjliga dosering.
- På täckdikade åkrar, på vilka bottenjordens jordart är mera finfördelad än hos finmo, eller om man använder en radspruta, kan preparatet vid behov användas varje år med lägsta möjliga dosering.
- På åkrar som inte är täckdikade får preparatet inte användas.

Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna en minst 30 - 100 meter bred obehandlad skyddszon.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

HANTERING AV RESISTENS

Det verksamma ämnet hör enligt verkningsmekanismen till HRAC-gruppen 5 (tidigare C1; förhindrar fotosyntesen). Risken för att resistent ogrässtammar utvecklas är stor i denna grupp. För att hindra utvecklingen av resistent ogrässtammar bör preparat som till verkningsmekanismen hör till samma grupp inte användas på samma skifte flera år i rad.

SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga handskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som förorsakar fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd användas och vid arbetssituationer som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

BRUKSANVISNING

Sockerbeta:

Medifam 320 SC kan användas i tankblandning med metamitron-preparat (t.ex. Goltix WG/SC, KVK-meta, Meta), etofumesat-preparat (t.ex. Tramet 500 SC) och med triflusalufuron-metyl-preparat (t.ex. Safari) som 2 - 3

besprutningar. Till tankblandningar behövs alltid PowerOil-olja.

Lätta mineraljordar:

Den första besprutningen görs då ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Använd till en tankblandning Medifam 320 SC 0,8-1,0 L/ha, ett etofumesat-preparat 0,1-0,2 (-0,3) L/ha och ett metamitron-preparat 1,0-1,5 L eller kg/ha. Mängden PowerOil-olja vid den första besprutningen är 0,5-1,0 (-1,5) L/ha.

Den andra besprutningen görs 7-10 dygn efter den första besprutningen. Medifam 320 SC används 1,0-1,2 L/ha, ett etofumesat-preparat 0,2-0,3 (-0,4) L/ha och ett metamitron-preparat 0,8-1,0 L eller kg/ha samt PowerOil-olja 0,5-1,0 (-1,5) L/ha.

Den tredje besprutningen görs vid behov, då nya ogräs är vid hjärtbladstadiet. Bruksmängderna är desamma som vid den andra besprutningen.

Ler- och mulljordar:

Den första besprutningen görs då ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Använd till en tankblandning Medifam 320 SC 1,0-1,2 L/ha, ett metamitron - preparat 1,0-1,5 L eller kg/ha, ett etofumesat-preparat 0,2-0,3 (-0,4) L/ha samt PowerOil -olja 0,5-1,0 (-1,5) L/ha.

Den andra besprutningen görs 7-10 dygn efter den första besprutningen. Medifam 320 SC används 1,2-1,5 L/ha. Tankblandningen kompletteras med ett etofumesatpreparat 0,3-0,4 (-0,5) L/ha och med ett metamitron -preparat 0,8-1,0 L eller kg/ha. Mängden PowerOil -olja vid besprutningen är 0,5-1,0 (-2,0) L/ha.

Den tredje besprutningen görs vid behov, då nya ogräs är vid hjärtbladstadiet. Bruksmängderna är desamma som vid den andra besprutningen.

Anmärkning 1: Om det i ogräsfloran ingår rikligt med kamomill eller baldersbrå, harkål, brunskära, åkerpilört och/eller korsblomstriga ogräs såsom rybs, raps, lomme och penningört, är mängden metamitron - preparat 0,5 L eller kg/ha och till tankblandningen tillsätts triflusaluron-metyl (Safari 20-30 g/ha).

Anmärkning 2: Dosen av PowerOil -olja bör stå i relation till besprutningsförhållandena. De mindre mängderna olja används vid goda besprutningsförhållanden och de större vid torra och svala förhållanden. De största mängderna olja, satta inom parenteser, används endast vid torra och kalla förhållande (temperaturen ca +10 °C).

Anmärkning 3: Den största mängden etofumesat - preparat, satt inom parentes, används endast för ogräsfloror som innehåller rikligt med Polygonum-arter (trampört, åkerbinda, åkerpilört) och måra.

Anmärkning 4: Medifam 320 SC kan också användas som kompletterande besprutning tillsammans med etofumesat och/eller triflusaluron-metyl (0,1-0,2 L/ha). I detta fall är bruksmängden på lätta mineraljordar 1,0-1,5 L/ha och på ler- och mulljordar 1,5-2,0 L/ha. Till tankblandningen bör tillsättas PowerOil-olja 0,5-1,0 L/ha.

Vattenmängd vid besprutningen är 150-200 L/ha.

Rödbeta:

Program med två besprutningar

Då Medifam 320 SC används ensamt för sig är bruksmängden vid vardera besprutningen 1,25-1,5 L/ha samt PowerOil-olja 0,5-1,0 L/ha. Den första besprutningen görs då rödbetan och ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Behandlingen förnyas då ogräsen på nytt är vid hjärtbladstadiet. För att man skall få en bredare effekt rekommenderas det hellre att man använder en tankblandning med met amitronpreparat på följande sätt.

Den första besprutningen görs då ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Använd tankblandningen Medifam 320 SC på lätta mineraljordar 0,75-1,0 L/ha och på ler och muljordar 1,0-1,25 L/ha + ett met amitronpreparat 0,5-1,0 L/ha + PowerOil-olja 0,5-1,0 L/ha.

Den andra besprutningen görs efter 7-10 dygn med samma bruksmängder som vid den första besprutningen.

Jordgubbe:

Behandlingen görs då ogräsen är högst vid 2-bladstadiet.

Bruksmängden för Medifam 320 SC är 1,5 L/ha. Det rekommenderas att man inte tillsätter fästolja till sprutvätskan för jordgubbe. Behandlingen förnyas vid behov efter 1-2 veckor. Använd preparatet Medifam 320 SC på nya planteringar då plantorna har rotat sig, på skördebringande odlingar senast vid början av jordgubbens blomning och/eller efter skörden. Preparatet kan även användas för odlingar på plast.

FRAMSTÄLLNING AV SPRUTVÄTSKA

Omskakas före användningen. Spruttanken fylls först till hälften, varefter medlet tillsätts under det att omrörningspumpen hålls påslagen. Vid framställning av en tankblandning inblandas i vattnet först Medifam 320 SC, etofumesat- eller blandningspreparat, triflusulfuron-metyl-preparat och efter det met amitronpreparat. Då man använder Medifam 320 SC i blandning med andra medel bör man ta i beaktande råden som getts om användningen av dessa medel. Den biologiska PowerOil-oljan tillsätts till sist till spruttanken.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för andra odlingsväxter.

Medifam 320 SC verkar mot ogräsen via bladen. Den bästa effekten mot ogräsplantorna fås vid en temperatur över +15 °C vid goda fuktförhållanden. Vid torra förhållanden kan effekten förbli svag. Mot stora (mera än två växtblad) ogräs är preparatets effekt otillräcklig. Har ingen effekt mot roto gräs. Om odlingsväxtens plantor är i dålig kondition på grund av groddbrand, insektsskador, dåliga tillväxtförhållanden eller av någon annan orsak, bör besprutningen uppskjutas till dess plantorna har repat sig. Det rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen. Dagar med varmt väder bör besprutningen göras tidigt på morgonen. Då stark nattfrost hotar bör besprutningarna framskjutas. Efter stark nattfrost bör man vänta 2-3 dygn innan man kan bespruta. Fästoljan förbättrar effekten mot ogräs speciellt vid kalla förhållanden, men ökar risken för skador vid temperaturer över +20 °C. Använd desto mindre av oljan ju högre temperaturen är. Rödbeta är känsligare för skador än sockerbeta.

Skyddas mot kyla

Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet att användas som bekämpningsmedel 16.11.2005.



MEDIFAM 320 SC



ADAMA



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
HERBICID

Valmistetyyppi: SC/
Preparattyyppi: SC

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Användargrupp: Yrkesanvändning



Tehoaine/Verksamma ämne:

- fenmedifaami 320 g/l/fenmedifam 320 g/l
- sisältää myös 1,2-Bentsisotiatoli-3(2H)-onia /
innehåller också 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on



Tiedot/Information

Rekisterinumero/Registreringsnummer: 2834

Luvanhaltija/Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä
pakkauksesa/Tillverkningspartiets nummer och
tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannataan käytettäväksi/
Scanna för användning



FINLAND

UN3082



8 718077 006130

Käyttötarkoitus

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä
sekä mansikkaviljelyksiltä ä

Vaurioittaa vakavasti silmiä • Erittäin myrkyllistä
vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia • Säilytä
lasten ulottumattomissa • Käytä suojakäsineitä/
suojausvaatteita/silmiensuojainta/kasvosuojainta • JOS
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista • Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin • Valumat on
kerättävä.

Sisältää 1,2-bentsisotiatoli-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen
reaktion • Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita,
suojauspukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim.
nitrili) ja päähiinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa
työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- /
silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta
och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

Orsakar allvarliga ögonskador • Mycket giftigt för
vattenlevande organismer med långtidseffekter •
Förvaras oåtkomligt för barn • Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd • VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare • Samla upp spill • För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen
• Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-on. Kan ge upphov till
allergisk reaktion.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt,
gummistövlar, kemikaliebeständiga handskar (t.ex. av
nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer
som förorsakar fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd
eller ögonskydd användas och vid arbetssituationer som
exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett
med filter P2/A2 användas.

VAIKUTUSTAPA
VERKNINGSMEKANISM

5 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN
HERBICID



VAARA
FARA

L1J26260CFR_07


4 x 5 L



MEDIFAM 320 SC



ADAMA



FINLAND



VAARA/FARA



UN3082

L112626PAAR_07

30 x 20 L