

TRIMMER® 50 SG

Rikkakasvien torjuntaan
För bekämpning av ogräs

Tehoaine / Aktiv substans:
tribenuron-metyyli / tribenuron-metyl 500g/kg
Valmistetyppi / Preparattyp: SG
Rekisterinumero / Registernummer: 3391
Ryhää/Grupp: HRAC B

Eräno/Partinr.: näytä pakauksesa/se förpackning

Luvanhaltija/
Tillståndsinnehavare:
Cheminova A/S
Thyborønvej 78
P.O. Box 9
DK-7673 Harbøre
Tanska/Danmark

* ADAMA Agriculture B.V., Amsterdam (NL),
Schaffhausen Branch

100 g e



ADAMA

363
008363
077008363
8718077

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.
Säilytettävä kuivassa.

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

VAROITUS

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Erittäin myrkkylistä vesieliölle,
pitkäaikaishaittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/
höyryn/suihkeen hengittämistä.
Käytä suoja-akseenitää/suojavaatetusta/
silmiin suojaantaa/kasvonsuojaantaa.
JOS KEMIKALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedellä ja saippualla.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
Hakeudu lääkäriin.
Valumaton on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien
vaarojen välttämiseksi.

Användningsändamål: Mot ogräs i höst- och
vårsäd samt i skyddssäd för vallar.
Förvaras torrt.

Användargrupp: Yrkesanvändare
Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan
produkten används.

VARNING

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas damm/rök/
gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögomskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
tvål och vatten.. Vid hudirritation eller
utslag: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.

För att undvika risker för
människors hälsa och för
miljön, följ bruksanvisningen.

Hätäkeskuslaitos/Nödcentralenverket: puh/tel 112
Myrkytystietokeskus 24h suora 09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711
Giftinformationscentralen 24h direkt 09 - 471 977 eller växel 09 - 4711

Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



FINLAND

UN 3077

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaaviljoista.

Säilytettävä kuivassa.

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttöä
Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

VAROITUS

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesiliöille,
pitkäaikaishaittaavikutkuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä pölyn/savun/kaasun
/sumun/höyryyn/suihkeen
hengittämistä.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmien suojainta/kasvonsuojaista.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedellä ja saippualla.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai
ihottumaa: Hakeudu lääkärin.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen
terveydelle ja ympäristölle
aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Hätäkeskuslaitos/Nödcentralsverket: puh/tel 112

Myrkytystietokeskus 24h suora 09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711

Giftninformationscentralen 24h direkt 09 - 471 977 eller växel 09 - 4711

Skannataan
käyttöväksi /
Scanna för
användning



Användningsändamål: avaa tästä
Mot ogräs i höst-
och vårsäd samt i
skyddssäd för vallar.
Förvaras torrt.

öppnas här ➤ ➤

Användargrupp: Yrkesanvändare
Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan produkten används.

VARNING

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Förvaras oätkomligt för barn.
Undvik att inandas damm/rök/
gaser/dimma/ängor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål
och vatten. Vid hudirritation eller utslag:
Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
**För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön,
följ bruksanvisningen.**



KÄYTÖTÄRKOITUS

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Vilja voidaan käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käytökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteesseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteesseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄSITTELYALUEEN ULKOPUOLISEN KASVILLISUUDEN SUOJELU

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyyppillä		
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin	
	50 - 75% vähenrys	90% vähenrys
10 m	3 m	0 m


KÄYTTÖOHJE

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa ja rikkakasvien ollessa vielä pieniä.

Kevättiljat käsitellään viljan 2-4 lehtiasteella, kuitenkin viimeistään lippulehtivaiheessa (lippulehden korvake näkyvillä, BBCH 39). Viimeinen ruiskutusajankohta peltovalvatin ja pelto-ohdakkeen kasvun pysähdyttämiseksi (20g/ha/22g/ha) on BBCH 39.

Apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan heinän oraan ollessa 2-3 lehti-asteella.

Apilapitoisten nurmien suojaviljat ruiskutetaan kun apilassa on vähintään yksi kolmilehdykkäinen lehti. Ks. kuva alla:



KÄYTÖMÄÄRÄT

Syysviljat: 15 – 22 g/ha

Kevätviljat: 12 – 20 g/ha, suurinta suositeltua määrää käytetään, jos pellossa kasvaa runsaasti tatarta, orvokkia, emäkkiä, peltovalvattia tai -ohdaketta.

Apilattomien nurmien suojaviljat: 8–11 g/ha

Vettä käytetään 200 – 300 l/ha. Ruiskutusnesteeseen lisätään Sito Plus- tai Super-kiinnitettä 1 dl/200 l vettä (0,05 % nesteen määrästä).

Apilapitoisten nurmien suojavilja:

8–11 g/ha + 0,5 l MCPA-valmistetta/ha.

HUOM! Älä lisää kiinnitettä. Vettä käytetään 200 – 300 l/ha.

RUISKUTUSNESTEEN VALMISTUS

Kiinnitettä käsiteltäessä on noudatettava sen myyntipäällyksessä olevia suojaainohjeita. Lisää puolillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Trimmer® 50 SG - sekoittajan käydessä. Täytä säiliö vedellä, ja lisää kiinnite tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian.

Apilapitoisten nurmien suojavilja: Lisää ensin Trimmer® 50 SG tankkiin. Kun rakeet ovat liuenneet täysin, lisää MCPA-valmiste sekoittajan ollessa käynnissä.
HUOM! Älä käytä kiinnitettä.

HUOMAUTUKSET

Vaarallista muille viljelykasveille. Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta. Teho on heikohko orvokkiin, tattariin, peltoemäkkiin ja linnunkaaliin. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti, mutta kasvien lakastumisoireet tulevat esiin vasta n. 10 vrk:n kuluttua. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Käsittelyn jälkeen voi kasvustossa näkyä ohimenevä vaaleneminen. Suojavilja ruiskutettaessa viljan ja nurmikasvien tulee olla tasaisesti orastuneita/taimettuneita heinien ja/tai apilan vioitusriskin vähentämiseksi. Märkyydestä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

Jotta pitkääikaisessa viljanviljelyssä vältyttäisiin kestävien rikkakasvikantojen kehittymiseltä, voidaan maahantuojan suosituksen mukaan Trimmer® 50 SG -valmisteeseen lisätä 3-4 vuoden välein diklorproppi-P:tä, mekoproppi-P:tä tai fluoksipyriä sisältävää valmistetta pienintä ohjeenmukaista määrää käyttäen.

Valmisten teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä.

Trimmer® 50 SG - valmisteen käyttö ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa.
Säilytettävä kuivassa.

RUISKUN PUHDISTUS

Aloita aina ruiskutus puhtaalla tankilla ja laitteistolla. Puhdista välineet huolellisesti heti käytön jälkeen. Ruiskun huolimaton pesu tai liian pieni vesimäärä voi jättää ainejäämiä ruiskuun. Ruiskun käyttö tämän jälkeen muiden kuin viljakasvien ruiskutuksiin voi vahingoittaa näitä kasvustoja.

Jotta muut viljelykasvit eivät vahingoittuisi, ruisku on puhdistettava heti käsittelyn jälkeen huolellisesti, sekä sisä- että ulkopuolelta, seuraavasti:

1. Pese huolellisesti All Clear Extra® ruiskunpesua käyttäen tankin kaikki sisäpinnat, myös kanssi, puhtaalla vedellä (käytä vähintään 10 % tankin tilavuudesta) niin että kaikki jäämät ja kerrostumat irtoavat. Poista siivilät, suuttimet ja suodattimet ja pese niitä erikseen. Huuhele pumpua, suodattimia ja puomia. Tyhjennä loput pesuvedestä säiliöstä.
2. Pese, huuhele ja tyhjennä toisen kerran edellisten ohjeiden mukaisesti puhtaalla vedellä.
3. Huolehdi, ettei pesu- tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Huom: Käytettäessä tankkiseoksia lue kaikkien valmisteiden pesuohjeet ja noudata niistä perusteellisinta.

Luvanhaltija: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Tanska

Hätäkeskuslaitos: puh/tel 112

Myrkytystietokeskus 24h suora 09 - 471 977 tai vaihde 09 - 4711

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 3.10.2016. Rekisterinumero: 3391.

Kasvinsuojeluaineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto, yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisten vaikutuksesta poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

* Rek.tavaramerkki

Trimmer® 50 SG: ADAMA Agriculture B.V.
All Clear Extra® Service Chemicals Ltd.

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Mot ogräs i höst- och vårsäd samt i skyddssäd för vallar.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Säden kan användas till foder 14 dagar efter behandlingen.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag skall ett skyddsavstånd på 3 meter från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvättska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Överblivet och obrukbart växtskyddsmedel bör föras till ett insamlingsställe för farligt avfall och tomma, ursköljda förpackningar förs till en sakenlig sopstation.

SKYDDSANVISNINGAR

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad. I arbetsskedan som orsakar risk för preparatstänk ska dessutom ansikts-/ögonskydd användas och i arbetsskedan som exponerar andningsorganen bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

SKYDDANDE AV VÄXTLIGHET YTTEROM BEHANDLINGSOMRÅDET:

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet.

För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:

Skyddsavstånd med olika munstyckstyper		
Spaltspridarmunstycke	Munstycke som reducerar vindavdrift	
	50 - 75% reducering	90% reducering
10 m	3 m	0 m

BRUKSANVISNING


Höstsäden sprutas tidigt om våren då tillväxten börjar och ogräsen är små.

Vårsäd behandlas då grödan har 2-4 blad, dock senast på flaggbladsstadiet (snärpet just synligt, BBCH 39). Den sista spruttidpunkten för att hämma tillväxten av mjölkistel och åkertistel är vid BBCH 39 (20g/ha/22g/ha).

Skyddssäd för klöverfria vallar besprutas då gräsbrodden är på 2-3 bladsstadiet.

Skyddssäd för klöverhaltiga vallar besprutas, då klövern har minst en treväppling, se bild nedan:

Klövernas utvecklingsstadier:



BRUKSMÄNGDER

Höstsäd: 15 - 22 gram/ha

Vårsäd: 12 - 20 gram/ha, den största rekommenderade mängden används då det växer rikligt med pilört, viol, jordrök, mjölkstiel eller åkertistel.

Skyddssäd för klöverfria vallar: 8 -11 gram/ha.

Vattenmängden är 200 – 300 l/ha . Till sprutvätskan tillsätts Sito Plus- eller Super -vidhäftningsmedel 1 dl/200 l vatten (0,05 % av vätskans mängd).

Skyddssäd för klöverhaltiga vallar: 8 - 11 gram/ha + 0,5 l MCPA-preparat/ha.

Obs! Tillsätt inget fästmedel. Vattenmängden är 200 – 300 l/ha.

TILLBLANDNING AV SPRUTVÄTSKAN

Vid hanteringen av vätmedlet, fölж skyddsanvisningarna på förpackningen. Tillsätt under omröring den mängd Trimmer® 50 SG som behövs i en halvfull tank. Fyll på resten av vattnet och tillsätt vidhäftningsmedlet under kraftig

omröring. Använd sprutvätskan så snabbt som möjligt.
Skyddssäd för klöverhaltiga vallar: Tillsätt först Trimmer® 50 SG i tanken. Då granulatet har löst upp sig fullständigt, tillsätt MCPA-preparatet medan blandaren är igång.
OBS! Använd inget fästmedel.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för övriga odlingsväxter. Preparatet verkar huvudsakligen via bladen. Effekten är något svag mot viol, pilört, jordrök och harkål. Efter behandlingen avstannar ogräsens tillväxt genast, men tecken på att ogräsen vissnat framträder först efter cirka 10 dygn. Varmt och fuktigt väder gagnar effekten. Efter behandlingen kan grödan övergående ljasna. Vid besprutning av skyddssäd bör säden och insådden vara jämnt uppkomna, för att minska risken för skador på gräset och/eller klövern. Gröda som lider av väta skall ej behandlas.

För att i kontinuerlig stråsädesodling undvika att resistenta ogrässtammar uppstår, rekommenderar importören att vart 3-4 år använda Trimmer® 50 SG tillsammans med ett preparat som innehåller diklorprop-P, mekoprop-P eller fluroxypyr. Bruksmängderna enligt de minsta mängdrekommandationerna.

Preparatets effekt har undersökts endast med ovannämnda vidhäftningsmedel. Användningen av Trimmer® 50 SG begränsar inte val av följande års gröda.

Förvaras torrt.

RENGÖRING AV SPRUTAN

Starta alltid sprutarbetet med en ren tank och sprutsystem. Rengör utrustningen noggrant omedelbart efter användningen.

Vid dåliga rutiner för tvättning och otillräcklig vattenvolym vid sköljningen, kan rester av produkten finnas kvar i sprutan. Efterföljande användning av sprutan i andra grödor än stråsäd kan då resultera i skador på grödorna. För att undvika skador på andra grödor efter sprutning med produkten, tvätta noggrant all utrustning omedelbart efter avslutad sprutning, både invändigt och utväntigt, genom att följa proceduren nedan:

1. Tvätta noggrant och fullständigt alla tankens inre ytor, inklusive locket, med All Clear Extra® tvättmedel och rent vatten (använd minst 10 % av tankens kapacitet), så att alla rester och avlagringar tas bort. Spola pump, filter och bom efter att silar, munstycken och filter har tagits bort (tvätta dessa separat). Töm ur resten av tvättvattnet från tanken.
2. Upprepa tvätt, spolning och tömning med rent vatten.
3. Se till, att tvätt- och sköljvatten inte spolas ut så att det orsakar skada på träd eller känsliga grödor eller kan förorena yt- eller grundvatten.

Notera:

Vid tankblandning med andra produkter, läs instruktionerna för rengöring av sprutan för samtliga produkter i blandningen och följd den instruktion som är mest utförlig.

Nödcentralen: tel 112

Giftinformationscentralen 24h direkt 09 – 471 977 eller
växel 09 - 4711

**Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har godkänt att
preparatet används som växtskyddsmedel 3.10.2016.
Reg.nr: 3391.**

Tillverkaren av växtskyddsmedlet ansvarar för att
preparatet, som är i originalförpackning och lagrat på
rätt sätt, har sådan sammansättning som anmälts.
Vädret, växtbeståndets skick o.dyl. faktorer påverkar
hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren ansvarar inte för
verkan av preparatet under avvikande förhållanden eller
vid felaktig användning.

* Varumärke
Trimmer® 50 SG: ADAMA Agriculture B.V.
All Clear Extra® Service Chemicals Ltd.

TRIMMER® 50 SG

Rikkakasvien torjuntaan
För bekämpning av ogräs

Tehoaine / Aktiv substans:
tribenuron-metyyli / tribenuron-metyl 500g/kg
Valmistetyp / Preparattyp: SG
Rekisterinumero / Registernummer: 3391
Ryhää/Grupp: HRAC B

Eräno/Partinr.: näytä pakkauksesa / se förpackning

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare:
Cheminova A/S
Thyborønvej 78
P.O. Box 9
DK-7673 Harbøre
Tanska/Danmark

10 x 100 g



Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



* ADAMA Agriculture B.V., Amsterdam (NL),
Schaffhausen Branch



8 718077 008462

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä
nurmien suojaviljoista.
Säilytettävä kuivassa.

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

VAROITUS

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen
hengittämistä.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojausta/
kasvonsuojaista.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä
ja saippualla.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Valumat on kerättävä.
**Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle
aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.**



WARNING

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oätkomligt för barn.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid
hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen.**

UN 3077



ANETRMFI100G/01/C

Användningsändamål: Mot ogräs i höst- och vårsäd samt i skyddssäd för vallar.
Förvaras torrt.

Användargrupp: Yrkesanvändare
Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan produkten används.

TRIMMER® 50 SG



FINLAND



VAROITUS/VARNING

135 x 1 KG



UN 3077



ANETRMSFI00G/01/X

ADAMA

Northern Europe B.V.