

BANJO® FORTE

Kasvitalien Torjuntaan / Svampmedel

Vahva perunaruton vastustaja,
suojaa sekä lehtiä että mukuloita
Kraftfull mot potatisbladmögel,
skyddar både blad och knölar



ADAMA

Tehoaine / Aktiv substans:

dimetomorf 200 g/L

fluazinam 200 g/L

Valmistetyyppi / Preparatyp:

suspensiokonsentraatti (SC) /

suspensionskoncentrat (SC)

Vaikuttustapa / Verkningsmekanismi: FRAC 40,29

Eräno/Partinr.: Näytä pakkauksesa / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3219

Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti/Nederlanderna

www.adama.com

Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



ANEBJOFF15LT/03/A

97050857B/201712

5 L e

® ADAMA Registrations B.V.

BANJO® FORTE



Kasvitautien Torjuntaan / Svampmedel

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Perunarutan torjuntaan perunalla

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsåndamål: För bekämpning av
potatisbladmögel (brunröta) i potatis

Varoitus

Epällään vaurioittavan sikiötä.
Erittää myrkyllistä vesielölle, pitkääikaisia
hätitavaikutuksia.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojaistalta/kasvensuojaista.
Altistumisen tapahduttua tai jos epällään
altistumista: Hakeudu lääkäriin.
Valumat on kerättävä.

Varastoi lukiutussa tilassa.

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä
ja pakkaus viemällä asianmukaiseen
jättepisteeseen.

Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Sisältää 1,2-bentsisotiasol-(2H)-oni, fluazinamia. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.

Suojaainoja:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä
kumisappaaita, suoapukua, kemikaalin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja
päähinettejä. Roiskevaaraa aiheutavissa
työvaiheissa on käytettävä lisäksi
kasvojen/silmien suojaainta ja hengitystiet
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta
varustettuna P2/A2 suodattimella.

Torjuntatalosta tarkasteltessa ja muissa
työvaiheissa, joissa työntekijä on kosketuksessa
ruiskutettuun kasvustoon, työntekijän on käytettävä
suoapukua ja suojakäsineitä.

Varning

Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket
giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögönskydd/ansiktsskydd.
Vid exponering eller misstanke om
exponering: Sök läkarhjälp. Samla upp
spill.

Förvaras inläst.

Innehållet lämnas till insamlingsställe
för farligt avfall och behållaren till allmän
avstjälplingsplats.

För att undvika risker för människors hälsa och för
miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller 1,2-benzisotiasol-(2H)-on, fluazinam. Kan ge
upphov till allergisk reaktion.

Skyddsanvisningar:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar,
skyddsdräkt, kemikaliebeständiga
skyddshandskar (t.ex. av nitril)
och huvudbonad användas. I
arbets situationer med risk för stänk bör
dessutom ansikts-/ögönskydd användas
och i situationer med risk för exponering av
andningsvägarna bör andningsskydd försett med
filter P2/A2 användas. Då bekämpningsresultatet
kontrolleras och i andra arbets skeden då användaren
kommer i kontakt med det besprutade beständet bör
skyddsdräkt och skyddshandskar användas.



8 718077 006901 >

UN 3082



FINLAND

97050857D/201712

ANEBOFFI5LT/03/B



BANJO® FORTE



Kasvitalien Torjuntaan / Svampmedel

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus: Perunarutan torjuntaan perunalla

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsändamål: För bekämpning av
potatisbladmögel (brunröta) i potatis

Varning

Epällään vauroittavan sikiötä.
Erittäin myrkillistä vesiliölle, pitkääkaisia
haittavaikutuksia.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuoajista/kavonsuoajinta.

Altistumisen tapahduttua tai jos epällään
altistumista: Hakeudu lääkärin.

Valumat on kerätävä.

Varastoil lukitussa tilassa.

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä
ja pakkaus viemällä asianmukaiseen
jätepisteeseen.

Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Sisältää 1,2-bentsisotiasol-3(2H)-oni, fluatsinamia.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Suojaainojheet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä
kumisaappaita, suojaupukua, kemikaalilin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja
päähinettä. Roiskevararra aiheutavissa
työvaiheissa on käytettävä lisäksi
kasvojen/silmien suojaointa ja hengitystiet
altistavissa työvaiheissa hengityksen suojaointa
varustettuna P2/A2 suodattimella.

Torjuntatulosta tarkasteltaessa ja muissa
työvaiheissa, joissa työntekijä on kosketuksessa
ruiskutettuun kasvustoon, työntekijän on käytettävä
suojaupukua ja suojakäsineitä.

Varning

Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket giftigt
för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögongskydd/
ansiktsskydd.

Vid exponering eller misstanke om exponering:
Sök läkarhjälp. Samla upp spill.
Förvaras inläst.

Innehåller lämnas till insamlingsställe
för farligt avfall och behållaren till allmän
avstjälplningsplats.

För att undvika risker för människors hälsa och
för miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-on, fluazinam. Kan
ge upphov till allergisk reaktion.

Skyddsanvisningar:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar,
skyddsdräkt, kemikaliebeständiga
skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad
användas. I arbets situationer med risk för
stank bör dessutom ansichts/ögongskydd
användas och i situationer med risk
för exponering av andningsvägarna
bör andningsskydd försedd med filter P2/
A2 användas. Då bekämpningsresultatet
kontrolleras och i andra arbetskedden då
användaren kommer i kontakt med det besprutade
beständet bör skyddsdräkt och skyddshandskar
användas.

97050857D/2017/2

ANEBO/JOFF15LT/03/B

SUOMI

SVENSKA

Barcode
8 718077 006901 >

UN 3082



KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoaka: 7 vrk

RESISTENSSIN HALLINTA

Banjo® Forte -valmisteen tehoaineista dimetomorfi kuuluu vaikutustavaltaan CAA-fungisideihin, FRAC-ryhmä 40, ja fluatsinami FRAC-ryhmään 29.

Resistenssin ehkäisemiseksi, käytä valmistetta korkeintaan 4 kertaa kasvukaudessa. Vuorottele erilaisten vaikutusmekanismien omaavien valmisteiden kanssa.

KÄYTTÖOHJE

Ensimmäisen käsittelyn ajankohta riippuu tautipaineesta ja sääolosuhteista.

Ensimmäinen käsitellykerta kannattaa tehdä viimeistään rivien sulkeutuessa, jotta saadaan täysi hyöty ennaltaehkäisevästä tehosta. Uusintakäsitteily tehdään 7-14 päivän välein, ennen näkyviä taudinoireita. Noudata alla olevan taulukon annostusta. Lyhyintä käsitellyvälity (7 päivää) suositellaan, kun perunarutan riski on suuri. Banjo® Forte a voi käyttää yksittäisenä käsitellynä torjuntaohjelmassa, tai jopa 4 kertaa peräkkäin. Käytetään osana perunarutan torjuntaohjelmaa.

KÄYTÖMÄÄRÄT

Kasvi	Taudinaiheuttaja	Käytömäärä L/ha	Käyttöajankohta/kehitysvaihe	Huomautus
Peruna	Perunarutto	0,75-1,0	Mukulakehityksen alku → Ränsistymisen alku (BBCH 40-89) (viimeistään 7 päivää ennen sadonkorjuuta)	Pidä suositeltu käyttöväli

Vesimäärä 150–300 L/ha

Max 4 käsitteilyä/kasvukausi.

VAIKUTUSTAPA

Banjo® Forte on kasvitautien torjunta-aine, joka sisältää sekä kasvissa liikkuvaa systeemistä tehoainetta (dimetomorfi) sekä kosketusvaikuttelista tehainetta (fluatsinami).

Dimetomorfi ennaltaehkäisee perunaruttoa pysäyttämällä munasienten itämisen. Fluatsinami estää sientä tunkeutumasta käsitellyn lehden läpi.

YMPÄRISTÖHAIKKOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin vesielöiden suojelemiseksi:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
	50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys	
peruna	10 m	5 m	3 m	3 m

- 1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivulta www.tukes.fi/vesistorajoitus.

Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet. Traktoriruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytölaitetta eikä ylijäänyttää ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedäään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

HUOMIOITAVAA

Kasvuston tulee olla hyvässä kasvussa ruiskutusta tehdessä. Se ei saa olla kärsinyt kuivuudesta tai aikaisemmista käsittelyistä. Varmista hyvä levitystasaisuus. Valmiste on sateenkestävä kuivumisen jälkeen, eli normaalisti 3 tunnin sisällä.

Banjo® Forte ei saa sekoittaa öljyn tai tensideihin.

Säilytettävä suoressa pakkaselte sekä erillään elintarvikkeista sekä kylvösiemenistä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 30.10.2013

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Karenstid: 7 dygn

RESISTENSKONTROLL

Av de aktiva substanserna i Banjo® Forte -preparatet hör dimetomorf enligt verkningsättet till CAA-fungiciderna, FRAC-grupp 40 och fluazinam till FRAC-grupp 29.

För att förebygga resistens skall preparatet användas högst fyra gånger per växtperiod. Variera behandlingen med preparat som har andra verkningsmekanismer.

BRUKSANVISNING

Tidpunkten för den första behandlingen beror på sjukdomstryck och väderförhållanden. Det lönar sig att utföra den första behandlingen senast då raderna sluter sig, för att dra full nyttja av den förebyggande effekten. Förflyttad behandling utförs med 7-14 dagars mellanrum, innan sjukdomssymptomen är synliga. Följ doseringen i nedanstående tabell. Det kortaste behandlingsintervallet (7 dagar) rekommenderas då risken för bladmögel är stor. Banjo® Forte kan användas som en enskild behandling i bekämpningsprogrammet, eller så kan behandlingarna upprepas högst 4 gånger efter varandra.

Använts som en del av ett bekämpningsprogram för bladmögel.

DOSERING

Gröda	Sjukdom	Dos L/ha	Tidpunkt för behandling/utvecklingstadium	Anmärkning
Potatis	Bladmögel (brunröta)	0,75–1,0	Från inledning av knölbildning Nedvisningen börjar (BBCH 40-89) (senast 7 dagar före skörd)	Håll de rekommenderade användningsintervallen (7 dagar)

Vattenmängd 150–300 L/ha

Max 4 behandlingar/växtsäsong.

VERKNINGSSÄTT

Banjo® Forte är ett bekämpningsmedel mot växtsjukdomar som innehåller både en systemiskt verksam aktiv substans som rör sig i växten (dimetomorf) och en kontaktverkande aktiv substans (fluazinam).

Dimetomorf förebygger bladmögel genom att stoppa algsvamparna från att gro. Fluazinam hindrar svampen från att tränga in i ett behandlat blad.

FÖRHINDRANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som begränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Gröda	Munstycke			
	Spaltspridare	Avdriftsreducerande munstycken ¹⁾		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
potatis	10 m	5 m	3 m	3 m

- 1) Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. De vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vattendragsbegrensning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstryckena.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanväntbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

ANMÄRKNINGAR

Växtbeståndet måste vara i god tillväxt då besprutningen sker. Grödan får inte lida av torka eller tidigare behandlingar. Se till att appliceringen blir jämn. Preparatet är regnfast efter torkning, det vill säga normalt inom 3 timmar.

Banjo® Forte får inte blandas med oljor eller tensider.

Förvaras skyddat mot frost och separat från livsmedel och utsäde.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel 30.10.2013

SPECIMEN

BANJO® FORTE

Kasvitalien Torjuntaan /
Svampmedel

Vahva perunarutan vastustaja,
suojaa sekä lehtiä että mukuloita
Kraftfull mot potatisbladmögel,
skyddar både blad och knölar

Tehoaine / Aktiv substans:
dimetomorf 200 g/L
fluazinam 200 g/L
Valmistetyyppi / Preparattyp:
suspensoikonsentraatti (SC) /
suspensionskoncentrat (SC)
Vaikuttustapa / Verkningsmekanism: FRAC 40,29
Eräno/Partinr.: Näytä pakkauksesi / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3219
Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti/Nederlanderna
www.adama.com

4 x 5 L

* ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

BANJO® FORTE

97050857F/2016/09

ANEJOFF15LT/02/C1

BANJO® FORTE

Kasvitalien Torjuntaan / Svampmedel

Vahva perunaruton vastustaja,
suojaaa sekä lehtiä että mukuloita
Kraftfull mot potatisbladmögel,
skyddar både blad och knölar



Tehoaine / Aktiv substans:
dimetomorf 200 g/L
fluazinam 200 g/L
Valmistetyyppi / Preparattyp:
suspensiokonsestraatti (SC) /
suspensionskoncentrat (SC)
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: FRAC 40,29
Eräno/Partinr.: Näytä pakkauksesi / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3219
Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti/Nederlanderna
www.adama.com

* ADAMA Registrations B.V.

4 x 5 L

Skannataan
käytettäväksi /
Scanna för
användning



Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkitus: Perunaruton torjuntaan perunalla

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsändamål: För bekämpning av
potatisbladmögel (brunröta) i potatis

Varoitus

Epäillään vaarioittavan sikiötä.
Erittäin myrkkylistä vesiliölle, pitkääkaisia
haittavaikutuksia.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuoajinta/kasvonsuoajainta.
Altistumisen tapahduttua tai jos
epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
Valumatut on kerättävä.
Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakaus
viemällä asianmukaiseen jätepisteeseen.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle
ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.
Sisältää 1,2-bentsisotiasol-3(2H)-oni,
fluatsinamia.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.



Varning

Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögongskydd/ansiktsskydd.
Vid exponering eller misstanke om
exponering: Sök läkarhjälp. Samla upp spill.
Förvaras inläst.



Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt
avfall och behållaren till allmän avstjälplningsplats.
För att undvika risker för människors hälsa och för
miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-oni,
fluazinam. Kan ge upphov till allergisk
reaktion.

Skyddsanvisningar:
Vid hantering av preparatet
bör gummistövlar, skyddsdräkt,
kemikaliebeständiga
skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad
användas. I arbets situationer med risk för stänk
bör dessutom ansikts-/ögongskydd användas
och i situationer med risk för exponering av
andningsvägarna bör andningsskydd förtsett med
filter P2/A2 användas. Då bekämpningsresultatet
kontrolleras och i andra arbetskedden då användaren
kommer i kontakt med det besprutade beständet bör
skyddsdräkt och skyddshandskar användas.



UN 3082



BANJO® FORTE



FINLAND



8 718077 010670 >

30 x 20 L



SPAGHETTI



ANEBJOFFI5LT/03/X
97050857M/201712

ADAMA
Northern Europe B.V.