


MAVRIK®

Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel



Tehoaine / Aktiv substans:
tau-fluvalinaatti 240 g/L / tau-fluvalinat 240 g/L
Valmistetyyppi / Preparattyp: EW
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: IRAC 3A
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä
/ Tillverkningspartiets nummer och
tillverkningsdag:
näytä pakkauksessa / se förpackning.

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 1850
Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Makhteshim N.V.

1Le

MAVRIK®



Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrypsilä, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, porsa- ja ruusukaallilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuorijaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Användargrupp: Endast för yrkesbruk
Användningsändamål
Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärtor, bönor, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

VAROITUS

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNINGAR

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Samla upp spill.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen



Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähiinettä.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.



UN 3082



FINLAND

97100081D/201810

ANEMAVFILT/02/A

MAVRIK®



Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrypsilä, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, porsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Användargrupp: Endast för yrkesbruk
Användningsändamål

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, örter, bönor, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

VAROITUS

Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNINGAR

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen



Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisäppäitä, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähiennettä.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.



UN 3082



FINLAND

SUOMI

SVENSKA

97100081D/201810

ANEMAVFIILT/02/A

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoika kaaleilla, tuoreella herneellä ja perunalla 7 vrk, kuivatulla herneellä ja pavulla 14 vrk, viljoilla, omenalla ja päärynällä 30 vrk, syys- ja kevätrypsillä, syys- ja kevätrapsilla 60 vrk. Kukkakaalilla varoika lasketaan ensimmäisestä keruusta.

Valmisteen myöhäisin käyttöajankohta on öljykasveilla kukinnan alkaessa. Omenalle, päärynälle, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalille valmistetta saa käyttää kerran, muilla kasveilla korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.

RESISTENSSIN HALLINTA

Valmisteen (tehoaineryhmä 3A, pyretroidit) käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota resistenssinhallintaan ja sen takia käsittelyjen määrä on minimoitava vuorottelemalla käyttöä muiden, vaikutustavaltaan (MoA) eri tehoaineryhmään kuuluvien, valmisteiden kanssa.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Viljat, syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	Ei sallittu	Ei sallittu	15 m	5 m
Herne, papu ja peruna	Ei sallittu	20 m	10 m	5 m
Valko-, kukka-, ruusu- ja parsakaali	Ei sallittu	Ei sallittu	20 m	10 m
Omena ja päärynä	Ei sallittu	Ei sallittu	50 m	30 m

¹⁾ Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräys-pisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

KÄYTTÖOHJE

Mavrik® on laajatehoinen, pääosin kosketusvaikutteinen kasvinsuojeluaine, minkä vuoksi ruiskutusnesteen saattaminen tasaisesti kasvustoon on tärkeää valmisteen imeytymiseksi lehden pinnan vahakerrokseen. Riittävän tehon takaamiseksi ruiskutusneste on tärkeää saada kohteeseensa mahdollisimman hyvin.

Valmiste vaikuttaa estämällä tuhohyönteisten jänniteherkkien Na⁺-kanavien toimintaa hermokaloissa ja elektronien siirtymistä hermostossa, jolloin tuhohyönteinen lamaantuu ja kuolee.

Kasvi	Torjuttava tuhohyönteinen	Kasvuaste (BBCH)	Käyttömäärä L/ha	Käsitte-lyen lkm	Vesimäärä L/ha	Ruiskutusväli vrk	Huomioitavaa
Syys- ja kevätiljat keväällä	Kirvat, ripsiäiset, viljakukko	10 - 50	0,15 - 0,2	1 - 2	100 - 400	10 - 14	Max 2 käsittelyä
	Tähkä- ja vehnäsääski	41 - 59					
Syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrypsi	Rapsikuoriainen, rapsikirsäkäs, litusaäski, luteet	30 - 60	0,2	1 - 2	100 - 300	7	Max 2 käsittelyä
Herne ja papu	Juovahernekärsäkäs	10 - 19	0,2	1 - 2	100 - 300	14	Max 2 käsittelyä
	Herne- ja juurikaskirva, -ripsäinen ja -kääriäinen	50 - 71					
Peruna	Kirvat, koloradonkuoriainen erityisohjeiden mukaisesti ***	12 - 49	0,2	1 - 2	100 - 400	14	Max 2 käsittelyä
Valko-, kukka-, porsa- ja ruusukaali	Kaalikirva, rapsikuoriainen	10 - 49	0,3	1	200 - 400	-	Max 1 käsittely
Omena ja päärynä	Omena-, omenanratamo- ja omenankäärökirva, pihlajanmarjakoi	51 - 79	0,3	1	500 - 1000	-	Max 1 käsittely

***Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ely-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.

Ruiskutukseen käytetään vettä 100-400 L/ha kasvuston tiheyden ja tuholaisten olinpaikan mukaan. Omena- ja päärynätarhoissa vesimäärä on 500 - 1000 L/ha. Valmisteen tasaiseen leviämiseen on kiinnitettävä huomiota valitsemalla tarkoitukseen parhaiten sopiva suutin ja paine.

TORJUNNAN KYNNYSARVO

Rypsi ja rapsi

Rapsikuorianen: 1 kuoriainen/kasvi varhaisella nuppuasteella, 2-3 kuoriaista/kasvi vähän ennen kukintaa.

Rapsikärsäkäs: ennen kukintaa 1 kärsäkäs/4 kasvia.

Litusääski: 0,5-2 sääskeä/kasvi. Sääsket munivat kehittyvän lidun sisään rapsikärsäkkään tekemien reikien kautta, joten kärsäkkäiden torjunta vähentää myös litusääsken aiheuttamia tuhoja.

Viljat

Viljan kirvat: Viljan kirvojen torjunnassa kirvojen tullessa kasveihin. Valmistetta käytetään tuomikirvojen torjuntaan vain, jos viruslevinnän vaara on ilmeinen.

Vehnän sääsket: Torjunnan kynnyсарvo on 1 sääski/6-7 tähkää. Uusintakäsittely tarvittaessa 4-5 vrk:n kuluttua.

Käsittele kasvusto tuholaisoireiden alkaessa tai torjuntakynnyksen ylittyessä.

Herne ja papu

Hernekääriäinen: Torjunta kukinnan aikana klo 22 ja 06 välillä. Torjunnan ajoitus ja tarve tuokkiin kohdistuen arvioidaan feromonipyydysten avulla. Ohjeellinen torjunnan kynnyсарvo ruokaherneen tuotannossa on vähintään 10 kääriäistä/pyydys ja tuoreherneen tuotannossa vähintään 3 kääriäistä/pyydys kahtena peräkkäisenä tarkastuskertana. Valmistetta ei käytetä herneellä yksinomaan hernekivan torjuntaan.

Kaalit

Rapsikuoriainen: kukkakaalilla tarkkailun perusteella kukinnan aikaan ensimmäisen sadon valmistuessa varoaika huomioiden.

Omena ja päärynä

Torjunta tarkkailutietojen perusteella.

RUISKUTUSNESTEEN VALMISTUS

Tankki täytetään puolilleen vedellä ja Mavrik®-valmiste sekä loput vedestä lisätään sekoittajan käydessä. Tankkiseosta käytettäessä tankki täytetään puolilleen vedellä, annetaan sekoittajan käydä koko ajan, lisätään Mavrik® -valmiste, mahdolliset muut valmisteet ja loput vedestä.

SEKOITETTAVUUS

Mavrik® -valmiste voidaan ruiskuttaa samanaikaisesti useiden rikkakasvi- ja kasvitautientorjunta-aineiden ja liuosmaisten kasviravinteiden kanssa, lukuun ottamatta ureaa.

Kun seoksessa on boori-lannoitteita, vettä tulee käyttää vähintään 200 L/ha. Tällöin Mavrik® -valmiste sekoitetaan miltei täyteen vesimäärään ja boorilannoite lisätään ruiskutusnesteeseen viimeisenä. Sakkaantumisriski on korkein, kun veden pH on korkea.

Ruiskutusneste tulee käyttää heti seoksen tekemisen jälkeen

HUOMAUTUKSET

Torjunta tulee tehdä torjunnan kynnysarvojen mukaisesti, vain optimaalisissa olosuhteissa ja parasta ruiskutustekniikkaa käyttäen. Valmiste ei ole herkkä UV-säteilylle, joten auringon valo ei nopeuta sen hajoamista.

Valmiste on säilytettävä alkuperäispakkauksessa -10. ja + 30 asteen välillä olevassa lämpötilassa. Älä valmistaa ruiskutusnestettä enempää kuin on tarve.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 11.7.2017.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Karenstid i kål, gröna ärter och potatis sju dagar, och i torkade ärter och bönor 14 dagar, spannmål, äpplen och päron 30 dagar, höst- och vårrybs, höst- och vårraps 60 dagar. För blomkål beräknas karenstiden från första skördeomgången.

Preparatet får inte användas för oljeväxter senare än i början av blomningen. I äpple, päron, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål får preparatet endast användas en gång, i andra växtslag upp till två gånger under växtsäsongen.

HANTERING AV RESISTENS

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt resistenshantering vid användningen av preparatet (aktiv beståndsdel grupp 3A, pyretroider) och därför bör antalet behandlingar minimeras genom att alternera med andra preparat med andra verkningssätt (MoA) och som hör till en annan grupp av verksamma substanser.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigtt väder. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som är begränsade till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Gröda	Munstycke			
	Spaltspridar	Avdriftsreducerande munstycke ¹⁾		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps	Ej tillåtet	Ej tillåtet	15 m	5 m
Ärter, bönor och potatis	Ej tillåtet	20 m	10 m	5 m
Vitkål, blomkål, brysselkål och broccoli	Ej tillåtet	Ej tillåtet	20 m	10 m
Äpple och päron	Ej tillåtet	Ej tillåtet	50 m	30 m

¹⁾ Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vesitorajoitus. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

BRUKSANVISNING

Mavrik® är ett, övervägande kontaktverkande växtskyddsmedel med bred effekt. Därför är det viktigt att ha en god täckning av växtdelarna för att produkten ska absorberas i vaxlagret. För att säkerställa tillräcklig effekt är det viktigt att sprutvätskan tränger så långt in i grödan som möjligt.

Produkten fungerar genom att blockera aktiviteten hos de spänningsskänliga Na⁺-kanalerna i skadeinsekternas centrala nervsystem och elektronmigrationen i nervsystemet, vilket orsakar förlamning och död hos insekterna.

Vegetabiliska	Vegetabiliska	Utvecklingsstadium (BBCH)	Den använda mängden av L/ha	Antal behandlings	Vattenmängd L/ha	Sprutintervall per dag	Anmärkningar
Höst- och vårsäd på våren	Blidlöss, tripsar, sädesbladbagge	10 - 50	0,15 - 0,2	1 - 2	100 - 400	10 - 14	Max 2 behandlings
	röda vetemygga och gula vetemygga	41 - 59					
Höst och vår rybs, höst- och vårraps	Rapsbagge, rapsvivel, skidgallmygga, ängsstinkfly	30 - 60	0,2	1 - 2	100 - 300	7	Max 2 behandlings
Ärt och böna	Randig ärtvivel	10 - 19	0,2	1 - 2	100 - 300	14	Max 2 behandlings
	Ärt- och betbladlöss, trips och stritar	50 - 71					
Potatis	Blidlöss, koloradoskalbaggar enligt speciella instruktioner ***	12 - 49	0,2	1 - 2	100 - 400	14	Max 2 behandlings
Vit-, blom- och brysselkål, broccoli	Kålbladlus, rapsbaggar	10 - 49	0,3	1	200 - 400	-	Max 1 behandlings
Äpple och päron	Äppel- och andra typer av bladlöss, rönnsbärsmal	51 - 79	0,3	1	500 - 1000	-	Max 1 behandlings

*** Fynd av koloradoskalbaggar skall omedelbart anmälas till Ely-centrumets landsbygdsenergienhet eller Livsmedelssäkerhetsmyndigheten Evira, som ska fastställa åtgärderna för destruktion av skalbaggar. (I Sverige: Kontakta Länsstyrelsen eller Jordbruksverket om du hittar fullvuxna koloradoskalbaggar, ägg eller larver. Döda uppsamlade insekter med kokande vatten)

Vattenmängden är vid besprutning från 100 - 400 L/ha beroende på beståndets täthet och skadejurens placering på växterna. I äpplen och päron är mängden vatten mellan

500-1000 L/ha. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa jämn spridning av preparaten genom att välja munstycket och trycket som passar bäst för ändamålet.

TRÖSKELVÄRDEN VID BEKÄMPNING

Rybs och raps

Rapsbagg: 1 skalbagge/växt vid tidigt angrepp, 2-3 skalbaggar/växt kort före blomningen.

Rapsvivel: före blomning 1 vivel/4 växter.

Skidgallmygga: 0,5-2 myggor/växt. Myggen lägger ägg i hålen som viveln orsakar, så genom vivelbekämpning minskar också skadorna som orsakas av skidgallmygga.

Spannmål

Sädesbladlus: Vid bekämpning av bladlöss i spannmål då bladlöss börjat förekomma på växterna. För bekämpning av häggbladlus endas om uppenbar risk finns för spridning av virus. Vetemygga: Tröskelvärdet är 1 mygga/6 till 7 ax. Upprepa behandlingen efter 4-5 dagar.

Behandla grödan när symptom för angrepp av skadeinsekter uppstår eller då bekämpningströskeln överskrids.

Ärt och böna

Ärtvecklare: Bekämpning under blomningen mellan kl. 22 och 06. Bekämpningstidpunkt och behovet av bekämpning av larverna beräknas med hjälp av feromonfällor. Det vägledande tröskelvärdet för bekämpning i produktionen av matärt är minst 10vecklare per fälla och i produktionen av gröna ärtar minst 3vecklare per fälla i två på varandra följande inspektioner.

Preparatet används inte i ärtan enbart för bekämpa ärtbladlus.

Kål

Rapsbagg: på blomkål genom observation vid blomningstid när den första skörden är på gång att bli klar att sköras med iakttagande av karenstiden.

Äpple och päron

Bekämpning baserad på observationsdata.

FRAMSTÄLLNING AV SPRUTVÄTSKA

Tanken fylls till hälften med vatten och Mavrik® samt resten av vattnet tillsätts medan blandaren är påslagen. Vid framställning av tankblandning fylls tanken till hälften med vatten, blandaren får gå hela tiden, tillsätts Mavrik®, de övriga preparaten och den resterande mängden vatten.

BLANDBARHET

Mavrik® preparatet kan appliceras samtidigt med ett antal herbicider, fungicider och flytande växtnäringsämnen, med undantag av urea.

Om det finns borgödsel i blandningen ska minst 200 l/ha vatten användas. I detta fall blandas Mavrik®-preparatet med större delen vatten och borgödseln tillsätts efteråt i

den nästan fulla mängden av sprutvätska. Den högsta risken för sedimentering är när vattnets pH är högt. Sprutvätskan bör användas omedelbart efter blandning.

ANMÄRKNINGAR

Bekämpning bör utföras utgående från gränsvärden för bekämpning, endast under optimala förhållanden och med bästa sprutteknik. Preparatet är inte känsligt för UV-strålning, så solljus accelererar inte dess nedbrytning.

Preparatet ska förvaras i originalförpackningen vid en temperatur mellan - 10 °C och + 30 °C. Blanda inte till mer sprutvätska än nödvändigt.

Säkerhets- och kemikaliemyndigheten (Tukes) har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel den 11.07.2017.

MAVRIK®

Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel

Tehoaine / Aktiv substans:
tau-fluvalinaatti 240 g/L / tau-fluvalinat 240 g/L
Valmistetyyppi / Preparattyp: EW
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: IRAC 3A
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä
/ Tillverkningspartiets nummer och
tillverkningsdag:
näytä pakkauksessa / se förpackning.

Rekisterinnumero / Registreringsnummer: 1850
Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

® ADAMA Makhteshim Ltd.

12 x 1 L



ADAMA


97100081S/201810

ANEMAVF11LT/02/C1

MAVRIK®

MAVRIK®

Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel



Tehoaine / Aktiv substans:

tau-fluvalinaatti 240 g/L / tau-fluvalinat 240 g/L

Valmistetyyppi / Preparattyp: EW

Vaikutustapa / Verkningsmekanism: IRAC 3A

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä /

Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdag:

näytä pakkauksessa / se förpackning.

Rekisterinnumero / Registreringsnummer: 1850

Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK Leusden

Hollanti / Nederländerna

www.adama.com

©ADAMA Makhteshim Ltd.

12 x 1 L

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Användargrupp: Endast för yrkesbruk

Användningsändamål

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärtor, bönor, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

VAROITUS

Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNINGAR

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen



Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.



8 718077 003368 >

UN 3082



FINLAND

97100081FX/201810


ANEMAVFI11LT/02/C1

MAVRIK®



FINLAND

33 x 12 L



ANEMAVFILT/02/X
97100081M/201810

ADAMA
NORTHERN EUROPE B.V.