

MEDIFAM 320 SC

Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä. Käyttömäärät eri kasveille löytyvät käyttöohjeen taulukosta.

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor.



Tehoaine / Aktiv substans:

Fenmedifaami 320 g/L

sisältää myös 1,2-Bentsisotiatzoli-3(2H)-onia

Fenmedifam 320 g/L

innehåller också 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Valmistetyyppi / Preparattyp: SC

Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:

Näytä pakkauksesa / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2834

Rekisteröinin haltija / Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

3830 AK Leusden

Hollanti/Nederländerna

www.adama.com

5 L e

MEDIFAM 320 SC



Rikkakasvien torjuntaan/ Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjäröhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.

Användningsgrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

VAARA:

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Erittäin myrkyllistä vesiliöille,

pitkäaikaista hättävöikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Käytä suojakäsineitä/

suojaavaatetusta/ silmiensuoj

ainta/kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU

SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista

piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Jatka huuhtomista.

Ota välittömästi yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Naudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Sisältää 1,2-bentsisotiasol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.



FARA:

Orsakar allvarliga ögonskador.

Mycket giftigt för vattenlevande

organismer med långtidseffekter.

Förvaras öätkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Samla upp spill.

För att undvika risker för

människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalikestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga handskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som förorsakar fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd användas och vid arbetssituationer som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.



UN 3082



FINLAND

ANEMEDFIL/02/B
52870A/05



MEDIFAM 320 SC



Rikkakasvien torjuntaan/ Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ei punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.

Användningsgrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

VAARA:

Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Erittäin myrkyllistä vesiliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.

Käytä suojakäsineitä/
suojavaatteetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU
SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhottamista.

Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKukseen tai lääkäriin.
Välumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Sisältää 1,2-bentsisotiasol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.



FARA:

Orsakar allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Förvaras oätkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddsskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja.

Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare.

Samla upp spill.
För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-(2H)-on. Kan ge
upphov till allergisk reaktion

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita,
suojapukua, kemikaalikestäviä suojakäsineitä (esim.
nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa
työväiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien
suojainta ja hengitystiet altistavissa työväiheissa
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar,
kemikaliebäständiga handskar (t.ex. av nitril) och
huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som förorsakar
fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd
användas och vid arbetssituationer som exponerar
andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter
P2/A2 användas.



8 718077 006123 >

UN 3082



FINLAND

KÄYTTÖTARKOITUS

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaineen käytössä pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II) on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaa on läpäisevää maalajia (HHT tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta käyttää enintään joka toinen vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella.
- Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaan maalaji on HHT:ä hienojakoisempaa, tai jos ruiskutuksessa käytetään riviruiskua, voidaan valmistetta käyttää tarvittaessa joka vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella.
- Salaojittamattomilla pelloilla valmistetta ei saa käyttää.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTTÖOHJE

Sokerijuurikas:

Medifam 320 SC:tä voidaan käyttää tankkiseoksena metamitroni -valmisteiden (esim. Goltixit, KVK-meta, Meta), etofumesaatti -valmisteiden (esim. Tramet 500 SC) ja triflusalufuroni-metyyli -valmisteiden (esim. Safari) kanssa 2-3 ruiskutuksena. Tankkiseoksiin tarvitaan aina PowerOil -öljyä.

Kevyet kivennäismaat:

Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Käytä tankkiseokseen Medifam 320 SC:tä 0,8–1,0 L/ha, etofumesaatti -valmistetta 0,1–0,2 (–0,3) L/ha ja

metamitroni -valmistetta 1,0–1,5 L tai kg/ha. PowerOil -öljyn määrä ensimmäisessä ruiskutuksessa on 0,5–1,0 (–1,5) L/ha. Toinen ruiskutus tehdään 7–10 vrk:n kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta. Medifam 320 SC:tä käytetään 1,0–1,2 L/ha, etofumesaatti -valmistetta 0,2–0,3 (–0,4) L/ha, metamitroni -valmistetta (0,8–1,0 L tai kg/ha) sekä PowerOil -öljyä 0,5–1,0 (–1,5) L/ha.

Kolmas ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käyttömäärät ovat samat kuin toisessa ruiskutuksessa.

Savi- ja multamaat:

Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Käytä tankkiseokseen Medifam 320 SC:tä 1,0–1,2 L/ha, metamitroni -valmistetta 1,0–1,5 L tai kg/ha, etofumesaatti -valmistetta 0,2–0,3 (–0,4) L/ha ja PowerOil -öljyä 1,0–1,5 (–2,0) L/ha.

Toinen ruiskutus tehdään 7–10 vrk:n kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta. Medifam 320 SC:tä käytetään 1,2–1,5 L/ha. Tankkiseosta täydennetään etofumesaatti -valmistella 0,3–0,4 (–0,5) L/ha sekä metamitroni -valmistella (0,8–1,0 L tai kg/ha). PowerOil -öljyn määrä ruiskutuksessa on 1,0–1,5 (–2,0) L/ha.

Kolmas ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käyttömäärät ovat samat kuin toisessa ruiskutuksessa.

Huomautus 1: Jos rikkakasvistossa on runsaasti saunioita, linnunkaalia, rusokkia, ukontatarta ja/tai ristikukkaisia rikkakasveja kuten rypsiä, rapsia, lutukkaa ja peltotaskuruohoa, metamitroni -valmisteen määrä on 0,5 L tai kg/ha ja tankkiseokseen lisätään triflusuulfuroni-metyyliä (Safari 20–30 g/ha).

Huomautus 2: PowerOil -öljyn määrä on suhteutettava ruiskutusoloihin. Pienempiä öljymääriä käytetään hyvissä ruiskutusoloissa ja suurempia kuivissa ja viileissä oloissa. Suurimmat suluissa merkityt öljymääriä käytetään vain kuivissa ja kylmissä olosuhteissa (lämpötila noin +10 °C).

Huomautus 3: Etofumesaatti -valmisteen suurinta suluissa merkittyä määrää käytetään vain runsaasti tattareita (pihatatar, kiertotatar, ukontatar) ja mataraa sisältävälle rikkakasvistolle.

Huomautus 4: Medifam 320 SC:tä voidaan käyttää myös täydentävänä ruiskutuksena etofumesaatin ja/tai triflusuulfuroni-metyylin kanssa (0,1–0,2 L/ha). Tällöin käyttömäärä kevyillä kivennäismailla on 1,0–1,5 L/ha ja savi- ja multamailla 1,5–2,0 L/ha. Tankkiseokseen on lisättävä PowerOil -öljyä 0,5–1,0 L/ha.

Vesimäärä ruiskutuksissa on 150–200 L/ha.

Punajuurikas:

Kahden ruiskutuksen ohjelma

Kun Medifam 320 SC:tä käytetään yksin, käyttömäärä kummassakin ruiskutuksessa on 1,25 -1,5 L/ha + PowerOil -öljy 0,5 - 1,0 L/ha. Ensimmäinen ruiskutus tehdään, kun punajuurikas ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käsittely uusitaan, kun rikkakasvit ovat uudelleen sirkkalehtiasteella. Tehon laajentamiseksi on suositeltavampaa käyttää tankkiseosta metamitronivalmisteiden kanssa seuraavasti.

Ensimmäinen ruiskutus tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Käytä tankkiseosta Medifam 320 SC kevyillä kivennäismailla 0,75 -1,0 L/ha ja savi- ja multamailla 1,0 -1,25 L/ha + metamitronivalmiste 0,5 -1,0 L/ha + PowerOil öljy 0,5 -1,0 L/ha.

Toinen ruiskutus tehdään 7 -10 vrk:n kuluttua samoilla käyttömäärillä kuin ensimmäinen ruiskutus.

Mansikka:

Käsittely tehdään rikkakasvien ollessa enintään 2-lehtiasteella.

Medifam 320 SC:n käyttömäärä on 1,5 L/ha. Mansikan ruiskutusnesteeseen ei suositella sekoitettavaksi kiinniteöljyä. Käsittely uusitaan tarvittaessa 1-2 viikon kuluttua. Käytä Medifam 320 SC -valmistetta uusilla istutuksilla taimien juurruttua, satoa tuottavilla viljelyksillä viimeistään mansikan kukinnan alussa ja/tai sadonkorjuun jälkeen. Valmistetta voi käyttää myös muovikateviljelyksillä.

RUISKUTUSNESTEEN VALMISTUS

Ravistettava ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään sekoituspumpun käydessä. Tankkiseosta tehtäessä sekoitetaan veteen ensin Medifam 320 SC, etofumesaatti- tai seosvalmiste, triflusalufuroni-metyyli -valmiste ja sen jälkeen metamitronivalmiste. Käytettäessä Medifam 320 SC:tä seoksena muiden aineiden kanssa on otettava huomioon niiden käytöstä annetut ohjeet. Biologinen PowerOil - lisätään ruiskun säiliöön viimeiseksi.

HUOMAUTUKSET

Vaarallista muille viljelykasveille.

Medifam 320 SC vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15°C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Kuivissa oloissa voi teho jäädä heikoksi. Suuriin (enemmän kuin kaksi kasvulehteä) rikkakasveihin valmisteeseen teho on riittämätön. Ei tehoa juuririkkakasveihin.

Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia taimipolteen, hyönteisvioletuksen, huonojen kasvuolosuhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet.

Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä. Hellepäivänä ruiskutus on tehtävä aikaisin aamulla. Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankaran hallan jälkeen on odotettava 2-3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa.

Kiinniteöljy parantaa tehoa rikkakasveihin etenkin kylmissä oloissa, mutta lisää vointuriskii yli +20 °C lämpötiloissa. Käytä öljyä sitä vähemmän mitä korkeampi on lämpötila. Punajuurikas on herkempi vointuksille kuin sokerijuurikas.

Suojattava pakkaselta.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 16.11.2005.

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe.

FÖRHINDRANDE AV SKADOR I MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Vid användning av bekämpningsmedlet på grund-vattenområden (grundvattenklasserna I och II) bör följande råd efterföljas:

- På täckdikade åkrar, vars bottenjord är en genomsläpplig jordart (finmo eller grövre), kan preparatet användas högst vart annat år med lägsta möjliga dosering.
 - På täckdikade åkrar, på vilka bottenjordens jordart är mera finfördelad än hos finmo, eller om man använder en radspruta, kan preparatet vid behov användas varje år med lägsta möjliga dosering.
 - På åkrar som inte är täckdikade får preparatet inte användas.
- Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna en minst 30 - 100 meter bred obehandlad skyddszon.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomta, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständig handskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer som förorsakar fara för stänk bör dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd användas och vid arbetssituationer som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

BRUKSANVISNING

Sockerbeta:

Medifam 320 SC kan användas i tankblandning med metamitron-preparat (t.ex. Goltix WG/SC, KVK-meta, Meta), etofumesat-preparat (t.ex. Tramet 500 SC) och med triflusalufuron-metyl-preparat (t.ex. Safari) som 2 - 3 besprutningar. Till tankblandningar behövs alltid PowerOil-olja.

Lätta mineraljordar:

Den första besprutningen görs då ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Använd till en tankblandning Medifam 320 SC 0,8-1,0 L/ha, ett etofumesat-preparat 0,1-0,2 (-0,3) L/ha och ett met amitron-preparat 1,0-1,5 l eller kg/ha. Mängden PowerOil-olja vid den första besprutningen är 0,5-1,0 (-1,5) L/ha.

Den andra besprutningen görs 7-10 dygn efter den första besprutningen. Medifam 320 SC används 1,0-1,2 L/ha, ett etofumesat-preparat 0,2-0,3 (-0,4) L/ha och ett met amitron-preparat 0,8-1,0 L eller kg/ha samt PowerOil-olja 0,5-1,0 (-1,5) L/ha.

Den tredje besprutningen görs vid behov, då nya ogräs är vid hjärtbladstadiet. Bruksmängderna är desamma som vid den andra besprutningen.

Ler- och mulljordar:

Den första besprutningen görs då ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Använd till en tankblandning Medifam 320 SC 1,0-1,2 L/ha, ett met amitron - preparat 1,0-1,5 L eller kg/ha, ett etofumesat-preparat 0,2-0,3 (-0,4) L/ha samt PowerOil -olja 0,5-1,0 (-1,5) L/ha.

Den andra besprutningen görs 7-10 dygn efter den första besprutningen. Medifam 320 SC används 1,2-1,5 L/ha. Tankblandningen kompletteras med ett etofumesatpreparat 0,3-0,4 (-0,5) L/ha och med ett met amitron -preparat 0,8-1,0 l eller kg/ha. Mängden PowerOil -olja vid besprutningen är 0,5-1,0 (-2,0) L/ha.

Den tredje besprutningen görs vid behov, då nya ogräs är vid hjärtbladstadiet. Bruksmängderna är desamma som vid den andra besprutningen.

Anmärkning 1: Om det i ogräsfloran ingår rikligt med kamomill eller baldersbrå, harkål, brunskåra, åkerpilört och/eller korsblomstriga ogräs såsom rybs, raps, lomme och penningört, är mängden met amitron - preparat 0,5 L eller kg/ha och till tankblandningen tillsätts triflusalufuron-metyl (Safari 20-30 g/ha).

Anmärkning 2: Dosen av PowerOil -olja bör stå i relation till besprutningsförhållandena. De mindre mängderna olja används vid goda besprutningsförhållanden och de större vid torra och svala förhållanden. De största mängderna olja, satta inom parenteser, används endast vid torra och kalla förhållande (temperaturen ca +10 °C).

Anmärkning 3: Den största mängden etofumesat - preparat, satt inom parentes, används endast för ogräsfloror som innehåller rikligt med Polygonum-arter (trampört, åkerbinda, åkerpilört) och måra.

Anmärkning 4: Medifam 320 SC kan också användas som kompletterande besprutning tillsammans med etofumesat och/eller triflusalufuron-metyl

(0,1-0,2 L/ha). I detta fall är bruksmängden på lätta mineraljordar 1,0-1,5 L/ha och på ler- och mulljordar 1,5-2,0 L/ha.

Till tankblandningen bör tillsättas PowerOil-olja 0,5-1,0 L/ha.

Vattenmängd vid besprutningen är 150-200 L/ha.

Rödbeta:

Program med två besprutningar

Då Medifam 320 SC används ensamt för sig är bruksmängden vid vardera besprutningen 1,25-1,5 L/ha samt PowerOil-olja 0,5-1,0 L/ha. Den första besprutningen görs då rödbetan och ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Behandlingen förnyas då ogräsen på nytt är vid hjärtbladstadiet. För att man skall få en bredare effekt rekommenderas det hellre att man använder en tankblandning med metamitronpreparat på följande sätt.

Den första besprutningen görs då ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Använd tankblandningen Medifam 320 SC på lätta mineraljordar 0,75-1,0 L/ha och på ler och mulljordar 1,0-1,25 L/ha + ett metamitronpreparat 0,5-1,0 L/ha + PowerOil-olja 0,5-1,0 L/ha.

Den andra besprutningen görs efter 7-10 dygn med samma bruksmängder som vid den första besprutningen.

Jordgubbe:

Behandlingen görs då ogräsen är högst vid 2-bladstadiet.

Bruksmängden för Medifam 320 SC är 1,5 L/ha. Det rekommenderas att man inte tillsätter fästolja till sprutvätskan för jordgubbe. Behandlingen förnyas vid behov efter 1-2 veckor. Använd preparatet Medifam 320 SC på nya planteringar då plantorna har rotat sig, på skördebringande odlingar senast vid början av jordgubbens blomning och/eller efter skörden. Preparatet kan även användas för odlingar på plast.

FRAMSTÄLLNING AV SPRUTVÄTSKA

Omskakas före användningen. Spruttanken fylls först till hälften, varefter medlet tillsätts under det att omrörningspumpen hålls påslagen. Vid framställning av en tankblandning inblandas i vattnet först Medifam 320 SC, etofumesat- eller blandningspreparat, triflusulfuron-metyl-preparat och efter det metamitronpreparat. Då man använder Medifam 320 SC i blandning med andra medel bör man ta i beaktande råden som getts om användningen av dessa medel. Den biologiska PowerOil-oljan tillsätts till sist till spruttanken.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för andra odlingsväxter.

Medifam 320 SC verkar mot ogräsen via bladen. Den bästa effekten mot ogräsplantorna fås vid en temperatur över +15 °C vid goda fuktförhållanden. Vid torra förhållanden kan effekten förbli svag. Mot stora (mera än två växtblad) ogräs är preparatets effekt otillräcklig. Har ingen effekt mot rotogräs. Om odlingsväxtens plantor är i dålig kondition på grund av groddbrand, insektsskador, dåliga tillväxtförhållanden eller av någon annan orsak, bör besprutningen uppskjutas till dess plantorna har repat sig. Det rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen. Dagar med varmt väder bör besprutningen göras tidigt på morgonen. Då stark nattfrost hotar bör besprutningarna framskjutas. Efter stark nattfrost bör man vänta 2-3 dygn innan man kan bespruta. Fästoljan förbättrar effekten mot ogräs speciellt vid kalla förhållanden, men ökar risken för skador vid temperaturer över +20 °C. Använd desto mindre av oljan ju högre temperaturen är. Rödbeta är känsligare för skador än sockerbeta.

Skyddas mot kyla.

Tillverkaren ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmälts, då pre-paratet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Vädret, växtbeståndets skick och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat. Tillverkaren ansvarar inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.

Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet att användas som bekämpningsmedel 16.11.2005

MEDIFAM 320 SC

Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä. Käyttömäärät eri kasveille löytyvät käyttöohjeen taulukosta.

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor.

Tehoaine / Aktiv substans:

Fenmedifaami 320 g/L
sisältää myös 1,2-Bentsisotiatoli-3(2H)-onia
Fenmedifam 320 g/L
innehåller också 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Valmistetyyppi / Preparattyp: SC

Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
Näytä pakkauksesa / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2834

Rekisteröinin haltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden
Hollanti/Nederländerna
www.adama.com

4 x 5 L



ADAMA

ANEMEDF15LT/02/C1
T28/0C/05

Medifam 320 SC

MEDIFAM 320 SC

Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä. Käyttömäärät eri kasveille löytyvät käyttöohjeen taulukosta.

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta och rödbeta samt i odlingar av jordgubbe. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor.



Tehoaine / Aktiv substans:

Fenmedifaami 320 g/L
sisältää myös 1,2-Bentsisotiasoli-3(2H)-onia
Fenmedifam 320 g/L
innehåller också 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Valmistetyyppi / Preparattyp: SC

Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
Näytä pakkauksessa / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2834
Rekisteröinin haltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden
Hollanti/Nederländerna
www.adama.com

4 x 5 L


Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä mansikkaviljelyksiltä.

VAARA:

Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Erittäin myrkyllistä vesiliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvosuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtamista.
Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien
vaarojen välttämiseksi.
Sisältää 1,2-bentsisotiasol-3(2H)-oni. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.



FAARA:

Orsakar allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare.
Samla upp spill.
För att undvika risker för människors hälsa
och för miljön, följ bruksanvisningen.
Innehåller 1,2-benzisotiazol- (2H)-on. Kan
ge upphov till allergisk reaktion.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä
kumisaappaita, suojapukua, kemikaalinkestäviä
suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.
Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on
käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta
ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2
suodattimella.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt,
gummistövlar, kemikaliebeständiga handskar
(t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. Vid
arbetssituationer som förorsakar fara för stänk bör
dessutom ansiktsskydd eller ögonskydd användas och
vid arbetssituationer som exponerar andningsvägarna
bör andningsskydd försett med filter
P2/A2 användas.



UN 3082



FINLAND

MEDIFAM 320 SC



FINLAND

30 x 20 L



8 718077 009995 >

ADAMA

Northern Europe B.V.



ANEMEDFI5LT/02/X
T2870P/05