



© ADAMA Makhteshim Ltd.

ADAMA



TUHOELÄINTEN TORJUNTAAN/INSEKTICID

Valmistetyyppi: EW
Preparattyp: EW



Tehoaine/Verksammasämne:

- Tau-fluvalinaatti/tau-fluvalinat 240 g/L



Tiedot/Information

Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti/Nederländerna
www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:
näytä pakkauksesa/Tillverkningspartiets
nummer och tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannataan käytettäväksi /
Scanna för användning

TRACEABILITY PRINTING
51/58 x 27 mm

1Le

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevättrypsilta, syys- ja kevättrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Valumat on kerättävä. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä, (esim. nitrili) ja päähinettä.

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, örter, bönor, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli, brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Samla upp spill. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.

123191IPWB_01



VAROITUS
VARNING



FINLAND/

UFI: TFPR-PC9D-1V06-NXQD

UN3082

TUHOELÄINTEN TORJUNTAAN
INSEKTICID

3A

VAIKUTUSTAPA
VERKNINGSMEKANISM



8 718077 016238

Käyttäjärhmä: Ammattikäyt-täjät

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruu-sukaalilta, omenalta ja pääry-nältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoas-taan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Valumat on kerättävä. Noudata käyttöohjeita ihmi-sen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä, (esim. nitrili) ja päähinettä.

Användargrupp: Yrkesanvänd-ning

Användningsändamål:

Bekämpning av i bruksanvis-ningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, örter, örter, örter, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli, brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.

TOXICITY



SUOMI

KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varo aika kaaleilla, tuoreella herneellä ja perunalla 7 vrk, kuivatulla herneellä ja pavulla 14 vrk, viljoilla, omenalla ja päärynällä 30 vrk, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrapsilla 60 vrk. Kukkakaalilla varo aika lasketaan ensimmäisestä keruusta.

Valmisteen myöhäisin käyttöajankohta on öljykasveilla kukinnan alkaessa. Omenalle, päärynälle, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalille valmistetta saa käyttää kerran, muilla kasveilla korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.

RESISTENSSIN HALLINTA

Valmisteen (tehoaineryhmä 3A, pyretroidit) käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota resistenssinhallintaan ja sen takia käsittelyjen määrä on minimoitava vuorottelemalla käyttöä muiden, vaikutustavaltaan (MoA) eri tehoaineryhmään kuuluvien, valmisteiden kanssa.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Viljat, syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	Ei sallittu	Ei sallittu	15 m	5 m

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Herne, papu ja peruna	Ei sallittu	20 m	10 m	5 m
Valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, ruusu- ja parsakaali	Ei sallittu	Ei sallittu	20 m	10 m
Omena ja päärynä	Ei sallittu	Ei sallittu	Ei sallittu	30 m

1)Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräys-pisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

KÄYTTÖOHJE

Mavrik on laajatehoinen, pääosin kosketusvaikutteinen kasvinsuojeluaine, minkä vuoksi ruiskutusnesteen saattaminen tasaisesti kasvustoon on tärkeää valmisteen imeytymiseksi lehden pinnan vahakerrokseen. Riittävän tehon takaamiseksi ruiskutusneste on tärkeää saada kohteeseensa mahdollisimman hyvin.

Valmiste vaikuttaa estämällä tuhohyönteisten jänniteherkkin Na+-kanavien toimintaa hermokalvoissa ja elektronien siirtymistä hermostossa, jolloin tuhohyönteinen lamaantuu ja kuolee.

Kasvi	Torjuttava tuohyönteinen	Kasvuaste (BBCH)	Käyttömäärä L/ha	Käsitlelyjen lkm	Vesimäärä L/ha	Ruiskutusväli vrk	Huomioitavaa
Syys- ja kevätviljat keväällä	Kirvat, ripsiäiset, viljakukko	10 – 50	0,15 -0,2	1 -2	100 – 400	10 -14	Max 2 käsittelyä
	Tähkä- ja vehnäsäski	41 - 59					
Syys- ja kevät-rypsi, syys- ja kevättrapsi	Rapsikuoriainen, rapsikärsäkäs, litusäski, luteet	30 – 60	0,2	1 – 2	100 – 300	7	Max 2 käsittelyä

Kasvi	Torjuttava tuho- hyönteinen	Kasvuaste (BBCH)	Käyttö- määrä L/ha	Käsitte- lyjen lkm	Vesimäärä L/ha	Ruiskutus- väli vrk	Huomioita- vaa
Herne ja papu	Juovaherne-kärsä- käs	10 - 19	0,2	1 - 2	100 - 300	14	Max 2 käsit- telyä
	Herne- ja juurikas- kirva, -ripsinäinen ja -kääriäinen	50 - 71					
Peruna	Kirvat, kolora- don-kuoriainen erityisohjeiden mu- kaaisesti ***	12 - 49	0,2	1 - 2	100 - 400	14	Max 2 käsit- telyä
Valko-, puna-, suippo-, savoi- jin-, kukka-, parsa- ja ruu- sukaali	Kaalikirva, rapsi- kuoriainen	10 - 49	0,3	1	200 - 400	-	Max 1 käsit- tely
Omena ja pää- rynä	Omena-, omenan- ratamo- ja ome- nankäärö-kirva, pihlajanmarjakoi	51 - 79	0,3	1	500 - 1000	-	Max 1 käsit- tely

*** Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ely-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.

Ruiskutukseen käytetään vettä 100-400 L/ha kasvuston tiheyden ja tuholaisten olinpaikan mukaan. Omena- ja päärynätarhoissa vesimäärä on 500 - 1 000 L/ha. Valmisteen tasaiseen leviämiseen on kiinnitettävä huomiota valitsemalla tarkoitukseen parhaiten sopiva suutin ja paine.

TORJUNNAN KYNNSARVOT:

Rypsi ja rapsi

Rapsikuorianen: 1 kuoriainen/kasvi varhaisella nuppuasteella, 2-3 kuoriaista/kasvi vähän ennen kukintaa.

Rapsikärsäkäs: ennen kukintaa 1 kärsäkäs/4 kasvia.

Litusääski: 0,5-2 sääskeä/kasvi. Sääsket munivat kehittyvän lidun sisään rapsikärsäkkään tekemien reikien kautta, joten kärsäkkäiden torjunta vähentää myös litusääsken aiheuttamia tuhoja.

Viljat

Viljan kirvat: Viljan kirvojen torjunnassa kirvojen tullessa kasveihin. Valmistetta käytetään tuomikirvojen torjuntaan vain, jos viruslevinnän vaara on ilmeinen.

Vehnän sääsket: Torjunnan kynnsarvo on 1 sääski/6-7 tähkää. Uusintakäsittely tarvittaessa 4-5 vrk:n kuluttua.

Käsittele kasvusto tuholaismoireiden alkaessa tai torjuntakynnyksen ylittyessä.

Herne ja papu

Hernekääriäinen: Torjunta kukinnan aikana klo 22 ja 06 välillä. Torjunnan ajoitus ja tarve toukuihin kohdistuen arvioidaan feromonipyydysten avulla. Ohjeellinen torjunnan kynnsarvo ruokahermeen tuotannossa on vähintään 10 kääriäistä/pyydys ja tuorehermeen tuotannossa vähintään 3 kääriäistä/pyydys kahtena peräkkäisenä tarkastuskertana.

Valmistetta ei käytetä herneellä yksinomaan hernekivan torjuntaan.

Kaalit

Rapsikuoriainen: kukkakaalilla tarkkailun perusteella kukinnan aikaan ensimmäisen sadon valmistuessa varoaka huumioiden.

Omena ja päärynä

Torjunta tarkkailutietojen perusteella.

RUISKUTUSNESTEEN VALMISTUS:

Tankki täytetään puolilleen vedellä ja Mavrik –valmiste sekä loput vedestä lisätään sekoittajan käydessä. Tankkiseosta käytettäessä tankki täytetään puolilleen vedellä, annetaan sekoittajan käydä koko ajan, lisätään Mavrik –valmiste, mahdolliset muut valmisteet ja loput vedestä.

SEKOITETTAVUUS

Mavrik –valmiste voidaan ruiskuttaa samanaikaisesti useiden rikkakasvi- ja kasvitautientorjunta-aineiden kanssa. Mavrikia ei saa sekoittaa booriin perustuvien tai booria sisältävien lehtilannoitteiden kanssa.

HUOMAUTUKSET

Torjunta tulee tehdä torjunnan kynnsarvojen mukaisesti, vain optimaalisissa olosuhteissa ja parasta ruiskutustekniikkaa käyttäen. Valmiste ei ole herkkä UV-säteilylle, joten auringon valo ei nopeuta sen hajoamista.

Valmiste on säilytettävä alkuperäispakkauksessa – 10. ja + 30 asteen välillä olevassa lämpötilassa. Älä valmista ruiskutusnestettä enempää kuin on tarve.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 11.7.2017.

SVENSKA

ANVÄNDNINGSSÄMÅL

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärter, bönor, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli, brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Karenstid i kål, gröna ärter och potatis sju dagar, och i torkade ärter och bönor 14 dagar, spannmål, äpplen och päron 30 dagar, höst- och vårrybs, höst- och vårraps 60 dagar. För blomkål beräknas karenstiden från första skördeomgången.

Preparatet får inte användas för oljeväxter senare än i början av blomningen. I äpple, päron, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli och brysselkål får preparatet endast användas en gång, i andra växtslag upp till två gånger under växtsäsongen.

HANTERING AV RESISTENS

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt resistenshantering vid användningen av preparatet (aktiv beståndsdel grupp 3A, pyretroider) och därför bör antalet behandlingar minimeras genom att alternera med andra preparat med andra verkningssätt (MoA) och som hör till en annan grupp av verksamma substanser.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som är begränsade till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Gröda	Munstycke			
	Spaltspridar	Avdriftsreducerande munstycke 1)		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps	Ej tillåtet	Ej tillåtet	15 m	5 m
Ärter, bönor och potatis	Ej tillåtet	20 m	10 m	5 m
Vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli och brysselkål	Ej tillåtet	Ej tillåtet	20 m	10 m
Äpple och päron	Ej tillåtet	Ej tillåtet	Ej tillåtet	30 m

1) Vindavdriftsreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftsreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vesitorajoitus. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

SKYDDSDRÄKT

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.

BRUKSANVISNING

Mavrik är ett, övervägande kontaktverkande växtskyddsmedel med bred effekt. Därför är det viktigt att ha en god täckning av växtdelarna för att produkten ska absorberas i vaxlagret. För att säkerställa tillräcklig effekt är det viktigt att sprutvätskan tränger så långt in i grödan som möjligt.

Produkten fungerar genom att blockera aktiviteten hos de spänningskänsliga Na⁺-kanalerna i skadeinsekternas centrala nervsystem och elektronmigrationen i nervsystemet, vilket orsakar förlamning och död hos insekterna.

Vegetabiliska	Störande skadedjur	Utvecklingsstadium (BBCH)	Den använda mängden av L/ha	Antal behandlingar	Vattenmängd L/ha	Sprutintervall per dag	Anmärkningar
Höst- och vårsäd på våren	Blادلöss, tripsar, sädesbladbagge	10 – 50	0,15 -0,2	1 -2	100 - 400	10 -14	Max 2 behandlingar
	röda vetemygga och gula vetemygga	41 - 59					
Höst och vår rybs, höst- och vårraps	Rapsbagge, rapsvivel, skidgallmygga, ängstinkfly	30 – 60	0,2	1 – 2	100 – 300	7	Max 2 behandlingar
Ärt och böna	Randig ärtvivel	10 - 19	0,2	1 – 2	100 – 300	14	Max 2 behandlingar
	Ärt- och bönbladlöss, trips och stritar	50 - 71					
Potatis	Blادلöss, koloradoskalbaggar enligt speciella instruktioner ***	12 - 49	0,2	1 - 2	100 - 400	14	Max 2 behandlingar
Vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli och brysselkål	Kålbladlus, rapsbaggar	10 – 49	0,3	1	200 – 400	-	Max 1 behandling
Äpple och päron	Äppel- och andra typer av bladlöss, rönnbärsmal	51 – 79	0,3	1	500 – 1000	-	Max 1 behandling

*** Fynd av koloradoskalbaggar skall omedelbart anmälas till Ely-centrumets landsbygdsenergi enhet eller Livsmedelssäkerhetsmyndigheten Evira, som ska fastställa åtgärderna för destruktion av skalbaggar.

Vattenmängden är vid besprutning från 100 - 400 L/ha beroende på beståndets täthet och skadejurens placering på växterna. I äpplen och päron är mängden vatten mellan 500-1000 L/ ha. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa jämn spridning av preparaten genom att välja munstycket och trycket som passar bäst för ändamålet.

TRÖSKELVÄRDEN VID BEKÄMPNING:

Rybs och raps

Rapsbaggar: 1 skalbagge / växt vid tidigt angrepp, 2-3 skalbaggar / växt kort före blomningen.

Rapsvivel: före blomning 1 vivel / 4 växter.

Skidgallmygga: 0,5-2 myggor / växt. Myggen lägger ägg i hålen som viveln orsakar, så genom vivelbekämpning minskar också skadorna som orsakas av skidgallmygga.

Spannmål

Sådesbladlus: Vid bekämpning av bladlöss i spannmål då bladlöss börjat förekomma på växterna. För bekämpning av häggbladlus endas om uppenbar risk finns för spridning av virus Vetemygga: Tröskelvärdet är 1 mygga / 6 till 7 ax. Upprepa behandlingen efter 4-5 dagar. Behandla grödan när symptom för angrepp av skadeinsikter uppstår eller då bekämpningströskeln överskrids.

Ärt och böna

Ärtvecklare: Bekämpning under blomningen mellan kl. 22 och 06. Bekämpningstidpunkt och behovet av bekämpning av larverna beräknas med hjälp av feromonfällor. Det vägledande tröskelvärdet för bekämpning i produktionen av matärt är minst 10vecklare per fälla och i produktionen av gröna ärtar minst 3vecklare per fälla i två på varandra följande inspektioner. Preparatet används inte i ärtan enbart för bekämpa ärtbladlus.

Kål

Rapsbaggar: på blomkål genom observation vid blomningstid när den första skörden är på gång att bli klar att sköras med iakttagande av karenstiden.

Äpple och päron: Bekämpning baserad på observationsdata.

FRAMSTÄLLNING AV SPRUTVÄTSKA

Tanken fylls till hälften med vatten och Mavrik samt resten av vattnet tillsätts medan blandaren är påslagen. Vid framställning av tankblandning fylls tanken till hälften med vatten, blandaren får gå hela tiden, tillsätts Mavrik, de övriga preparaten och den resterande mängden vatten.

BLANDBARHET

Mavrik preparatet kan appliceras samtidigt med ett antal herbicider och fungicider. Blanda ej Mavrik med produkter innehållande Bor.

ANMÄRKNINGAR

Bekämpning bör utföras utgående från gränsvärdena för bekämpning, endast under optimala förhållanden och med bästa sprutteknik. Preparatet är inte känsligt för UV-strålning, så solljus accelererar inte dess nedbrytning. Preparatet ska förvaras i originalförpackningen vid en temperatur mellan -10 °C och +30 °C. Blanda inte till mer sprutvätska än nödvändigt.

Säkerhets- och kemikaliemyndigheten (Tukes) har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel den 11.7.2017.



MAVRIK®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



TUHOELÄINTEN TORJUNTAAN/INSEKTICID

Valmistetyyppi: EW
Preparattyyppi: EW



Tehoaine/Verksammasubstans:

- Tau-fluvalinaatti/tau-fluvalinat 240 g/L



Tiedot/Information

Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti/Nederländerna
www.adama.com

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: näytä
pakkauksesa/Tillverkningspartiets nummer och
tillverkningsdatum:
se förpackning



Skannataan käytettäväksi/
Scanna för användning



FINLAND/

UN3082



8 718077 016245



VAROITUS
VARNING

VAIKUTUSTAPA

VERKNIINGSMEKANISM

3A

TUHOELÄINTEN TORJUNTAAN

INSEKTICID

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, puna-, suippo-, savojin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä, (esim. nitrili) ja päähinettä.

Användargrupp: Yrkesanvändning

Användningsändamål:

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärtor, bönor, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli, brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradskabbaggen i potatis.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.



ADAMA

L2J20151E27


12 x 1L



MAVRIK®



ADAMA



FINLAND



VAROITUS/VARNING



UN3082

L23191PAAR_01

48 x 12 L