



Agil® 100 EC

**Tar effektivt hand
om gräsogräs och spillsäd.**

ADAMA

Agil® 100 EC

Verkar snabbt och är enkel att applicera!

Innehåll:	100 g/l propaquizafop
Formulering:	EC (Emulgerbart koncentrat)
Registrerade grödor:	äpple, päron, hallon, krusbär, vinbär och jordgubbar på friland, potatis, morot, kålrot, kepalök, silverlök, scharlottenlök, vitlök, senap, lin, raps, broccoli, huvudkål, ärtor, bönor, utsädesodlingar av klöver och rödsvingel, sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Dosering:	0,5-1,5 l/ha. Doseringen beror på ogräsart, utvecklingsstadie och intervallet mellan behandlingarna.
Behandlingsintervall:	14-28 dagar
Vattenvolym:	75-300 l/ha
Användning:	Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25m ² i fältet.
Karenstid:	Tiden mellan sista appliceringen och skörden får på flertalet grödor inte vara mindre än 30-45 dagar beroende på gröda.
Användningsvillkor:	Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd vid hantering och spridning.





Herbicides

Godkänd i över 25 grödor. Verkar på bred front.

Agil® 100 EC är en effektiv produkt som verkar på gräsogräs och spillsäd. I Sverige är den godkänd i mer än 25 grödor, bl a raps, potatis, ärtor, lin, sockerbetor och bönor. Fördelen med Agil är att den verkar snabbt på spillsäd och är en utmärkt produkt mot bl a kvickrot. Den är enkel att applicera och dessutom regntålig redan efter en timme. Agil är välkänd över hela världen där den tjänstgjort under många år.


- Utmärkt effekt på gräsogräs och spillsäd
- Verkar snabbt
- Utmärkt hållfasthet vid regn
- Enkel och flexibel att använda



Verkningssätt


Agil® 100 EC är en systemiskt verkande herbicid. Produkten tas upp genom blad och sprids därefter i ogräsplantan. Agil blockerar celldelningen hos ogräset medan grödan förblir opåverkad av den aktiva substansen.

Agil bekämpar en rad gräsogräs såsom kvickrot, spillsäd, flyghavre, ängsgröe, kärrgröe, renkavle, åkerven och losta. Effekten mot vitgröe kan variera betydligt, bäst effekt uppnås när vitgröen har 1-3 blad och ännu inte bildat tuva.



Effekten inträder efter 3 - 5 dagar då gräsens tillväxt avstannar. Första synliga effekt, i form av gul- eller rödfärgning av bladen, syns 10 - 14 dagar efter behandling. Efter ytterligare 3 - 8 dagar vissnar ogräset.

Agil® 100 EC innehåller 100g/l av den aktiva substansen propakizafop.



Agil innehåller också tensider och andra CO-ämnen som samarbetar så att den aktiva substansen Propaquizafop tas upp och absorberas i gräsogräset.

Förebygg resistens

Ingen resistens mot propakizafop har påvisats i Sverige, men var uppmärksam om du får oväntat dåliga effekter mot normalt känsliga ogräs. Detta gäller speciellt renkavle.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Använd produkter med olika verkningssätt i växtföljden
- Kör under optimala förhållanden
- Anpassa doseringen efter situation (väder, ogrässtorlek)
- Använd den bästa spruttekniken



Användning och dosering

Agil® 100 EC som används enligt rekommenderad mängd har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkert att använda. Agil verkar på både ettåriga gräsogräs och fleråriga gräsogräs.

Ogräseffekten kan minska vid dåliga förhållanden som torka, blöta, frost etc. Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet. Vattenmängd: 75-300 l/ha.

 Gröda	Behandling				Max dos/ tillfälle l/ha
	Utvecklings- stadium (DC)/ säsong	Karenstid (dygn)	Max. antal beh /år	Behandlings- intervall (dygn)	
Äpple och päron	april-september	30	2	14-28	1,5
Hallon, krusbär, vinbär	maj-juli	35	1		1,5
Jordgubbar	Före blomning samt efter körd	35	1		1,5
Potatis	< 68	30	1		1,5
Morot	< 40	30	2	14-28	1,5
Senap	Före blomning		1		1,5
Kålrot	< 40	30	1		1,5
Kepalök, silverlök, schalottenlök, och vitlök	< 45	30	2	14-28	1,5
Broccoli och huvudkål		30	2	14-28	1,5
Färska örter samt torkade örter och bönor	<59	45	1		1,5
Lin	9-20 cm		1		1,5
Värraps	< 39		2	14-28	1,5
Höstraps	< 50		2	14-28	1,5
Sockerbeter, foderbeter och rödbeter	< 32		2	14-28	1,5
Klöverfrö och rödsvingelfrö	< 49	45	1		1,5
Etablerade odlingar i plantskolor och skogsplantskolor	maj-juli		1		1,5

Blandningspartner*

För att komplettera effekten kan Agil® 100 EC tankblandas med ogräspreparat Matrigon 72 SG. Vid insektsangrepp kan Agil blandas med Mavrik® 2F. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

Att tänka på

- Använd Agil på gräsogräsens 3-6 bladstadie.
- Håll avstånd till eventuella andra herbicidbekämpningar för att få bästa effekt, framför allt när det gäller gräsherbicider. Upprepad behandling kan göras efter ca 7 dagar.
- Agil kan vid ogynnsamma förhållanden ge brännskador. Brännskadorna påverkar varken kvalitet eller avkastning men Agil bör inte användas på utsädespotatis.

Optimala förhållanden

Mest gynnsamma förhållanden för bekämpningen är varmt och fuktigt väder (luftens relativa fuktighet över 70 %), då gräsogräsen är i god tillväxt. Agil blir regntålig redan efter en timme.

Som med de flesta selektiva gräsogräsprodukter, ger Agil fullständig ogräskontroll inom 10-20 dagar. Produkten lindrar snabbt grödorna från ogräskonkurrens och ger därmed goda förutsättningar för en snabbare utveckling av grödorna.

* Registrerade varumärken:

Agil® 100 EC – ADAMA Quena N.V., Matrigon® 72 SG – Dow Agrosiences LCC, Mavrik® 2F – ADAMA Irvita N.V.



Herbicides

Adama är en tillverkare av växtskyddsmedel och distribuerar dessa medel i hela världen. Huvudkontor och produktionsanläggningar är baserade i Israel. Agil är ett registrerat varumärke som tillhör ADAMA Northern Europe B.V. i Leusden, Nederländerna.

ADAMA Northern Europe B.V. | POB 355 | NL-3830 AK Leusden, Netherlands

För mer information kontakta

Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70, Rikard Larsson 070-292 22 28.

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.

Läs alltid etikett och produktinformation före användning.

Observera alla varningsfraser och symboler!

ADAMA

www.adama.com