



FOLPAN[®] 500 SC



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICID

Suspensions koncentrat,
flytande koncentrat (SC)



Verksamt ämne

- Folpet 500 g/L (39,7 vikt%)
Övrigt ämne av betydelse för klassificering och märkning: hexametylentetramin



Användningsområden

Mot svartpricksjuka i odlingar av vete och mot sköldfläcksjuka i odlingar av korn



Upplysningar

Registreringsnummer: 5208 Andvändarkategori: 2L.

Endast för yrkesmässigt bruk

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



NO VARNISH
AREA

L22156IPFR_03

5 L e

FOLPAN[®] 500 SC



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.

FUNGICID

Suspensionskoncentrat,
flytande koncentrat (SC)

Verksamt ämne

- Folpet 500 g/L (39,7 vikt%)

Övrigt ämne av betydelse för klassificering och märkning:
hexametylentetramin

Användningsområden

Mot svartpricksjuka i odlingar av vete och mot
sköldfläcksjuka i odlingar av korn

Upplysningar

Registreringsnummer: 5208 Andvändarkategori: 2L.

Endast för yrkesmässigt bruk

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning

Scanna för användning



UN3082



8 718077 009506



SWEDEN

Läs medföljande anvisningar före användning

Misstänks kunna orsaka cancer.
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.

Undvik att inandas dimma/ångor.
Använd skyddshandskar och skyddskläder.
Förorena inte vatten med produkten eller dess be-
hållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av
vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från
gårdsplaner och vägar.
Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd
avfallsmottagare.

Första hjälpen
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och
vatten.

Ta av nedstänkta kläder och
tvätta dem innan de används igen.
Vid hudirritation eller utslag: Sök lä-
karhjälp.
För mer information se säkerhetsdata-
blad.

**För att undvika risker för människors hälsa
och för miljön, följ bruksanvisningen.**

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget
är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvin-
ningsystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRe-
tur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är
miljöfarligt avfall och ska destrueras.

GRUPP M04 FUNGICID



VARNING

EC020015221


4 x 5 L



FOLPAN[®] 500 SC



ADAMA



SWEDEN



VARNING



UN3082

L22156PAAR_03

30 x 20 L



FOLPAN[®] 500 SC



FUNGICID

Suspensionskoncentrat,
flytande koncentrat (SC)

Läs medföljande anvisningar före användning

**Misstänks kunna orsaka cancer.
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**

Undvik att inandas dimma/ångor.
Använd skyddshandskar och skyddskläder.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Första hjälpen

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

GRUPP M04 FUNGICID

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L22156IPBB_03



VARNING

UN3082

UFI: P3TJ-WFJ4-9Q09-FXP6



SWEDEN 8



718077 009490



**RISK, SKYDD OCH
FÖRSTA HJÄLPEN**



**ANVÄNDNING
OCH DOSERING**



**YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR**

öppna här



FOLPAN[®] 500 SC



FUNGICID

Suspensionskoncentrat,
flytande koncentrat (SC)



Läs medföljande anvisningar före användning

**Misstänks kunna orsaka cancer.
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**

Undvik att inandas dimma/ångor.
Använd skyddshandskar och skyddskläder.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Första hjälpen

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

GRUPP M04 FUNGICID

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svep retur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballag är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L221561P88_03



VARNING



UN3082

UFI: P3TJ-WFJ4-9Q09-FXP6



SWEDEN 8



718077 009490



ANVÄNDNINGSVILLKOR

Folpan 500® är godkänd för användning i höst- och vårvete, samt höst- och vårkorn enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling					Behandlings- utrustning/ metod	Övriga villkor och förtydli- ganden
		Utvecklingsstadium / tidpunkt	Max. an- tal behand- lingar	Minst an- tal dagar mellan var- je behand- ling	Karenstid, dygn	Max dos L/ha		
Vete,	Mot Svartprick- sjuka (<i>Septoria tritici</i>)	BBCH 30-59	2 per år	7	42	1,5	Bomspruta	Behandling förväntas inte ge full effekt.
Korn	Mot Sköldfläck- sjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	BBCH 30-59	2 per år	7	42	1,5	Bomspruta	Behandling måste utföras innan angrep- pet är omfat- tande om be- handling ska ha effekt

Ytterligare villkor

- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Restriktioner

Folpan® 500 SC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkert att använda. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Verknings sätt

Folpan® 500 SC är en skyddande fungicid som verkar genom att förhindra normal celledelning hos svampen. Den är kontaktverkande och har en translaminär effekt på bladmassan. Folpan® 500 SC måste appliceras förebyggande för att motverka svampens inträngande i växten. Intervall och dos anpassas efter rådande förhållanden och väderlek. Vid stort infektionstryck och när tillväxten är kraftig, skall behandlingen upprepas för att förstärka skyddet på nytillväxt bladmassa.

RESISTENSRISK

Folpan® 500 SC tillhör en grupp fungicider som är unik för den svenska marknaden. Produkten tillhör gruppen phtalamider (FRAC M4), som anses ha låg risk att utveckla resistens. Den aktiva substansen i Folpan® 500 SC, folpet, har varit registrerad och använd sidan 1954 i odling av vindruvor utan att påvisa resistens. Men, för att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Anpassa doseringen efter situation (väder, svamptryck)
- Blanda och/eller alternera produkter med olika verknings sätt
- Använd den bästa spruttekniken.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Folpan® 500 SC bör alltid användas tillsammans med annan verksam fungicid. Dess styrka ligger i kombinationseffekten som uppnås vid blandning av en eller flera svampprodukter.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium. Om svampangrepp uppträder tidigt på säsongen eller förekommer under en längre period krävs ytterligare en behandling. Antalet behandlingar och tidpunkten för den enskilda behandlingen bör anpassas efter sjukdomsförekomst.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande eller vid begynnande angrepp. På utvecklad angrepp skall den högre dosen användas. Maximum 2 behandlingar per år. Antal dagar mellan varje behandling: 7-10

Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 150-300 L/ha.

Gröda	Skadegörare	Tidpunkt, utv stadium	Antal behandlingar	Dosering (L/ha)	Anmärkningar
Höst- och vårvete	Svartpricksjuka samt bieffekt mot gulrost och brunrost	BBCH 30-59	2 per år	0,75 – 1,5 L/ha	Förväntas endast ge begränsad effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska få effekt.
Höst- och vårkorn	Sköldfläcksjuka samt bieffekt mot brunrost	BBCH 30-59	2 per år	0,75 – 1,5 L/ha	

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Effekten av Folpan® 500 SC gynnas av hög luftfuktighet, en temperatur omkring 15°C och 2-3 timmars uppehållsväder efter sprutningen.

Varaktigheten av behandlingen beror på sjukdom, smittotryck, väderförhållanden och grödans tillväxt. Man kan normalt räkna med 3-4 veckors skyddande effekt vid en dosering av 1,5 L/ha. Morgonbehandling är att föredra framför en kvällsbehandling.

Folpan® 500 SC är mycket skonsam för grödan och ger normalt inte upphov till brännskador på blad och bladspetsar. Spruta dock inte under extrema väderbetingelser (värme, torka eller starkt solsken).

BLANDNINGAR

Folpan® 500 SC kan blandas fysikaliskt med de flesta växtskyddsmedel och kelaterade mikronäringsämnen av god kvalitet.

Vid den tidiga tidpunkten kan det vara aktuellt att behandla mot stråknäckare i höstvetet eller höstkornet.

Vid behandling i de senare stadierna då svartpricksjuka förekommer i vetet, rekommenderas en blandning med triazol. Då effekt önskas mot sköldfläcksjuka eller kornets bladfläcksjuka rekommenderas en blandning med Amistar och Mirador.

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

SKYDDSUSTRUSTNING

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
 - Följ rekommenderad dos enligt tabellen
 - Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
 - Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning
- Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

SPRIDNINGSTEKNIK

Folpan® 500 SC är kontaktverkande med translaminär effekt. Detta medför att det är viktigt, speciellt i kraftiga grödor, att använda en sprutteknik som säkerställer att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätskan.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvärdig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens

återvinningscentral. Preparatrest, skölvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.