



MIRADOR®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICID

**Suspensions konzentrat,
flytande konzentrat (SC)**



Verksamt ämne

● Azoxistrobin 250 g/L (22,9 vikt-%)



Användningsområden

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, vete, råg, rågvete, raps, rybs, frilandsodling av bönor, ärtor, morot, palsternacka, kålrot, rova, persiljerot, rödbetor, frilands-, tunnel- och växthusodling av stjälskelleri, frilandsodling av dill, gräslök, kepalök, vitlök, purjolök, frilands-, tunnel- och växthusodling av jordgubbar, frilandsodling av potatis, gräsrö till utsäde, frilands-, tunnel- och växthusodling av barrträdplanter



Upplysningar

Registreringsnummer: Parallellhandelstillstånd nummer: PHT-0050-5465

Ursprungsprodukt: Amistar, reg nr: 1-72 **Behörighetsklass:** 2.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehavare av godkännandet:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

DK-2300 Köpenhamn S, Danmark

Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning.



Scanna för användning



NO VARNISH
AREA

5 L e

L30998IPFR_02



MIRADOR®



ADAMA



FUNGICID

**Suspensions koncentrat,
flytande koncentrat (SC)**



Läs medföljande anvisningar före användning

GRUPP 11 FUNGICID

H332 Skadligt vid inandning • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion • 13 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet • P261 Undvik att andas spraj • P273 Undvik utsläpp till miljön • P391 Samla upp spill • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.) • SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under det följande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av höstraps, höstrybs, bönor eller örter • SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under det följande året på samma fält när produkten har använts i samband med sättnings av potatis • SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt

eller andra produkter innehållande azoxistrobin under de två följande åren på samma fält när produkten har använts i odlingar av barrträdsplanter i tunnel eller på friland.

Första hjälpen

P304+P340+P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

UN3082

UFI: UW8M-3DHJ-9V0K-X6MX



SWEDEN



8 718077 007946

öppna här

VARNING



**RISK, SKYDD OCH
FÖRSTA HJÄLPEN**

**ANVÄNDNING
OCH DOSERING**

**YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR**

L30999&IPBB_02

 FUNGICID**Suspensions koncentrat,
flytande koncentrat (SC)** **Läs medföljande anvisningar före användning**

H332 Skadligt vid inandning • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion • 13 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet • P261 Undvik att andas sprei • P273 Undvik utsläpp till miljön • P391 Samla upp spill • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.) • SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under det följande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av höstraps, höstbryns, bönor eller ärtor • SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under det följande året på samma fält när produkten har använts i samband med sättnings av potatis • SPe 1 För att skydda grundvatten, använd inte

GRUPP 11 FUNGICID

denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under de två följande åren på samma fält när produkten har använts i odlingar av barrträdplanter i tunnel eller på friland.

Första hjälpen

P304+P340+P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

**VARNING****UN3082**

UFI: UW8M-3DHJ-9V0K-X6MX



SWEDEN



ANVÄNDNINGSVILLKOR

Mirador® är godkänd mot rost i odlingar av vete. Mot rost och sköldfläcksjuka i odlingar av råg och rågvete. Mot rost och bladfläcksjuka i odlingar av havre. Mot svampangrepp i odlingar av korn. Mot *Alternaria* spp. och bomullsmögel i odlingar av raps och rybs. Mot svampangrepp i frilandsodling av färska bönor och ärtor.

Mot svampangrepp i frilandsodling av morot, palsternacka, kålrot, persiljerot, rova, dill, gräslök, kepalök, vitlök och purjolök. Mot *Cercospora beticola* och betrost (*Uromyces betae*) i frilandsodlingar av rödbetor.

Mot svampangrepp i odlingar av stjälselleri. Mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar. Mot torrfläcksjuka i odlingar av potatis. Mot rotbrand och groddbrand i odlingar av potatis i samband med sättning. Mot svampangrepp i odling av gräströ till utsäde. Mot gråbarrsjuka i växthusodlingar av barrträdsplanter.

Mot gråbarrsjuka och tallsytte i frilandsodlingar och tunnelodlingar av barrträdsplanter.

Ytterligare villkor

- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är för att skydda vattenlevande organismer samt insekter utanför fältet.
- Vid användning i gräströ till utsäde: Vid spridning närmare än 100 m från sjö, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50% användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
- Vid användning i tunnel- och frilandsodlingar av barrträdsplanter: Vid spridning närmare än 100 m från sjö, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50% användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Vid spridning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Vid spridning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
- Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
- Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i med som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Verknings sätt

Mirador® innehåller den systemiska verksamma bestånds delen azoxistrobin vilken tillhör gruppen strobiluriner. Azoxistrobin stoppar svampens utveckling genom att blockera dess andningsprocess. Azoxistrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Preparatet har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Mirador® bekämpar svampsjukdomar mest effektivt när svampen etablerar sig på plantan, därför skall behandling ske så snart de första sjukdomssymptomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Plantan skyddas mot svampangrepp de kommande 2-4 veckorna beroende av växtstadium, tillväxthastighet, sjukdomsangrepp och dosering

RESISTENSRISK

Mirador® tillhör strobilurinerna, vars verkningsmekanism är annorlunda från andra svamp- medelsgrupper. Det finns ingen känd korsresistens till svampsjukdomar som kan ha utvecklat reducerad känslighet för svamppreparat. I stråså finns för närvarande utbredd strobilurinresistent mjöldagg och svartpricksjuka (*Septoria tritici*) i vete och begynnande

utbredning av strobilurinresistent mjöldagg i korn samt vetets bladfläcksjuka i vete. Resistens orsakar dålig eller bris-tande effekt.

För att undvika ytterligare spridning av resistens, samt för att säkra bästa möjliga effekt, är det viktigt att följa nedan angivna riktlinjer för användning av strobiluriner i stråsäd:

Använd maximalt 2 behandlingar med strobilurinhaltiga produkter per säsong.

Använd Mirador® förebyggande eller så tidigt som möjligt i infektionsförloppet.

Blanda Mirador® med preparat med brett verkningspektrum (triazoler i alla stråsådesslag eller Kayak® i korn) som har en annan verkningsmekanism och som är effektiva mot de relevanta svampsjukdomarna.

Använd en dosering både av Mirador® och blandningspartnern som ger en effektiv behandling.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Behandling utförs när de första symptomen på svampangrepp konstaterats eller när det är risk för kommande angrepp beroende på sort och väderförhållanden. Högst dosering bör användas i sjukdomsmottagliga sorter eller vid högt smit-totryck, speciellt under fuktiga perioder.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan.

Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

ANVENDELSE PÅ FRILAND

Gröda	Skadegörare	DOSERING (L/ha)	Karenstid (dagar)	ANMÄRKNING
Vete BBCH 30-69	Rost (<i>Puccinia</i> spp.)	0,4	35	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong
Råg och rågvete BBCH 30-69	Rost (<i>Puccinia</i> spp.) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium se-calisi</i>)	0,4	35	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong
Korn BBCH 30-59	Rost (<i>Puccinia</i> spp.) Bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora teres</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Parastagonospora nodorum</i>) <i>Ramularia</i> (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0,4	35	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong
Havre BBCH 30-59	Rost (<i>Puccinia</i> spp.) Bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0,4	35	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong
Höstraps och höstrybs BBCH 60-69	Svartfläcksjuka (<i>Alternaria</i> spp.) Bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotio-rum</i>)	0,6	21	Vattenmängd (l/ha): 200-500 Max 1 behandling hvert 2 år
Vårrips och vårrybs BBCH 60-69	Svartfläcksjuka (<i>Alternaria</i> spp.) Bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotio-rum</i>)	0,5	21	Vattenmängd (l/ha): 200-500 Max 1 behandling hvert 2 år

Gröda	Skadegörare	DOSERING (L/ha)	Karenstid (dagar)	ANMÄRKNING
Potatis BBCH 51-85	Torrfläcksjuka (<i>Alternaria solani</i>)	0,5	7	Vattenmängd (l/ha): 200-500 Max 2 behandlingar/säsong. Behandlingsintervall: minst 7 dagar Bladbehandling av potatis får inte kombineras med behandling i fåran av Mirador® under samma säsong
Potatis BBCH 00 (Sprutning i fåra i samband med sättnig)	<i>Rhizoctinia solani</i>	2,0	-	Vattenmängd (l/ha): 50-150 Max 1 behandling vart 2 år. Behandling av potatis i fåren får inte kombineras med bladbehandling av Mirador® under samma säsong.
Gräsfrö till utsäde	Rost (<i>Puccinia</i> spp.) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0,5	35	Vattenmängd (L/ha): 200-500 Max 1 behandling/säsong. I engelskt rajgräs ger Mirador® måttlig till god effekt mot svartrost och mjöldagg. Effekten mot kronrost är svagare. I ängsgröe ger Mirador® måttlig till god effekt mot rostsjukdomar på bladen samt mot mjöldagg. I ängssvingel ger Mirador® svag effekt mot bladfläcksvampar.
Rödbetor BBCH 16-49	Bladfläckar (<i>Cercospora beticola</i>) Betrost (<i>Uromyces betae</i>)	0,6	14	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong Måttlig effekt mot betrost. Måttlig effekt mot <i>Cercospora</i> .
Bönor BBCH 59-77	Rost (<i>Uromyces pisi</i>) Bönfläcksjuka (<i>Ascochyta pisi</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe pisi</i>) Bladmögel (<i>Peronospora viciae</i> sp. pisi) Snömmögel (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)	0,6	7	Vattenmängd (L/ha): 150-800 För endast användas på bönor som inte ska torkas. Max 1 behandling vart 2 år.
Ärter BBCH 59-77	Rost (<i>Uromyces pisi</i>) Ärtfläcksjuka (<i>Ascochyta pisi</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe pisi</i>) Ärtbladmögel (<i>Peronospora viciae</i> sp. pisi) Snömmögel (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)	0,6	14	Vattenmängd (L/ha): 200-500 För endast användas på ärter som inte ska torkas Max 1 behandling vart 2 år
Dill och gräslök BBCH 14-49	Rost (<i>Puccinia allii</i>) Löksbladmögel (<i>Peronospora destructor</i>) <i>Alternaria porri</i> Gråmmögelbladfläcksjuka (<i>Botrytis squamosa</i>) <i>Cladosporium allii-cepae</i> Vitråta (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	0,8	14	Vattenmängd (L/ha): 300-1200 Max 1 behandling/säsong

Gröda	Skadegörare	DOSERING (L/ha)	Karenstid (dagar)	ANMÄRKNING
Morötter, palsternacka, kålrot, rova och persiljerot BBCH 16-49	Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Bladfläcksjuka (<i>Septoria apicola</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	0,6	14	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong Använd Mirador® som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår
Lök (kepalök, och hvitlök) BBCH 14-48	Purpurfläcksjuka (<i>Alternaria porri</i> , <i>Cladosporium allii- cepae</i>) Löklbladmögel (<i>Peronospora destructor</i>) Rost (<i>Puccinia allii</i>) Vittröta (<i>Sclerotium cepivorum</i>) Gråmögelbladfläcksjuka (<i>Botrytis squamosa</i>)	0,8	14	Vattenmängd (L/ha): 200-500 Max 1 behandling/säsong Använd Mirador® som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår
Purjolök BBCH 14-49	Purjolöksrost (<i>Puccinia porri</i>) Pappersfläcksjuka (<i>Phytophthora porri</i>) Purpurfläcksjuka (<i>Alternaria porri</i>) <i>Cladosporium allii-porri</i>	0,8	21	Vattenmängd (L/ha): 200-1000 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Stjälkselleri BBCH 14-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	0,8	14	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong
Jordgubbar BBCH 51-89	Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0,64	3	Vattenmängd (L/ha): 100-300 Max 1 behandling/säsong Använd Mirador® som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Barträdsplanter	Tallskytt och gråbasssjuka (<i>lophermium seditiosum</i> och <i>lophodermella concolor</i>)	0,6	-	Vattenmängd (L/ha): 600 Max 1 behandling vart 3e år. Sommar till tidlig höst

ANVENDELSE I VÄXTHUS

Gröda	Skadegörare	DOSERING (L/ha)	Karenstid (dagar)	ANMÄRKNING
Jordgubbar BBCH 51-89	Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	1,0	3	Vattenmängd (L/ha): 100-300 Max 3 behandlingar/säsong. Behandlingsintervall: minst 7 dagar

Gröda	Skadegörare	DOSERING (L/ha)	Karenstid (dagar)	ANMÄRKNING
Stjälkselleri BBCH 14-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	0,8	14	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong
Barträdsplanter	Gråbasssjuka (<i>lophodermella concolor</i>)	1,0	-	Vattenmängd (L/ha): 600 Max 3 behandlingar/säsong. Behandlingsintervall: 21 dagar.

ANVENDELSE I TUNNELODLING

Gröda	Skadegörare	DOSERING (L/ha)	Karenstid (dagar)	ANMÄRKNING
Jordgubbar BBCH 51-89	Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0,64	3	Vattenmängd (L/ha): 100-300 Max 1 behandling/säsong. Behandlingsintervall: 7 dagar
Stjälkselleri BBCH 14-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	0,8	14	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong
Barträdsplanter	Gråbasssjuka (<i>lophodermella concolor</i>)	0,6	-	Vattenmängd (L/ha): 600 Max 1 behandling vart 3e år. Sommar till tidlig höst

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Behandling tidigt i svampens utvecklingsfas, dvs då symptomen på angrepp är små.

Grödan skall vara i god tillväxt och inte hämmad av torka eller tidigare behandlingar. Långtidseffekten beror på doseringen, sjukdomstrycket samt grödans utveckling.

Tidiga behandlingar har kortare långtidseffekten än en axgångsbehandling, då plantorna vid tidigare stadium växer mycket och utvecklar nya blad.

Varning

Mirador® har i försök och vid praktisk användning utomlands visat sig vara speciellt skadlig för vissa äpplesorter. Därför rekommenderas stor försiktighet vid sprutning intill äppleodlingar, trädgårdar, skogsplanteringar med äppleträd etc för att undvika avdrift. Använd gärna "low drift"-munstycken.

Optimal behandlingstidpunkt: Behandling tidigt i svampens utvecklingsfas, dvs då symptomen på angrepp är små.

SKYDDSUTRUSTNING

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten.

Tillsatt preparatet/preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

SPRIDNINGSTEKNIK

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

Behandla alltid på upptorkad gröda. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar

som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. Företaget frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.



MIRADOR®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICID

**Suspensionskoncentrat,
flytande koncentrat (SC)**



Verksamt ämne

● Azoxistrobin 250 g/L (22,9 vikt-%)



Användningsområden

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, vete, råg, rågvete, raps, rybs, frilandsodling av bönor, ärtor, morot, palsternacka, kålrot, rova, persiljerot, rödbetor, frilands-, tunnel- och växthusodling av stjälselleri, frilandsodling av dill, gräslök, kepalök, vitlök, purjolök, frilands-, tunnel- och växthusodling av jordgubbar, frilandsodling av potatis, gräsfrö till utsäde, frilands-, tunnel- och växthusodling av barrträdslantor



Upplysningar

Registreringsnummer: Parallellhandelsstillstånd nummer: PHT-0050-5465

Ursprungsprodukt: Amistar, reg nr: 1-72 Behörighetsklass: 2.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehavare av godkännandet:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

DK-2300 Köpenhamn S, Danmark

Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:
se förpackning.



Scanna för användning



UN3082



8 718077 008189



SWEDEN

GRUPP 11 FUNGICID

Läs medföljande anvisningar före användning

H332 Skadligt vid inandning ● **H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter** ● EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion ● 13 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet ● P261 Undvik att andas sprid ● P273 Undvik utsläpp till miljön ● P391 Samla upp spill ● P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare ● SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.) ● SPe 1 För att skydda grundvattnet, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under det följande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av höstraps, höstrybs, bönor eller ärtor ● SPe 1 För att skydda grundvattnet, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande azoxistrobin under det följande året på samma fält när produkten har använts i samband med sättnings av potatis ● SPe 1 För att skydda grundvattnet, använd inte denna produkt eller

andra produkter innehållande azoxistrobin under de två följande åren på samma fält när produkten har använts i odlingar av barrträdslantor i tunnel eller på friland.

Första hjälpen

P304+P340+P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svegretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.



VARNING



ADAMA

4 x 5 L

1309980CFR_02



MIRADOR®



ADAMA



SWEDEN



VARNING



UN3082

L3099&PAAR_02

30 x 20 L