

BONTIMA®

Fungicid

Scanna för
användning



ADAMA

Verksamma ämnen:

Isopyrazam 62.5 g/L (6,2 vikt-%)

Cyprodinil 187.5 g/l (18,5 vikt-%)

Övrigt ämnen av betydelse för
klassificering och märkning lacknafta
(petroleum), tung aromatisk

Formulering:

emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer: 5535

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: FRAC 7, 9

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederländerna

www.adama.com

© ADAMA Maktheshim Ltd.

5 L e

BONTIMA®



Fungicid

Reg. 5535. Användarkategori 2L.

Användningsområden
Mot svampangrepp i odlingar av korn.

Läs medföljande anvisningar före användning

FARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna • Skadligt vid inandning • Kan orsaka irritation i luftvägarna • Misstänks kunna skada det ofödda barnet • Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor • Innehåller Isopyrazam och cyprodinil. Kan orsaka en allergisk reaktion • Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar • Samla up spill • Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen:

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning



8 718077 009483

UN 3082



SWEDEN

ANEBonSE5LT/01/B

97052324D/201911



8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.

ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.

Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i slutna originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

Registrerade varumärken:
Bontima® - ADAMA Makthesthim Ltd.

BONTIMA®

Fungicid



Reg. 5535. Användarkategori 2L.

Användningsområden
Mot svampangrepp i odlingar av korn.

Läs medföljande anvisningar före användning

FARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna • Skadligt vid inandning • Kan orsaka irritation i luftvägarna • Misstänks kunna skada det ofödda barnet • Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor • Innehåller Isopyrazam och cyprodinil. Kan orsaka en allergisk reaktion • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej • Använd skyddshandskar • Samla up spill • Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen:

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning



8 718077 009483

UN 3082



ANVÄNDNINGSVILLKOR

Bontima® är godkänd för användning i höst- och vårkorn enligt nedanstående tabell:

Gröda	Skadegörare	Behandling			Dos max L/ha	Spridningsmetod
		Tidpunkt, utv. stadie	Karens, dagar	Antal beh.		
Höst- och vårkorn	Mot svampangrepp	30 - 61	-	1 per år	2,0 L/ha	Bomspruta

Övriga villkor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Restriktioner

Bontima® som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Verknings sätt

Isopyrazam tillhör kemiska gruppen pyrazol-4-karboxamider (FRAC-kod 7). Isopyrazam hämmar respirationen i svampens celler. Cyprodinil tillhör gruppen anilino-pyrimidiner (FRAC-kod 9) och verkar genom att hämma biosyntesen av proteinet methionin. Kombinationen av de aktiva substanserna gör att Bontima® verkar både förebyggande och kurativt på svampsjukdomarna. En del av de aktiva substansen stannar kvar på bladytan efter behandling medan en del transporteras i plantan med hjälp av saftströmmen ut i plantans olika delar (systemisk verkan). Bontima® fungerar som bäst om den används förebyggande eller i ett tidigt stadium av svamputvecklingen. Effekten varar generellt i 4-6 veckor efter behandling.

Resistensrisk

Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. En viktig del i en resistens strategi är att använda preparat med olika verknings sätt. Bontima® innehåller två aktiva substanser, izopyrazam som tillhör FRAC- kod 7, som ligger i riskgruppen medel till hög för att utveckla resistens och cyprodinil som tillhör FRAC- kod 9 som ligger i riskgruppen medel för att utveckla resistens. Två aktiva substanser

säkerställer en god effekt mot de flesta svampsjukdomar samtidigt som risken för resistensutveckling minimeras i och med att de två substanserna verkar på olika ställen i svampens livscykel.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Anpassa doseringen efter rådande förhållande (väder, svamptryck)
- Alternera produkter med olika verknings sätt
- Använd den bästa spruttekniken

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium. Om svampangrepp uppträder tidigt på säsongen eller förekommer under en längre period krävs ofta ytterligare en behandling.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande eller vid begynnande angrepp. På utvecklade angrepp skall den högre dosen användas.

Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 100-300 L/ha

Gröda	Skadegörare	Dosering
Höst- och vårkorn	God effekt på kornets bladfläcksjuka, mjöldagg och kornrost.	1,5-2,0 L/ha, Stadie 30-61

SPRIDNINGSTEKNIK

Bontima® är systemisk i uppåtgående riktning. Detta medför att det är viktigt, speciellt i kraftiga grödor, att använda en sprutteknik som säkerställer att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätskan.

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Följ rekommendationerna enligt broschyren "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

SKYDDSUTRUSTNING

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vatten-täcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten

BONTIMA®

Fungicid

Verksamma ämnen:

Isopyrazam 62.5 g/L (6,2 vikt-%)

Cyprodinil 187.5 g/l (18,5 vikt-%)

Övrigt ämnen av betydelse för klassificering och märkning lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering:

emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer: 5535

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: FRAC 7, 9

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederländerna

www.adama.com

© ADAMA Maktheshim Ltd.

4 x 5 L



ADAMA

ANEBONSELT/01/C1

97052324S/201911

BONTIMA®

BONTIMA®

Fungicid



ADAMA

Verksamma ämnen:

Isopyrazam 62.5 g/L (6,2 vikt-%)

Cyprodinil 187.5 g/l (18,5 vikt-%)

Övrigt ämnen av betydelse för klassificering och märkning lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering:

emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer: 5535

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: FRAC 7, 9

Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederländerna

www.adama.com

© ADAMA Maktsheshim Ltd.

4 x 5 L

Scanna för
användning



Reg. 5535. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot svampangrepp i odlingar av korn.

Läs medföljande anvisningar före användning

FARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna • Skadligt vid inandning • Kan orsaka irritation i luftvägarna • Misstänks kunna skada det ofödda barnet • Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor • Innehåller Isopyrazam och cyprodinil. Kan orsaka en allergisk reaktion •

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej

• Använd skyddshandskar • Samla up spill • Innehållet

och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare •

Förerena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen:

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning




8 718077 007557

UN 3082



SWEDEN

BONTIMA®




SWEDEN



FARA



30 x 20 L



UN 3082

ANEBONSE5LT/01/X

97052324M/201911



ADAMA

Northern Europe B.V.