

BONTOC®



ADAMA

© Globachem N.V.



FUNGICID

Vattendispergerbart
granulat (WG)



Verksamt ämne

● Boskalid 500 g/kg (50 % w/w)



Användningsområden

Mot bomullsmögel i höstraps



Upplysningar

Registreringsnummer: 6012 **Andvändarkategori:** 2 L

Endast för yrkesmässigt bruk

Innehavare av godkännandet:

Globachem N.V.

Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden

Belgien

www.globachem.com

Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



L200351PFR_01

NO VARNISH
AREA

2.5 KG e

BONTOC®



ADAMA

© Globachem N.V.

FUNGICID

Vattendispergerbart
granulat (WG)



Verksamt ämne

● Boskalid 500 g/kg (50 % w/w)



Användningsområden

Mot bomullsmögel i höstraps



Upplysningar

Registeringsnummer: 6012

Andvändarkategori: 2 L

Endast för yrkesmässigt bruk

Innehavare av godkännandet:

Globachem N.V.

Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden

Belgien

www.globachem.com

Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



UN3082



SWEDEN

Läs medföljande anvisningar före användning

**Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.**

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd
avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess
behållare.

Första hjälpen

För information se säkerhetsdatablad.

**För att undvika risker för människors hälsa och
för miljön, följ bruksanvisningen.**

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

GRUPP 7 FUNGICID



VARNING

4 x 2.5 KG

L200350CFR_01

NO VARNISH
AREA

BONTOC®



FUNGICID

Vattendispergerbart granulat
(WG)

Läs medföljande anvisningar före användning

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

För information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och

GRUPP 7 FUNGICID

for miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomtemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L20035TPBB_01



VARNING



UN3082



RISK, SKYDD OCH
FÖRSTA HJÄLPEN

ANVÄNDNING
OCH DOSERING

YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR

öppna här



BONTOC®



FUNGICID

Vattendispergerbart
granulat (WG)

Läs medföljande anvisningar före användning

GRUPP 7 FUNGICID

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

För information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvis-

ningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se).

Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

L20035IPBB_01



VARNING



UN3082

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Bontoc® är godkänd för användning mot bomullsmögel i höstraps enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling					Behandlings- utrustning/ metod	Övriga villkor och förtydli- ganden
		Utveck- lings-sta- dium / tid- punkt	Max. an- tal behand- lingar	Minst an- tal da- gar mellan varje be- handling	Karenstid, dygn	Max dos kg/ha		
Höstraps	Mot bom- ullsmögel (<i>Sclerotia sclerotio- rum</i>)	BBCH 50-69	1 per år	-	Se sista beh. tid- punkt	0,5	Bomspruta	

Ytterligare villkor

- Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 43 dygnen efter behandling. Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

Restriktioner

Bontoc® som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Verknings sätt

Bontoc® är ett systemiskt svampmedel som innehåller 500 g/kg boskalid, för förebyggande och kurativ behandling mot svampsjukdomar i höstraps. Behandla förebyggande eller direkt efter att första symptomen är synliga.

RESISTENSRISK

Bontoc® innehåller boskalid som tillhör gruppen karboxamider i FRAC-grupp 7 (SDHI-svampmedel). Upprepad behandling med samma aktiva substans, eller aktiva substanser i samma familj ökar risken för uppkomst av resistens. För att förhindra att resistens utvecklas, bör Bontoc® ingå i en behandlingsstrategi tillsammans med preparat med andra verkningsmekanismer.

Som en del av en resistensstrategi rekommenderas att produkten används främst för förebyggande behandling. Vid användning i blandning med andra produkter bör den andra produkten innehålla aktiva substanser från andra kemiska grupper med annan verkningsmekanism. Vid behov av ytterligare behandlingar bör svampmedel med aktiv substans med annan verkningsmekanism användas.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Bomullsmögel

Rekommenderad dos vid behandling: 0,25 – 0,5 kg/ha. Den lägre dosen ska endast användas då skadetrycket är lågt.

Behandlingstidpunkt: Bontoc® får användas genom hela blomningen, fram till BBCH 69 (avslutad blom). Optimal behandlingstidpunkt är full blom BBCH 65 (50 % av blommorna utslagna).

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande eller vid begynnande angrepp. På utvecklade angrepp skall den högre dosen användas.

Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 100 – 400 L/ha. Högre vattenmängder vid stor bladmassa. Viktigt att säkerställa en god täckning av grödan för starkast effekt.

Regnfasthet: 2 timmar efter behandling.

Gröda	Skadegörare	Tidpunkt, utv.stadie	Dosering (kg/ha)
Höstraps	Bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Stadie 55-69	0,5

SKYDDSUTRUSTNING

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset.

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 43 dygnet efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

BEREDNING AV SPRUTVÄSKA

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador.

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Häll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, vattendrag eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

SPRIDNINGSTEKNIK

Bontoc® är systemisk i upptågande riktning. Detta medför att det är viktigt, speciellt i kraftiga grödor, att använda en spruteteknik som säkerställer att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätskan.

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Sprutan skall vara funktions-testad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras i mörkt, frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. Företaget frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

SPECIMEN