

# TRIMMER® 50 SG

## Ogräsmedel

Effektiv mot örtogräs

För användning i stråsäd och vall enligt bruksanvisningen.

**GRUPP 2 HERBICID**

### Verksamt ämne:

Tribenuronmethyl (CAS NR 101200-48-0)

500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering: Löslight granulat (SG)

Registreringsnummer: 5776

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: HRAC 2

### Innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborøvej 78

P.O. Box 9

DK-7673 Harbøre

Denmark

### Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederländerna

www.adama.com

Tel. +31 33 205 68 00

Scanna för  
användning



100 g e

© ADAMA Agan Ltd.

Reg. 5776. Användarkategori 2L.

### Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre med eller utan insädd.  
Mot örtogräs i odlingar av etablerad gräsvall.

Läs medföljande anvisningar före användning

### Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • 1% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

Inandas inte damm, ångor eller spray.

Använd skyddshandskar.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

### Första hjälpen

Sök läkarhjälp vid obehag.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

För mer information se säkerhetsdatablad.

*För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.*



**Avfall:** Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller [www.svepretur.se](http://www.svepretur.se)). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

**Batchnummer och tillverkningsdatum:** se förpackning.

**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum

UFI: 991X-82PF-7N42-C71N



SWEDEN

**UN 3077**

ANETRMSE100G/05/A

Reg. 5776. Användarkategori 2L.

öppna hår ►►

### Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre med eller utan insädd.  
Mot örtogräs i odlingar av etablerad gräsvall.

Läs medföljande anvisningar före användning

### Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • 1% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

Inandas inte damm, ångor eller sprej.

Använd skyddshandskar.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till en

godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

### Första hjälpen

Sök läkarhjälp vid obehag.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

För mer information se säkerhetsdatablad.

**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**



**Avfall:** Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller [www.svepretur.se](http://www.svepretur.se)). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

**Batchnummer och tillverkningsdatum:** se förpackning.

**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum

UFI: 991X-82PF-7N42-C71N



SWEDEN

UN 3077

ANETRMSE100G/05/A

## ANVÄNDNINGSVILLKOR

Trimmer® 50 SG ogräsmedel är godkänd för användning enligt nedanstående tabell.

Observera att hela bruksanvisningen för produkten ska följas.

| Gröda                                                                                  | Syfte        | Behandling<br>(Behandlingsmetod: Bomspruta) |                   |                  |                        | Bemärk                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |              | Utvecklingsstadium (BBCH)/säsong            | Karenstid (dagar) | Max antal beh/år | Max dos/tillfälle g/ha |                                                                                                                                                                                                                              |
| Vete, korn, råg, rågvete och havre                                                     | Mot örtogräs | BBCH 12-39<br>Endast vårbehandling          | 28                | 1                | 15                     | Karenstiden gäller om grödan används till foder.                                                                                                                                                                             |
| Vete med insädd, korn med insädd, råg med insädd, rågvete med insädd, havre med insädd | Mot örtogräs | BBCH 12-39<br>Endast vårbehandling          | 28                | 1                | 11                     | Insådden får bestå av klöver, gräs, lusern och timotej till utsäde.<br>Vid insädd med lusern får dosen vid en enskild behandling inte överstiga 7,5 g produkt per hektar.<br>Karenstiden gäller om grödan används till foder |

|                    |              |                      |    |   |    |  |
|--------------------|--------------|----------------------|----|---|----|--|
| Etablerad gräsvall | Mot örtogräs | Endast vårbehandling | 28 | 1 | 15 |  |
|--------------------|--------------|----------------------|----|---|----|--|

### Övriga villkor:

- Betsdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.
- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.

- Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
- Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

### RESTRIKTIONER OCH ANMÄRKNINGAR

- Trimmer® 50 SG ogräsmedel får inte användas i etablerad slåttervall.
- Slåttervallsinsådd som skördas samma år avråds från behandling på grund av risk för stråförkortning. Slåttervallsinsådd innehållande vitklöver och

alsikeklöver avråds från behandling med Trimmer® 50 SG ogräsmedel.

- Kontrollera effekten av behandlingen genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 kvadratmeter i fält.
- **Omsprutning/Omsådd:** Har stråsäden behandlats med Ally® Class 50 WG ogräsmedel, Ratio®Super SX® ogräsmedel, CDQTM SX® ogräsmedel, Harmony® 50 SX® ogräsmedel, Express® 50 SX® ogräsmedel, Trimmer 50 SG ogräsmedel eller Harmony® Plus 50 SX® ogräsmedel så avrådes från omsprutning med dessa preparat. Vid omsådd på ett fält behandlat med Trimmer® 50 SG kan endast stråsäd sås. Ally® Class 50 WG ogräsmedel, Ratio®Super SX® ogräsmedel, CDQTM SX® ogräsmedel, Harmony® 50 SX® ogräsmedel, Express® 50 SX® ogräsmedel, Trimmer® 50 SG ogräsmedel eller Harmony® Plus 50 SX® ogräsmedel i den omsådda stråsädesgrödan.
- **Sorter:** Nytt sortmaterial utvecklas kontinuerligt inom varje gröda. Innan Trimmer® 50 SG ogräsmedel används i en ny sort, kontrollera hos återförsäljaren att praktiska erfarenheter och/eller försöksresultat föreligger. Havresorten Matilda kan i vissa fall vara känslig, därmed avråder ADAMA från behandling i Matilda-havre.
- **Stråförkortning:** Viss stråförkortning kan ibland uppkomma.

## FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:** Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

**Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. I händelse av hudirritationer eller allergiska reaktioner kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

**Ögonkontakt:** Skölj genast grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Använd tempererat vatten och håll ögonen öppna under sköljningen. Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.

**Förtäring:** Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. Framkalla inte kräkning såvida inte läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra det. Om den skadade är vid medvetande: skölj munnen med vatten.

**Tel. vid olycksfall:** 24 timmars-service: 020-99 60 00  
(utland +46 (0)8 33 70 43)

## ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

### Verkningssätt

Trimmer® 50 SG ogräsmedel är en systemisk herbicid.

De flesta förekommande örtogräs i stråsäd bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttagas inom 1-3 veckor.

De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Trimmer® 50 SG ogräsmedel.

Trimmer® 50 SG ogräsmedel är i huvudsak ett bladverkande medel men har en viss jordverkan. Trimmer® 50 SG

ogräsmedel ger god verkan även vid låga temperaturer ner till +5°C, ogräsen ska vara i tillväxt. Sprutning under mycket torra betingelser kan försämra resultatet varför en morgonbehandling gärna med dagg rekommenderas för att säkerställa en god effekt.

### **Resistensrisk**

Trimmer® 50 SG ogräsmedel innehåller tribenuronmetyl som tillhör verkningsmekanismgrupp: HRAC:2 (tidigare HRAC B).

När ogräsmedel med samma eller liknande verkningsätt används ensidigt på samma areal under en lång följd av år kan naturligt resistent exemplar av ogräs selekteras fram, föröka sig och bli dominerande på fältet.

Om ett ogräs är resistent mot ett sulfonylureamedel från HRAC grupp 2, är det korsresistent mot andra medel med samma verkningsmekanism. Flera fall av resistens mot sulfonylureamedel har identifierats hos våtarv, åkerven, vallmo, renkavle, och enskilda fall hos dån och gullkrage.

### **Rekommendationer**

- 1) Om resistens har konstaterats mot Trimmer® 50 SG ogräsmedel, ombehandlas fältet snarast möjligt med ett annat, effektivt medel som har en annan verkningsmekanism mot denna ogräsart. Se nedan under förebyggande åtgärder.
- 2) Uppkomsten av resistens kan undvikas genom att alternera med, eller att blanda med, ogräsmedel

med annat verkningssätt som är verksamt på samma ogräsarter.

Följ HRACs rekommendationer när du väljer en annan typ av produkt. En mångsidig växtföljd med effektiv ogräsbekämpning i varje gröda eller ett aktivt trädesbruk är också bra åtgärder mot uppkomst av herbicid-resistens.

## DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

### *Ogräsarternas känslighet och dosering*

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan dock ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under "känsliga ogräs".

### *Behandlingstidpunkt*

Höstsäd, våren: Bäst effekt erhålles tidigt på våren så snart ogräsen börjat växa.

Temperaturen bör dock lägst vara +5°C.

Vårsäd, fastmarksjord: Bäst effekt erhålles om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium.

Vårsäd, mulljor: Bäst effekt erhålles om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan.

| Gröda                                                                    | Behandlings-<br>tid | Dos<br>max<br>g/ha | Karens-<br>tid*<br>(dagar) | Max<br>antal<br>beh |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Vårsäd                                                                   | BBCH 12-39          | 15                 | 28                         | 1 pr år             |
| Vårsäd med<br>insädd av timotej<br>till utsäde<br>Timotej för utsäde     | BBCH 12-39          | 11                 | 28                         | 1 pr år             |
| Vårsäd med<br>gräsinsädd                                                 | BBCH 12-39          | 11                 | 28                         | 1 pr år             |
| Vårsäd med<br>gräsinsädd inkl<br>rödklöver                               | BBCH 12-39          | 11                 | 28                         | 1 pr år             |
| Vårsäd<br>med gräsinsädd<br>inkl lusern                                  | BBCH 12-39          | 7.5                | 28                         | 1 pr år             |
| Höstssäd                                                                 | BBCH 20-39          | 15                 | 28                         | 1 pr år             |
| Höstsäd med<br>insädd av timotej<br>till utsäde<br>Timotej för<br>utsäde | BBCH 20-39          | 11                 | 28                         | 1 pr år             |

|                                           |                                                                           |     |    |         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|
| Höstssådd med gräsinsådd                  | BBCH 20-39                                                                | 11  | 28 | 1 pr år |
| Höstssådd med gräsinsådd inkl rödklöver   | BBCH 20-39                                                                | 11  | 28 | 1 pr år |
| Höstssådd med gräsinsådd inkl lusern      | BBCH 20-39                                                                | 7.5 | 28 | 1 pr år |
| Permanent betesvall (endast gräs) (foder) | Etablerad gröda, skörde-täckning >90 %. Endast vårbehand-ling (april-maj) | 15  | 28 | 1 pr år |

\*Karenstiden gäller om grödan används till foder.

## **OBS Endast vårbehandling**

### **Jordtyp**

Trimmer® 50 SG ogräsmiddel har god ogräseffekt på såväl lerjordar och sandjordar som på mulljordar.

### **Höstsäd**

Endast vårbehandling.

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
|  | >85% effekt | 70-75% effekt |
|--|-------------|---------------|

|                                                                                                                                                        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Känsliga ogräs:</b><br>Arvraps, baldersbrå, blåklint, dân,<br>förgätmigej, kamomill, lomme,<br>näva, penningört, plister, målla,<br>vallmo, våtarv. | 15 gram | 11 gram |
| <b>Mindre känsliga ogräs:</b><br>Harkål, trampört, viol, åkerbinda,<br>åkertistel (1)                                                                  | -       | 15 gram |

<sup>(1)</sup> Åkertisteln ska vara i 10 - 20 cm-stadiet vid spruttidpunkten.  
Begränsad effekt (<70%): Snärjmåra, Veronika.

## Vårsäd

|                                                                                                                                                                             | >85% effekt | 70-75% effekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Känsliga ogräs:</b><br>Arvraps, baldersbrå, dân,<br>förgätmigej, kamomill, lomme,<br>målla, näva, penningört, plister,<br>våtarv, åkerpilört, åkersenap,<br>åkerspergel. | 11 gram     | 7.5 gram      |
| <b>Mindre känsliga ogräs:</b><br>Jordrök, trampört, åkerbinda,<br>åkertistel (1)                                                                                            | -           | 15 gram       |

<sup>(1)</sup> Åkertisteln ska vara i 10 - 20 cm-stadiet vid spruttidpunkten.

Havresorten Matilda kan i vissa fall vara känslig, därmed  
avråder ADAMA från behandling i Matilda.

## Insådd av slåttervall

Observera att Trimmer® 50 SG ogräsmedel inte får  
användas i etablerad slåttervall.

## Slåttervallsinsådder av klöver/gräs, lusern

Bästa behandlingstidpunkt är när klövern har 1-2 treväpplingar vilket är något senare än normal spruttidpunkt. Se figur nedan:

### Klöverns utvecklingsstadier

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Rätt tidpunkt<br> |
| Hjärtbladstadie                                                                   | Spadbladstadie                                                                    | Treväpplingstadie                                                                                  |

Behandling kan ske i både slåttervallsinsådder i skyddssäd eller i renbestånd.

Slåttervallsinsådd som skördas samma år avråds från behandling på grund av risk för stråförkortning.

Slåttervallsinsådd innehållande vitklöver och alsikeklöver avråds från behandling med Trimmer® 50 SG ogräsmedel.

*Anpassa dosen till din insådd och ogräsförekomst enligt följande:*

| Insådd                          | Dos/ha                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gräs och rödklöver i blandning: | 7,5 – 11 gram Trimmer® 50 SG ogräsmedel + 0,5 L MCPA.<br>Vid stor förekomst av spillraps, baldersbrå eller kamomill använd den högre dosen Trimmer® 50 SG ogräsmedel. |

| Insådd                                                              | Dos/ha                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gräs och lusern eller enbart lusern eller timotejfrö insåningsåret: | 7,5 gram Trimmer® 50 SG ogräsmedel + 0,25 dL vätmedel/100 L vatten. Vid enbart gräsinsådd kan ogräseffekten förbättras genom en ökning av dosen till 11 gram. |
| Gräs, rödklöver och lusern i blandning:                             | 7,5 gram Trimmer® 50 SG ogräsmedel + 0,25 dL vätmedel/100 L<br>Kan påverka rödklövern till viss del.                                                          |

### *Ogräseffekter*

Ogräseffekterna är något lägre än de effekter som redogörs under vårsäd under förutsättning att ogräsen inte börjat blomma vid spruttillfället.

### *lakttagelser efter behandlingen*

Efter behandlingen stannar tillväxten upp rödklöver och ängssvingel upp och man kan skönja en svagt ljusgul färg på plantan, tydligast är detta i rödklöver. Efter att skyddsgrödan är tröskad och halmen bärgad kan man emellertid konstatera att plantorna återhämtar sig och tillväxten sätter igång. Den tillbakahållande effekten på insådden under skyddsgrödans utveckling kan dessutom vara en fördel. Vid en svag utveckling av skyddsgrödan riskerar klövern att växa igenom och skapa problem vid den kommande tröskningen.

### **Gräsinsådder**

Gräsinsådder kan behandlas insåningsåret om Trimmer® 50 SG ogräsmedel doseras på samma sätt som stråsåd

utan insådd. Gräsinsådden bör dock ha ett blad vid behandlingstillfället. Ängssvingel är det känsligaste grässlaget och kan påverkas men har i försöken återhämtat sig. All behandling skördeåret avråds.

### **Permanent betesvall**

Trimmer® 50 SG ogräsmedel kan användas hela våren förutsatt att ogräsen är i tillväxt att behandlingen görs innan blomning av ogräsen. Som regel är effekten bäst när bekämpningen utförs cirka 14 dagar efter en betesputsning. Karenstid: 7 dagar.

Dos: 15 gram Trimmer® 50 SG ogräsmedel + 0,25 dL vätmedel/100 L vatten.

Känsliga ogräs är baldersbrå, hundkäx, lomme, maskros, smörblomma och våtarv. Mindre känsliga ogräs är nässla, skrappa och syra.

**OBS!** Betesgräset kan temporärt växtregleras. Vitklövern kan växtregleras starkare och temporärt uttunnas men återhämtar sig.

## **SPRUTNING**

### ***Beredning av sprutvätska***

Fyll spruttanken till hälften med vatten, starta omrörningen och tillsätt erforderlig mängd Trimmer® 50 SG ogräsmedel. Tillsätt sedan resten av vattnet. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter. Använd en biobädd eller en

platta med uppsamling. Tillredd sprutväska bör användas samma dag.

### **Vätmedel**

Normalt rekommenderas tillsats av ett non-joniskt vätmedel då Trimmer® 50 SG ogräsmedel används ensamt. Dosen för vätmedlet är 0,5 dl per 100 L vatten, lägre dos vid sprutning i insådder (se separat rekommendation).

### **Vätskemängd**

Rekommenderad vätskemängd 100-200L/ha.

### **Spridningsteknik**

Val av vätskemängder, storlek på munstycken, tryck och körhastighet ska säkra en jämn täckning av plantorna samt minimera avdriften. Vid spridning av Trimmer® 50 SG ogräsmedel följ anvisningarna i broschyrerna "Hjälpredda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Denna finns att hämta på [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se)

### **Rengöring av sprututrustning**

Börja alltid sprutarbetet med en ren spruta. Kontrollera att det inte finns beläggningar eller rester i tanken, speciellt då många tankblandningar kan ge beläggningar. Läs etiketten för det sist använda medlet för rengöring av sprutan. De flesta beläggningar kan lösas upp genom att sätta sprutan i blöt med 0,5 l All Clear® Extra per 100 l vatten. För sprutning av alla medel gäller: Skölj tanken/sprutan efter att dagens sprutarbete är avslutat eller fyll tanken med vatten så sprutresten inte torkar in, även om samma medel

skall användas nästa dag. Speciellt kan tankblandningar med "EC" formuleringar och/eller mikronäringsämnen ge beläggningar i tanken, som kan vara mycket svårt att få bort, om de torkar in.

### **Rengöring av sprututrustningen efter Trimmer® 50 SG ogräsmedel:**

**FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ ANDRA GRÖDOR ÄN STRÅSÄD EFTER SPRUTNING MED PRODUKTEN, TVÄTTA NOGGRANT ALL UTRUSTNING OMEDELBART EFTER AVSLUTAD SPRUTNING, BÅDE INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT, GENOM ATT FÖLJA PROCEDUREN NEDAN:**

Starta alltid med en ren tank och sprutsystem. Rengör utrustningen noggrant omedelbart efter användningen.

1. Tvätta noggrant och fullständigt alla tankens inre ytor, inklusive locket, med rent vatten (använd minst 10 % av tankens kapacitet), så att alla rester och avlagringar tas bort. Spola pump, filter och bom efter att silar, munstycken och filter har tagits bort (tvätta dessa separat). Töm ur resten av tvättvattnet från tanken.
2. Fyll sprutan med minimum 10 % av tankens kapacitet med rent vatten och tillsätt 0,5 liter All Clear® Extra per 100 liter vatten. Spruta ut lite av tvättvattnet genom bom och munstycken, så att dessa blötläggs. Låt stå i minst 15 minuter med omrörning och sköljning igång.
3. Töm sprutan. Upprepa spolning (min 10% av tankens kapacitet) och tömning.
4. Ta hand om sköljvattnet enligt nationella och lokala bestämmelser. Se till, att tvätt- och sköljvatten inte

spolas ut så att det förorsakar skada på träd eller känsliga grödor eller kan förorena yt- eller grundvatten.

5. Munstycken och filter ska tas bort och rengöras separat med All Clear® Extra i samma koncentration som vid rengöring av sprutan.

## SKYDDSUTRUSTNING

Se också närmare anvisningar i produktens säkerhetsdatablad.

Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd (EN166).

Handskydd: Skyddshandskar (nitril, 0,4 - 0,7 mm, klass 6, användningstid: > 480 min).

Kroppsskydd: Heltäckande skyddskläder typ 5 - 6 (EN ISO 13982-2/EN 13034), gummiförkläde, gummistövlar av nitrilgummi (EN 13832-3/EN IS 20345)

Andningsskydd: Halvmask med partikelfilter FFP1 (EN 149).

Vid sprutning med traktor försedd med sluten förarhytt och luftfilter behövs normalt inte skyddskläder eller andningsskydd.

Allmänna hygienåtgärder: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avstå från mat, dryck, rökning och snusning vid arbetsplatsen. Får ej komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Ta av nedsmutsade kläder. Förvara skyddsutrustning separat. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspassets slut. Byt ut skadad utrustning.

## AVFALL

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen. Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatresten och brukad förpackning är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshantering. Rengjord förpackning kan lämnas till Svepretur. (Vi är anslutna till SvepRetur, tel 0370-17385, [info@svepretur.se](mailto:info@svepretur.se)).

## FÖRVARING

Förvara produkten på en torr, sval och frostfri plats för att på bästa sätt bevara dess hållbarhet. Förvaras oåtkomligt för barn, åtskilt från livsmedel och foder, samt på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förvara alltid produkten i originalförpackningen.

## ATT BEAKTA

Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren frångår sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter, nya sorter, och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämra ogräseffekten. Minskad dosering

ger alltid osäkrare ogräseffekt och förutsätter optimala betingelser för att omsprutning skall undvikas. Tillverkaren kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

Köp av detta material medför inga rättigheter under patent i länder utanför Sverige.

*Registrerat varumärken:*

Trimmer® - ADAMA Agriculture B.V., Amsterdam (NL), Schaffhausen Branch;

FMC Ally®, All Clear®, CDQ™, SX®, Harmony®, Ratio® - FMC Corporation.

# TRIMMER® 50 SG

## Ogräsmedel

GRUPP 2 HERBICID

Effektiv mot örtogräs

För användning i stråsäd och vall enligt bruksanvisningen.

### Verksamt ämne:

Tribenuronmethyl (CAS NR 101200-48-0) 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering: Löslight granulat (SG)

Registreringsnummer: 5776

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: HRAC 2

### Innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78

P.O. Box 9

DK-7673 Harbøre

Denmark

### Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederländerna

www.adama.com

Tel. +31 33 205 68 00



ADAMA

Scanna för  
användning



© ADAMA Agan Ltd.

10 x 100 g

Reg. 5776. Användarkategori 2L.

### Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre med eller utan insädd • Mot örtogräs i odlingar av etablerad gräsvall.

Läs medföljande anvisningar före användning

### Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter • 1% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

Inandas inte damm, ångor eller spray.

Använd skyddshandskar.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Samla upp spill.

Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

### Första hjälpen

Sök läkarhjälp vid obehag • Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp • För mer information se säkerhetsdatablad.

**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

**Avfall:** Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller [www.svepretur.se](http://www.svepretur.se)). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

**Batchnummer och tillverkningsdatum:** se förpackning.

**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum



UN 3077




SWEDEN

UFI: 991X-82PF-7N42-C71N

ANETRMSE100G/05/C

# TRIMMER® 50 SG



SWEDEN



VARNING

135 x 1 KG



UN 3077

ADAMA

Northern Europe B.V.



ANETRMSE100G/05/X