

การทำงานของ X-เอ็กซ์-โกรในพืช

▷ กระตุ้นกระบวนการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล



- ▷ ส่งเสริมและสร้างสมดุลของไซโตไคนินและออกซิน
- ▷ ยับยั้งการสร้างสารเอธิลีน
- ▷ ช่วยชะลอการสุกแก่ ลดการหลุดร่วง
- ▷ ช่วยให้พืชนำธาตุอาหารมาใช้ได้มากขึ้น

▷ เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

- ▷ ลดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์
- ▷ ระหว่างกระบวนการหายใจ

▷ ป้องกันผลกระทบจากความเครียดจาก

- สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น แสงแดด ความแห้ง ความเย็น สารเคมี
- ▷ ปรับสมดุลการเข้า-ออกของน้ำ ทั้งทางรากและปากใบ



เพิ่มการสร้างอาหาร และการเจริญเติบโต



คุณภาพเพิ่ม
เต็ม ผลผลิต

อัตราการใช้ในพืชต่างๆ

นาข้าว		40-60 ซีซี ต่อไร่
อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด		
ไม้ผล : ส้ม ทุเรียน ลำไย มังคุด		
กลุ่มผัก แดง ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเทศ		
กลุ่มผักตระกูลกะหล่ำและผักกินใบ		10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชหัว เช่น หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่		
กลุ่มหัว มันฝรั่ง		
ไม้ดอกและไม้ประดับ		



สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบ และสารกำจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ



บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด

127/33 อาคารปัญญาณี ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2681-1979 แฟกซ์ 0-2681-1977
www.adama.com/thailand , www.facebook.com/adamathailand

