

โรมอน โกลด์

น็อคทันที

จากไบเฟนทริน 5% สารกลุ่ม 3A (ไพริทรอยด์ **สูตรไม่แสบไม่คัน**)

คุมไช่ยาวนาน

จากโนวาลูรอน 5% (IGR) สารกลุ่ม 15 ยับยั้งการลอกคราบ
หนอนหยุดเติบโต **คุมไช่หนอน** ทำให้ตัวเมียเป็นหมัน
ไช่จะฝ่อ ไม่สามารถฝักเป็นตัวได้

สูตรครีမ်

ใช้ง่าย สามารถพ่นได้ทุกระยะ และผสมกับสารอื่นได้เป็นอย่างดี

น็อคทันที

คุมไช่ยาวนาน

- ▶ เหมาะกับการใช้ทดแทนยาน็อค สารกลุ่มไพริทรอยด์
- ▶ ด้วย 2 พลังออกฤทธิ์ที่แตกต่าง ช่วยลดปัญหาหนอนดื้อยา
- ▶ น็อคเร็ว และคุมไช่หนอน ช่วยลดการระบาดซ้ำ

ใช้ได้ทั้งในผักและไม้ผล



ทุเรียน



มะม่วง



ส้ม



ลำไย



พริก



มะเขือเทศ



คะน้า



แตงโม




กะหล่ำ




ข้าวโพด

เพื่อลดการระบาดของหนอนที่รุนแรง : ควรใช้ โรมอน โกลด์ ผสมหรือสลับกับสารต่างกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดหนอน และลดปัญหาหนอนดื้อยา เช่น ผสมหรือสลับ กับ ฟลิทอรา สารกลุ่ม 15+22A หรือ ดูริโว สารกลุ่ม 28+6 หรือ กานโต สารกลุ่ม 2B

อัตรา 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นได้ทุกระยะ เช่น ช่วงสะสมอาหาร, ช่วงติดดอก, ออกผล




หนอนเจาะดอก



หนอนเจาะผล



หนอนกัดใบ



หนอนใยฝัก




หนอนซอนใบ



หนอนกระทุ้ฝัก



หนอนหนังเหนียว



หนอนประกบใบ



หนอนเจาะผล
มะเขือเทศ



หนอนกระทุ้สายจุด

สารกำจัดแมลง



สำหรับ โดรน 10 ลิตร : ทุเรียน และ ลำไย : 300-500 ซีซี ต่อไร่
มะม่วง ส้ม และ ฝักอื่นๆ : 200-300 ซีซี ต่อไร่