

ทันใจ»

ด้วย...พลังน็อคจาก สารไบเฟนทริน 5% [กลุ่ม 3A]  
(ไพริทรอยด์ สูตรไม่ระคายเคือง)

ได้นาน»

ด้วย... พลังยับยั้งการลอกคราบ จาก สารโนวาลูรอน 5 % [กลุ่ม 15] (IGR)  
ทำให้หนอนหยุดการเติบโต มีฤทธิ์คุมไข่ ตัวเมียเป็นหมัน  
ไข่ฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัวหนอนได้

ทันใจ»  
ได้นาน»

ด้วย...สูตรครีม ฟันได้ทุกระยะ ผสมกับสารฯ อื่นได้ดี

ทันใจ»  
ได้นาน»

ด้วย...2 สารออกฤทธิ์ที่แตกต่าง ลดปัญหาหนอนดื้อยา

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ผล 10-15 ซีซี

ผัก 15-20 ซีซี

ข้าวโพด 20 ซีซี



หนอนเจาะ:ดอก



หนอนเจาะ:ผลส้ม



หนอนเจาะ:พลมะเขือเทศ



หนอนกัดใบ



หนอนประกบใบ



หนอนซ่อนใบ



หนอนหน้างเหนียว



หนอนใยผัก



หนอนกระตุ้พัก



หนอนกระตุ้ข้าวโพดหลายจุด

เพื่อลดการระบาดของหนอนที่รุนแรง และลดปัญหาการดื้อยา



ควรใช้ **โรมอน โกลด์** ผสม หรือ สลับ กับสารต่างกลุ่ม

- ▶ **ฟลิทอรา** [กลุ่ม 15+22 A] อัตรา 30-40 ซีซี ในผัก  
อัตรา 10-20 ซีซี ในไม้ผล หรือ
- ▶ **ดูริโว** [กลุ่ม 28+6] อัตรา 15-20 ซีซี หรือ
- ▶ สารพื้นฐาน **ดามาติน** [กลุ่ม 6] อัตรา 5-10 กรัม  
หรือ **กานโต** [กลุ่ม 2B] อัตรา 20-30 ซีซี

