

มั่นใจ... 2 พลังบวก ของสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

กลุ่ม 15 : สารโนวาลูรอน 5.67%

กลุ่ม 22A : สารอินดอกซาคาร์บ 4.86%

ยับยั้งการสร้างไคติน ทำให้หนอนหยุดลอกคราบ หยุดทำลาย ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย

ออกฤทธิ์สัมผัส ถูกตัวตาย เข้าทำลายระบบประสาทของหนอน ทำให้หนอนหยุดทำลาย และตายในที่สุด

ทำให้ตัวเมียเป็นหมัน ไข่ฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัวได้

มั่นใจ... ลดปัญหาหนอนดื้อยา ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

มั่นใจ... สูตรครีမ် ใช้ง่าย ละลายน้ำดี ใช้ผสมกับสารฯ อื่น ได้ง่าย

มั่นใจ... เรื่องภัยหนอน ป้องกัน-กำจัดได้นานวัน



ข้าว



หนอนกอ



หนอนม้วนใบ



หนอนปลอก



ผัก



หนอนหนังเหนียว



หนอนใย



หนอนกระทู้ผัก



หนอนเจาะผล



ไม้ผล



หนอนเจาะผลทุเรียน



หนอนเจาะผล



หนอนกัดใบ



หนอนเจาะดอก



ข้าวโพด



หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

อัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ข้าว : พ่นได้ทุกช่วง ตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอ ถึง ออกรวง อัตรา 120 ซีซี ต่อไร่

ผักและไม้ผล : พ่นได้ทุกช่วงตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ถึงติดผล อัตรา 120 ซีซี ต่อไร่

ข้าวโพด : พ่นได้ทุกช่วงเมื่อพบการระบาดของหนอน อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์ ใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ ใช้น้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่

