ระยะทำใบหรือระยะใบอ่อน | ระยะเพสลาด | ระยะใบแก่ | ระยะตาปู | ระยะเหยียดตีนหนู | ระยะมะเขือพวงหรือกระดุม | ระยะหัวกำไล | ระยะดอกขาวหรือดอกบาน | ระยะหางแย้ | ระยะติดลูก | ระยะกระป๋องนม | ระยะผล แก่

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร

คัสโตเดีย 20 ซีซี

เชื้อพืชซาเรียม | โรคกิ่งแห้ง | โรคราสีชมพู

คัสโตเดีย

เพื่อป้องกัน 10 ซีซี เพื่อรักษา 20 ซีซี

โรคใบติด | โรคใบจุดสาหร่าย

คัสโตเดีย + เซบิโอ้

เพื่อป้องกัน 10+10 ซีซี
เพื่อรักษา 20+20 ซีซี

ใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส | ใบไหม้ โรคไฟท็อปธอร่า | ใบไหม้ โรคไฟท็อปธอร่า

คัสโตเดีย หรือ บัมเปอร์ พี เพื่อป้องกัน 10 ซีซี เพื่อรักษา 20 ซีซี หรือ เมอร์แพน เพื่อป้องกัน 20 กรัม

โรคราแป้ง (ใบ) | โรคราแป้ง (ลูก)

แฮมเปอร์ 15-20 ซีซี

เพลี้ยไก่แจ้ | เพลี้ยจักจั่นฝอย

โคเซอร์ ใช้เพียง 6 กรัม

ไรแดง

ไรมอน โกลด์ 10-15 ซีซี

พ่นช่วงสะสมอาหาร, ช่วงติดดอก, ออกผล

หนอนเจาะดอก

เคสเทรล หรือ ไรมอน โกลด์ 20 ซีซี 20 ซีซี

เพลี้ยหอย เกล็ดหุเรียน

แฮมเปอร์ 20 ซีซี

เพลี้ยไฟ

แฮมเปอร์ หรือ โคฮีนอร์ เอ็กซ์ 20 ซีซี

เพลี้ยไฟ

เอ็กซ์-โกร 10-20 ซีซี

ช่วงใบหุเรียน

เอ็กซ์-โกร 20 ซีซี

ช่วงดอกหุเรียน

แอนแทรคโนส

บัมเปอร์ พี

เพื่อป้องกัน 10 ซีซี เพื่อรักษา 20 ซีซี

แอนแทรคโนส

คัสโตเดีย หรือ บัมเปอร์ พี

เพื่อป้องกัน 10 ซีซี
เพื่อรักษา 20 ซีซี

ผลเน่า โรคพิชาเรียม | ผลเน่า โรคลาซิโอดิพโลเดีย | ผลเน่า โรคไฟท็อปธอร่า

คัสโตเดีย + เซบิโอ้

เพื่อป้องกัน 10+10 ซีซี
เพื่อรักษา 20+20 ซีซี

เคสเทรล หรือ ไรมอน โกลด์ 20 ซีซี 20 ซีซี

เพลี้ยแป้ง

พลีทอร่า 20 ซีซี

พ่นได้ทุกระยะ

หนอนเจาะผล | หนอนเจาะเมล็ด

เคสเทรล หรือ ไรมอน โกลด์ 20 ซีซี 20 ซีซี

เพลี้ยหอย เกล็ดหุเรียน

ช่วงติดลูก

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

คัสโตเดีย + เซบิโอ้

ทีบูโคนาโซล (กลุ่ม 3) + อะซอกซีสโตรบิน (กลุ่ม 11)

ไดเมโทมอร์ฟ (กลุ่ม 40)

ถาก ○ ทา ○ พ่น

1. ถากเปลือกที่เป็นโรค
2. ทาบริเวณรอยแผลที่ถาก และรอบ ๆ รอยถากจนทั่ว
3. พ่นให้ทั่ว บริเวณแผล

อัตราการใช้ : ผสมเซบิโอ้ + คัสโตเดีย อย่างละ 30 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
ทาหรือพ่นบริเวณแผลถากและรอบๆ ให้ทั่ว 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

พ่นทั่วต้น

อัตราการใช้ : เซบิโอ้ + คัสโตเดีย อย่างละ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

1.เตรียมสาร

2.ชุบผลในสาร 3 นาที

3.ผึ่งลมให้แห้ง 3 นาที

ชุบผล

อัตราการใช้ : ผสมเซบิโอ้ 30 ซีซี + คัสโตเดีย 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ลดปัญหาผลผลิตเสียหายในระหว่างการขนส่ง

ก่อน

หลัง

กำจัดตะไคร่ เพื่อลดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

สบายใจ...ใช้ เมอร์แพน

แคปแทน (กลุ่ม M4)

อัตราการใช้ : ผสมเมอร์แพน 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร