



ทุเรียน



สารกำจัดแมลง



ไบเฟนทริน (3A) + อิมิดาโคลพริด (4A)

แฮมเปอร์ คัม...

- ▶ กำจัดได้ ทั้งเพลี้ยและหนอน ป้องกันทุเรียนหนามจืด
- ▶ 2 พลัง คูดซิมและพลังน็อคลดปัญหาหนอนด้อยา
- ▶ สูตรคริม ใช้ง่ายปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ

อัตราการใช้ : 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นได้ทุกระยะ



โรมอน โกลด์

โนวาลูรอน (กลุ่ม 15) + ไบเฟนทริน (กลุ่ม 3A)

สูตรคริม แทนการใช้ยานี้อค

น็อคทันใจ

คุมเข้านานวัน

- ▶ ด้วย 2 พลังออกฤทธิ์ที่แตกต่าง ช่วยลดปัญหาหนอนด้อยา
- ▶ แทนยานี้อค กลุ่มไพโรทรอยด์ สูตรไม่แสบไม่คัน
- ▶ คุมเข้านอน ช่วยลดการระบาดซ้ำ

อัตราการใช้ : 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นช่วงสะสมอาหาร, ช่วงติดดอก, ออกผล



พลีทอรา

โนวาลูรอน (กลุ่ม 15) + อินดอกซาคาร์บ (กลุ่ม 22A)

- ▶ 2 พลังบวก ของสารออกฤทธิ์ที่แตกต่าง
- ▶ ลดปัญหาหนอนด้อยา
- ▶ สูตรคริม ใช้ง่ายละลายน้ำดี ใช้ผสมกับสารอื่นได้

อัตราการใช้ : 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นได้ทุกระยะ

มั่นใจ... เรื่องภัยหนอน



โคฮีนอร์ เอ็กซี

อิมิดาโคลพริด (กลุ่ม 4A)

- ▶ ต้นตำรับ สูตรคริมเข้มข้นผสมง่าย
- ▶ ป้องกัน/กำจัด แมลงปากดูด
- ▶ ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ

อัตราการใช้ : อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



โคเซอร์

เฮกซีโทอะซอกซ์ (กลุ่ม 10A)

คุม...ไซโร

ฆ่า...ตัวอ่อนโร

- ▶ ทำให้ไซโฟไม่สามารถฟักเป็นตัวได้
- ▶ ช่วยลดปริมาณโร ได้เป็นอย่างดี

- ▶ ยับยั้งการสร้างไคติน
- ▶ ตัวอ่อนไม่สามารถลอกคราบได้และตาย

- ▶ คุมไซ ฆ่าตัวอ่อน
- ▶ คุมครองยาวนาน

อัตราการใช้ : เพียง 6 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นช่วงระยะใบเพสลาด ถึงใบแก่



กานโต

ฟิโพรนิล (กลุ่ม 2B)

- ▶ สูตรคริม มาตราฐานยุโรป
- ▶ สามารถใช้ผสมหรือสลับกับสารกลุ่มอื่น
- ▶ พ่นลำต้น และกิ่งที่มีรูมอด

อัตราการใช้ : 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เคสเทรล

อะซีทามิพริด (กลุ่ม 4A)

- ▶ ต้นตำรับสูตรคริม
- ▶ ใช้ง่าย ผสมหรือสลับกับสารต่างกลุ่ม
- ▶ ลดปัญหาการตีเี่ยวของแมลงปากดูด

อัตราการใช้ : 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



ก่อนใช้

หลังใช้ 7 วัน

สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

Xเอ็กซี-โกร

ชุด เปิดตาดอกทุเรียน



ปุ๋ยเกล็ด สูตร 13-0-46

คุณภาพเพิ่มเต็ม ผลผลิต

- ▶ เพิ่มการติดดอก
- ▶ ออกผลมากขึ้น


อัตราการใช้ : เอ็กซี-โกร 20 ซีซี + ปุ๋ยเกล็ดสูตร (13-0-46) 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร



ฟอร์แมส

อีทีฟอน 48%

- ▶ ใช้ซบูกทุเรียน 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ▶ ใช้ป้ายขั้วทุเรียน สูตรเข้มข้น ไม่ต้องผสมน้ำ



วัชพืช โคนต้น และ ระหว่างร่อง

สารกำจัดวัชพืช

ออสซิเนต

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (กลุ่ม H)

สูตรสำเร็จ หย้าเสร็จทุกราย

อัตราการใช้ : 150 - 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



รับรู้ - เรียนรู้ - ส่งมอบ

