

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 28/09/1993 ve 2665

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	150 g / 100 L su	3 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g / 100 L su	3 gün
Erik	Cep Hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g / 100 L su	3 gün
Şeftali	Monilia (<i>Sclerotinia laxa</i>)	300 g / 100 L su	3 gün
Kiraz, vişne	Monilia (<i>Sclerotinia laxa</i>)	300 g / 100 L su	3 gün
Şeftali, Kayısı	Yaprakdelen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	300 g / 100 L su	3 gün
Yeni Dünya	Karaleke (<i>V. inaequalis</i> var. <i>eriobotryae</i>)	300 g / 100 L su	3 gün
Turuncgiller	Turuncgıl meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g / 100 L su (Meyve enfeksiyonları)	7 gün
Bağ**	Ölülük (<i>Phomopsis viticola</i>)*	250 g / 100 L su (Yaz uygulaması)	3 gün
	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g / 100 L su	3 gün
Sebze Fideleri***	Kök Çürüklüğü (Çökerten) (<i>Pythium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	200-250 g / 100 L su	7 gün
Domates	Yaprak Küfü (<i>Cladosporium fulvum</i>)	250 g / 100 L su	7 gün
	Mildiyö(<i>Phytophthora infestans</i>)	300 g / 100 L su	7 gün
Marul	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	300 g / 100 L su	7 gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	300 g / 100 L su	7 gün
Domates	Sebzelerde Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 g / 100 L su	7 gün
Tütün (Fidelik)	Çökerten (<i>Pythium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Sclerotinia</i> spp.)	200 g / 100 L su	-
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	350 g / 100 L su	7 gün
Karanfil	Pas (<i>Uromyces caryophyllus</i>)	250 g / 100 L su	7 gün

*Yaz uygulamasında kullanılır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamaz.

***Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaşı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaşı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. FLO-CAPTAN® 50 WP

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	M4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

%50 CAPTAN

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Tekrarlanan maruz kontakt dermatite neden olabilir, Deri, burun ve boğazda tahriş yapabilir. Gözle temas halinde kızarıklık ve gözyaşı yapabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

SOLUMA: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

YUTMA: Ağız iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

CİLTLE TEMAS: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

GÖZLERLE TEMAS: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın. Yutulduğunda, gastrik lavaj yapın ve aktif kömür uygulayın.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI(KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Captan
-------------	--------



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/ buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Korumayı kullanın, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. **P501** İçeriği/ kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL : 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut Karalekesi: Dal sıracası yok ise 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma Karalekesi: Dal sıracası yok ise, 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Eriklerde Cep Hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde

2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali Monilia: 1. İlaçlama, Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2. İlaçlama, tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Kiraz ve Vişne Monilia: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte)

2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte).

Şeftali Yaprakdelen(Çil): 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçeklere açmadan açılmadan önce yapılır.

Kayısı Yaprakdelen: 1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra

2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce(pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

3. ilaçlama meyveler çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turuncgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:

*Meyve enfeksiyonlarına karşı

1. ilaçlama sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

2. ilaçlama havalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.

Yenidünya Karalekesi: 1. ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce 2. ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra 4. ve diğer ilaçlamalar 3. ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün ara ile yapılır.

Bağ Ölükol:

*Yaz ilaçlaması; 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyö: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalıdır, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 10-15 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde Kök Çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Domates Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü gibi konidi örtüsünün görülmesi veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

Marul Mildiyö: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.

Soğan Mildiyö: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Domateste Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken ilaçlamaya başlanır.

Karanfil Pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates Mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisi görülmesi beklenmelidir, havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Tütün Fidelikte Çökerten: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

FLO-CAPTAN 50 WP isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için FLO-CAPTAN 50 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FLO-CAPTAN® 50 WP

İslanabilir Toz (WP)

GRUP	M4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

%50 CAPTAN

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zararlıdır. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıkla zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Yağlı ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Makhteshim Ltd.

P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40