

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 06/06/1997 ve 3179

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
*Bağ	Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>) Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>) Bağ Mildiyö'sü (<i>Plasmopara viticola</i>)	150 g / 100 l su 125 g / 100 l su 125 g / 100 l su	7
Domates (Tarla)	Geç Yamıklık (Mildiyö) (<i>Phytophthora infestans</i> Mont de Bary)	125 g / da	7
Şeftali	Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	200 g / 100 l su	7
Hıyar (Sera)	Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g / 100 l su	7
Çilek (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 g / 100 l su	7

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Ölü Kol hastalığına karşı;

- Kış ilaçlaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan önce
- Yaz ilaçlaması: Birinci ilaçlama sürgünler 2-3 cm iken, ikinci ilaçlama, sürgünler 8-10 cm iken, üçüncü ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

İlaçlama tekniği: Gerek kış ilaçlamaları gerekse yaz ilaçlamaları havanın açık ve güneşli olduğu günlerde yapılmalıdır. İlaçlama yapılırken özellikle budama yerlerinin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaz ilaçlanmasında, yeni çıkan sürgünlerin tamamen ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FOLPAN® 80 WDG

Suda Dağılabilen Granül (WDG)

GRUP	M4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

% 80 FOLPET

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Gözlerde kızarıklık, gözyaşı, deri, burun ve boğaz tahrişine neden olur. Tekrarlanan maruziyette kontakt dermatit olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

Yutma: Ağzı iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Cilde Temas: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

Gözlerle Temas: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL : 114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER	Folpet
-------------	--------



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/ kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir,yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- İlaçlama aletinin iyice temizlenmesini sağlayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

ETİKETİN DEVAMIDIR.

Bağda Kurşuni Küf hastalığına karşı; İlaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcında başlanır. Sonraki ilaçlama ilacın etki süresi ve enfeksiyon yoğunluğu dikkate alınarak 10-12 gün sonra tekrarlanır.

Bağda Mildiyö hastalığına karşı; Bağda sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. Meteorolojik koşullar hastalığın enfeksiyonu için uygun devam ederse ve ilaçlamaların devamına gerek görülürse ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalar yapılabilir. Hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

Domates (tarla) Mildiyösü hastalığına karşı; Domates bitkisi 15 cm olunca veya ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. İlaçlama hasada kadar 7-10 gün ara ile kaplama şeklinde yapılır.

Şeftalide Yaprak Kıvrıcıklığı hastalığına karşı; Tomurcukların kabardığı dönemde ilaçlama yapılır.

Çilekte Kurşuni Küf hastalığına karşı; 1. ilaçlama serada ilk çiçeklerin %10'nunun açtığı dönemde, 2.ilaçlama çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde, 3.ilaçlama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

Hıyarda Mildiyö hastalığına karşı; 1. ilaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır ve ilaçlamaya 10 gün ara ile devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

FOLPAN 80 WDG isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için FOLPAN 80 WDG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FOLPAN® 80 WDG

Suda Dağılabilen Granül (WDG)

GRUP	M4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

% 80 FOLPET

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİSİ:

Adama Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40