

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 16/01/1996 ve 2880

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasında ki Süre (gün)
Buğday Arpa	Kökboğazi Hastalıkları (Pseudocercospora herpotrichoides) (Rhizoctonia cerealis) (Fusarium culmorum)	100 ml/da Kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devre	35
Arpa	Külleme (Erysiphe graminis)	100 ml/ da İlk hastalık belirtileri görüldüğünde	35
Kültür Mantarı	Örümcek Ağı Hastalığı (Cladobotryum dendroides)	1,25 ml/ m ²	10

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin yarısına kadar su konur. Tavsiye edilen ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalıştırılırken kalan su depoya ilave edilir. Bitki ilaçlanırken iyi bir kaplama yapılmalı, her taraf ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havada yapılmalıdır.

İLACIN KULLANMA ZAMANI:

Kültür mantarı için: MİRAGE 45 EC koruyucu özelliği olan bir ilaç olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey ilaçlaması şeklinde kullanılmalıdır.1. Flaş sonunda tekrar bir yüzey ilaçlaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlarken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Beher metrekareye 1–2 litre su kullanılmalıdır.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİRAGE® 45 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

450 g/l PROCHLORAZ

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide

GRUP	G1	FUNGİSİT
------	----	----------

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İNSAN VE HAYVAN GİRMESİNDE SINIRLAMA YOKTUR.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması, gözde kızarıklık, gözyaşı ve ateşe neden olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi sabun ve suyla iyice yıkayın. Ardından, ılık suyla durulayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Doktora başvurun. Ağız suyla iyice çalkalayın.

Göz ile teması halinde: Gözleri bol suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde göz doktoruna başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın. Yutulduğunda, gastrik lavaj yapın ve aktif kömür uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER	Prochloraz
-------------	------------

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S29 Kanalizasyona boşaltmayın.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.

ETİKETİN DEVAMIDIR.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

MİRAGE 45 EC birçok herbisit, fungusit ve insektisitle karıştırılarak kullanılabilse de geniş alanlara kullanmadan önce ufak parsellerde ön deneme yapılması tavsiye edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MİRAGE 45 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MİRAGE 45 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİRAGE® 45 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

450 g/l PROCHLORAZ

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide

GRUP	G1	FUNGİSİT
------	----	----------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri muhafaza olur. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİSİ :

Adama Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40