

ZAMİR® 400 EW

Fungisit (Mantar İlacı)
Emülsiyon, Suda Yağ (EW)
267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole içerir.



1 LT

5 LT



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44
www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



ZAMİR® 400 EW

Karşı Konulmaz Güç,
Ani Etki!




Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

ZAMİR® 400 EW


ZAMİR® 400 EW içeriğinde triazol grubundan Tebuconazole ve imidazole grubundan Prochloraz içeren mükemmel etkili bir fungusittir. Hububatta hem erken hem de geç dönemlerde uygulamaya yönelik olarak sezon ve sonrasındaki buğday hastalıklarının kontrolünü sağlar.




AVANTAJLARI:

- Ürünün sistemik ve translaminar özelliklerinin sinerjisi sayesinde mükemmel koruma sağlar.
- Erken ve geç dönem uygulamalarında kullanılabilen geniş etkili bir fungusittir.
- Hastalıklardan koruyucu, tedavi edici ve eradike edici etkiye sahiptir.
- EW (emülsiyon, suda yağ) formülasyonu sayesinde aktifler bitki bünyesine hızlıca alınarak mükemmeli bir koruma sağlar.


ZAMİR® 400 EW sistemik bir fungusittir. Bitki dokularına nüfuz eder, kullanımdan sonra uygulanmadığı veya yeni büyümekte olanlar dahil bitkinin tüm bölümlerine yayılır.



ZAMİR® 400 EW Koruyucu hareket



ZAMİR® 400 EW Sistemik hareket



ZAMİR® 400 EW Tedavi edici hareket

KULLANIM ŞEKLİ:

Buğdayda külleme: Hastalık belirtileri başladığında veya bitki ve tarlada fazla bir yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanır.

Buğdayda kahverengi pas: Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye baş-layınca ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilk ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılabilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: İlaçlamalara hastalık belirtileri ilk görüldüğünde veya bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesi başlanmalıdır. Hastalık şiddeti yüksek ise ilaçlamalara ilacın etki süresi dikkate alınarak devam edilmelidir.

Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü: Kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki dönemde yapılmalıdır.

Çeltikte çeltik yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlaması olarak hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyor ise hemen ilaçlamaya başlanmalıdır. Gerekirse hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci ilaçlama uygulanabilir.



Tahıl küllemesi
(*Erysiphe graminis*)



Septorya yaprak lekesi
(*Septoria tritici*)



Kahverengi pas
(*Puccinia recondita tritici*)



Çeltik yanıklığı
(*Pyricularia oryzae*)

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Buğday	Tahıl küllemesi (<i>Erysiphe graminis f.sp.tritici</i>)	150 ml/da	42
Buğday	Kahverengi pas (<i>Puccinia recondita tritici</i>)	150 ml/da	42
Buğday	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	125 ml/da	42
Buğday	Kök ve kök boğazı çürüklüğü (<i>Fusarium culmorum</i>) (<i>Fusarium pseudograminearum</i>)	150 ml/da	42
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	150 ml/da	-