



# EMBRELIA® 140 SC

Fungisit (Mantar İlacı)  
Süspansiyon Konsantre (SC)  
100 g/l Isopyrazam + 40 g/l Difenoconazole



1 LT



ADAMA




ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3  
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY  
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

[www.adama.com/turkey](http://www.adama.com/turkey)

[facebook.com/adamaturkiye](https://facebook.com/adamaturkiye)

[adama\\_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.  
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



ADAMA

# EMBRELIA® 140 SC

BUĞDAY Kaliteniz  
Güvencemiz Altında

?



Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY



## Yeni Aktif ile Çifte Koruma Çifte Güvence

EMBRELİA® 140 SC, iki aktif madde içeren yeni nesil bir fungusittir. İki farklı etki mekanizmasına sahip (SDHI ve DMI grubu) aktif maddeler sayesinde hem başakta hem de yaprakta üstün koruyucu ve tedavi edici özelliği ile buğdayda görülen hastalıklara karşı çifte koruma ve çifte güvence sağlar. Bitkide sistemik hareket eder ve güçlü translaminar özelliği sayesinde yaprağın arka yüzeyine de geçer. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede bitki bünyesine geçer. Tahıl küllemesi, septorya yaprak lekesi, kahverengi pas ile kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarına karşı bitkiyi koruyarak hastalığın oluşmasını engeller. Oluşan hastalıkları ise tedavi eder.



### Etkili Madde;



### AVANTAJLARI:

#### Yeni Nesil Fungisit;

Külleme, septorya, pas ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarının mücadelesinde en yeni ve güçlü SDHI grubu aktif madde sayesinde buğdayın her döneminde uzun süreli etkin koruma sağlar. VERİM ve KALİTE artışına yardımcı olur.

#### Çift Etkili;

Buğdayın gelişim döneminde verim ve kalite kaybına yol açan hastalıkların tamamına karşı etkilidir. EMBRELİA® 140 SC'yi buğdayda sorun olan yaprak ile kök ve kökboğazı hastalıklarına karşı kullanılır.

#### Yıkanmaya Karşı Dayanıklığı;

Uygulamadan 2 saat sonra hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınır. EMBRELİA® 140 SC'nin ETKİSİ DEVAM EDER.

#### Dayanıklılık Yönetiminde Vazgeçilmez Ortağınız;

İki farklı aktif maddenin mükemmel karışımı ile direnç yönetiminde güvenilir ortağınızdır. Ürününüzü koruyarak VERİM ve GELİRİNİZİN artmasına yardımcı olur.



Tahıl küllemesi  
(*Erysiphe graminis*)



Septorya yaprak lekesi  
(*Septoria tritici*)



Kahverengi pas  
(*Puccinia recondita tritici*)



Kök ve kök boğazı çürüklüğü  
(*Fusarium spp.*)

### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Buğday	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	100 ml/da	42
	Buğdayda septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	80 ml/da	
	Kahverengi pas ( <i>Puccinia recondita tritici</i> )	80 ml/da	
	Kök ve kökboğazı çürüklüğü ( <i>Fusarium spp.</i> )	100 ml/da	

