



ADAMA

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FOLPAN* 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUP M4 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

% 80 FOLPET

- » **KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**
» **EYDE KULLANMAYINIZ.**
• ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
• **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.**
» MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
• **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**
• **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SURE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**
• **İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Gözlerde kıvrıklık, gözyaşı, deri, burun ve boğaz tahrişine neden olur. Tekrarlanan maruziyette kontakt dermatit olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Kazazedeği sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Solunum zorluğu çekildiğinde gereken şekilde eğitilmiş personel tarafından maruz kalmış kişiye oksijen verilebilir. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirlenen tüm giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Cildi sabun ve suyla iyice yıkayın. Ardından, ılık suyla durulayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Ağız bol su ile yıkayın. Doktora başvurun.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Eğer ağrı devam ederse, bir göz doktoruna danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın. Yutulduğunda, gastrik lavaj yapın ve aktif kömür uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL 114

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 06/06/1997 ve 3179

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
|---------------------------------------|---|----------------|--|
| *Bağ | Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>) | 150 9/100 L su | |
| | Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 125 9/100 L su | 7 gün |
| | Bağ Mildiyüsü (<i>Plasmopara viticola</i>) | 125 9/100 L su | |
| Domates (Tarla) | Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) Yaprak Klivrcıklığı | 125 g/da | 7 gün |
| Şeftali | (Glok) (<i>Taphrina Jeformans</i>) | 200 9/100 L su | 7 gün |
| Hlyar (Sera) Kornişon (Sera) | Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 200 9/100 L su | 7 gün |
| Çilek (Sera) | Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 125 9/100 L su | 7 gün |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanımı.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

NET MİKTARI
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER Folpet



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE. Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takıl ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.



ADAMA

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

FOLPAN* 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUP M4 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

% 80 FOLPET

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda Ölü Kol hastalığına karşı;

Kış ilaçlaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan önce

Yaz ilaçlaması: Birinci ilaçlama sürgünler 2-3 cm iken, ikinci ilaçlama, sürgünler 8-10 cm iken, üçüncü ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

İlaçlama **teknigi:** Gerek kış ilaçlamaları gerekse yaz ilaçlamaları havanın açık ve güneşli olduğu günlerde yapılmalıdır. İlaçlama yapılırken özellikle budama yerlerinin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaz ilaçlanmasında, yeni çıkan sürgünlerin tamamen ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.

Bağda **Kurşuni Küf** hastalığına karşı; İlaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcında başlanır. Sonraki ilaçlama ilacın etki süresi ve enfeksiyon yoğunluğu dikkate alınacak 10-12 gün sonra tekrarlanır.

Bağda Mildiyö hastalığına karşı; Bağda sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlama. Meteorolojik koşullar hastalığı enfeksiyonu için uygun devam ederse ve ilaçlamaların devamına gerek görülürse ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak 10- 14 gün aralıklarla ilaçlamalar yapılabilir. Hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar kalktıgında ilaçlamalara son verilmelidir.

Domates (tarla) **Mildiyö** hastalığına karşı; Domates bitkisi 15 cm olunca veya ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlama. İlaçlama hasada kadar 7-10 gün ara ile kaplama şeklinde yapılır.

Şeftalide Yaprak Kıvrıcıklığı (**Glok**) hastalığına karşı;

1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra

2. ilaçlama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Çilekte Kurşuni Küf hastalığına karşı; 1. ilaçlama serada ilk çiçeklerin %10'unun açtığı dönemde, 2. ilaçlama çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde, 3. ilaçlama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

Hıyar(sera), **Kornişon(sera) Mildiyö** hastalığına karşı; 1. ilaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır ve ilaçlamaya 10 gün ara ile devam edilir

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FOLPAN 80 WG isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için FOLPAN 80 WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını almayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınımız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Çok sıcak ve kurak şartlarda ayrıca kültür bitkisi stres altındayken uygulanmamalıdır.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 3 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımını ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Makhteshim Ltd.

P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çınarlı Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40