



MERPAN® 80 WDG

Fungisit (Mantar İlacı)
Suda Dağılılabilen Granül (WDG)
%80 Ciptan içerir.
N-(trichloromethylthio)-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide



1 KG



Etiket için
tarayınız.



Çukurova Bölge Satış Müdürlüğü

0 532 654 64 75

Marmara & Trakya Bölge Satış Müdürlüğü

0 533 611 69 79

İç Anadolu & Karadeniz Bölge Satış Müdürlüğü

0 538 054 55 39

Akdeniz Bölge Satış Müdürlüğü

0 533 283 37 19

Ege Bölge Satış Müdürlüğü

0 530 962 86 61

GAP Bölge Satış Müdürlüğü

0 530 353 90 83

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye



ADAMA



MERPAN® 80 WDG



Yıllardır değişmeyen hastalık kontrolü

MERPAN® 80 WDG

Geniş Spektrumlu Mükemmel Kontrol

MERPAN® 80 WDG geniş spektrumlu, fungal spora kontakt yolu ile etki eden bir fungusittir. **MERPAN® 80 WDG**, hastalık mücadelesinde çoklu etki etme mekanizmasına sahiptir. Çok yönlü kontak etki mekanizması ile thiois içeren mantar proteinlerine saldırarak, bir çok kimyasal sürece etki eder ve hücre bölünmesi ile metabolizmayı durdurur. Nihayetinde de germinasyondaki sporlanmayı engeller. Adama'nın üstün teknolojisi ile üretilen ve 50 yıldan uzun süredir tarımda etkili bir biçimde kullanılmakta olan **MERPAN® 80 WDG** farklı etki mekanizması ile fungusit direnç yönetimine uygundur. **MERPAN® 80 WDG** %80 oranında Captan içerir.

AVANTAJLARI:

- Geniş spektrumlu etki, hızlı kontrol.
- Çok yönlü etki mekanizması.
- Mükemmel formülasyon teknolojisi ile suda kolayca çözünür, köpürme yapmaz ve uygulama aletlerinde tıkanma yapmaz.
- Yeni ambalajı ile kullanıcıya kolaylık sağlar, tozuma yapmaz.

MERPAN® 80 WDG Farklı Etki Mekanizması ile Mükemmel Kontrol Sağlar.



MERPAN® 80 WDG suda çözünebilir granül formülasyon ile aynı aktif madde içerikli WP formülasyonundaki birçok ürüne göre kullanıcıya avantaj sağlar.

Köpürme Karşılaştırması



MERPAN® 80 WDG

Captan içerikli diğer ürün

Çökelti Karşılaştırması



MERPAN® 80 WDG

Captan içerikli diğer ürün

Tozuma Karşılaştırması



MERPAN® 80 WDG

Captan içerikli diğer ürün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve günün sıcak saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır.

Elmada Karaleke hastalığına karşı;

1.İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, **2.İlaçlama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), **3.İlaçlama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, **4.ve diğer ilaçlamalar:** Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.

MERPAN® 80 WDG



Kayısıda Yaprakdelen (Çil) hastalığına karşı;

1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), 3.ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası (kılıfı) meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Domateste Erken Yanıklığı ve Domates Mildiyösü; İlaçlamalara ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile birlikte başlanır, hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak ilaçlamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (gün)
Elma	Karaleke Hastalığı (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 g / 100 l su	7
Kayısı	Yaprakdelen Hastalığı (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	200 g / 100 l su	10
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	185 g / 100 l su	7
Domates	Domates Mildiyösü (<i>Phytophthora infestans</i>)	185 g / 100 l su	7

Elma Kullanımı

