

COTTONEX® 500 SC

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Süspansiyon Konsantre (SC)
500 g/l Fluometuron içerir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44
www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
adama_turkiye

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



COTTONEX® 500 SC



Temiz Başlayın, Temiz
Bitirin, İşiniz Kolay Olsun

Köpek Üzümünde En Etkili Sonuç!



Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

COTTONEX® 500 SC

COTTONEX® 500 SC pamuk ekimi sonrası ve çıkış öncesi yıllık yabancı otlara karşı kullanılan sistemik etkili bir herbisittir. Öncelikle yabancı otların kökleri tarafından absorbe edilir, ikincil olarak da yapraklar tarafından absorbe edilir.

COTTONEX® 500 SC fluometuron içerir. Fluometuron fotosentezi engelleyerek yabancı ot mücadelesinde etkili olur.



Semizotu
(Portulaca oleracea)



Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)



Sirken
(Chenopodium album)



Şeytan elması
(Datura stramonium)



Bambul otu
(Chrozophora tinctoria)



Köpek üzümü
(Solanum nigrum)



AVANTAJLARI:

- Pamukta yabancı ot mücadelesinde mükemmel etkinlik
- Toprakta uygulanarak kullanılan benzersiz yabancı ot mücadelesi
- Geniş spektrumlu ve uzun süre etkili
- Esnek kullanım ve uygulama şekli kolaylığı

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar temiz su konur. Tavsiye edilen dozdaki COTTONEX® 500 SC ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır ve depoya ilave edilir. Karıştırıcı çalışırken deponun geri kalan yarısı temiz su ile doldurulur. Hazırlanan ilaçlı su bekletilmeden kullanılmalıdır.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ:

COTTONEX® 500 SC pamuk tohumları ekildikten hemen sonra, yabancı otlar çıkmadan önce kullanılmalıdır. Dekara en az 20-40 lt su ile kullanılmalıdır. Uygulama yapılmadan önce toprağın keseksiz olması etkin bir başarı için çok önemlidir. Ayrıca COTTONEX® 500 SC'nin aktif hale gelmesi için uygulamanın nemli toprağa yapılması ve uygulamadan sonra yeterli miktarda yağışın düşmesi veya yağmurlama sulamanın yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı COTTONEX® 500 SC mümkünse yağmur yağışı takip edilerek kullanılmalı ya da uygulama yapıldıktan sonra 4 gün içinde 20-30 mm yağmurlama ile sulama sağlanmalıdır. Sezonda COTTONEX® 500 SC'nin ya da Fluometuron aktif maddeli bir herbisitinin aynı tarlaya birden fazla kullanılmaması gerekmektedir. Üst üste ilaçlama yapılmamasına dikkat edilmelidir.




COTTONEX® 500 SC

Geniş yapraklı yabancı otlara karşı pamukta topraktan kullanılan benzersiz yabancı ot mücadelesi

Pamuk

COTTONEX® 500 SC



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

| Bitki Adı | Yabancıot Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün) |
|-----------|--|---|--|
| Pamuk | Semizotu (Portulaca oleracea) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) Sirken (Chenopodium album) Şeytan elması (Datura stramonium) Bambul otu (Chrozophora tinctoria) Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi | - |
| | Köpek üzümü (Solanum nigrum) Sirken (Chenopodium album) | 200 ml/da Erken çıkış sonrası | 42 |