

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 11/11/1987 ve 2061

#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı                    | Zararlı Organizma Adı  | Uygulama Dozu  | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|------------------------------|--|----------------|--|
| Elma                         | Avrupa Kırmızıörümceği<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )         | 20 ml/100 L su | 28 gün                                 |
|                              | İki Noktalı Kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) |                |  |
|                              | Akdiken Akarı<br>( <i>Tetranychus viennensis</i> )           |                |  |
| Bağ*                         | İki Noktalı Kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 25 ml/100 L su | 56 gün                                 |
| Patlıcan<br>Fasulye<br>Hıyar | Kırmızıörümcekler<br>( <i>Tetranychus spp.</i> )             | 30 ml/100 L su | 3 gün                                  |
| Şeftali                      | İki Noktalı Kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 40 ml/100 L su | 21 gün                                 |
| Pamuk                        | İki Noktalı Kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 40 ml/da       | -                                      |
| Soya                         | Pamuk Kırmızıörümceği<br>( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> ) | 40 ml/da       | -                                      |

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# APOLLO®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP 10A AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)

## 500 g/l Clofentezine

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Belli bir semptomu yoktur, muhtemelen halsizlik görülür. Yüksek miktarda alındığı takdirde göz ve deride yanmalara sebebiyet verir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Ağız çalkalayın. Bol su içirin. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ÇİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**GÖZLERLE TEMAS:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

|             |              |
|-------------|--------------|
| İÇİNDEKİLER | Clofentezine |
|-------------|--------------|



#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki
- EUH208** 1,2-Benziosothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P102** Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.
- P501** İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin. Suları ürün yada kabı ile kirletmeyin. (Yüzey suları yakınlarında uygulama ekipmanlarını temizlemeyin)

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Elmada İki Noktalı Kırmızıörümcek, Avrupa Kırmızıörümceği ve Akdiken Akarına, Şeftali İki Noktalı Kırmızıörümceğe karşı:** Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, İki noktalı kırmızıörümcek sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapmak gerekir.

**Bağda İki Noktalı Kırmızıörümceğe karşı:** İki noktalı kırmızıörümceğin yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğu kimyasal mücadele önerilir. 1. uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşğin üzerine çıkarsa, 2. uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisit beklemeye süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir.

**Patlıcan, Hıyar, Fasulye Kırmızıörümceklere karşı:** İlk çiçeklenmeden itibaren tarlaya köşeden çapraz girilir ve 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarından birer yaprakta olmak üzere toplam 10-20 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 Kırmızıörümcek sayısına ulaşılmışsa kaplama uygulama yapılmalıdır. Dekara uygulamada önce kalibrasyon yapılarak bir dekara gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gereken miktar ürün eklenmelidir.

**Pamukta İki noktalı kırmızıörümceğe karşı:** Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümde 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır, toplam 100 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz'de 5, Ege ve Güneydoğuda 10 adet iki noktalı kırmızıörümceğe ulaşılmışsa kaplama uygulama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi uygulama yapılabilir. Kullanılacak alete göre bir dekara gidecek su miktarı kalibrasyon yapılarak saptanmalı ve belirlenen su miktarına gerekli bitki koruma ürünü eklenmelidir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.

**Soyada pamuk kırmızıörümceğine karşı:** Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprakcık başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege Bölgesine 10 adet canlı pamuk kırmızıörümceği görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

## DİRENÇ YÖNETİMİ:

APOLLO isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 10 A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için APOLLO'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10A harici) akarisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# APOLLO®

Süspansiyon Konsantre (SC)

|      |     |                                 |
|------|-----|---------------------------------|
| GRUP | 10A | AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı) |
|------|-----|---------------------------------|

500 g/l Clofentezine

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisini altındadır.

## ÜRETİCİ FİRMA:

Adama Celsius BV Curaçao Branch  
Pos Cabai Office Park, Unit 13 P.O. Box 403  
Curaçao

## ÜRETİM TESİSİ:

Safapac Ltd.  
4 Stapleton Road, Orton Southgate,  
Peterborough PE2 6TB United Kingdom

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3 Kat:8/806  
Konak/İzmir  
Tel: 0232 462 61 40