

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 03/04/2007 ve 5931



ADAMA TURKEY TARIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

EOS-800®

Emülsiyon Konsantre (EC)
İNSEKTİSİT / AKARİSİT

800 g/l PARAFİNİK MİNERAL YAĞ içerir.

GRUP	-	İNSEKTİSİT / AKARİSİT
------	---	-----------------------

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Bilinen özel bir etkisi ve/veya semptomu bulunmamaktadır. Kendinizi rahatsız hissettiğinizde, tıbbi yardıma başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

Deri ile teması halinde: Kirilenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi su ve sabunla yıkayın, ardından ılık suyla yıkamaya devam edin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmaya zorlamayın. Ağzı bol su ile yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI(KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER	Parafinik Mineral Yağ
-------------	-----------------------

TEHLİKE ÖZELLİĞİ :

Yoktur.

TEHLİKE SEMBOLÜ :

Sınıflandırılmamıştır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- İlacın 5°C altında ve 32°C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır.
- İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımını ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

FİRMASI:

Adama Makhteshim Ltd.

P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

FABRİKA ADRESİ:

HANYU ENERGY CO. LTD.

108, Cheoyong-ro, Nam-gu, Ulsan, Kore

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu
Hıyar (Sera)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus spp</i>)	800 ml / 100 l su
Armut	Armut Pysillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1,5 l/100 l su
Şeftali	Dut Kabuklu Biti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	3 l/100 l su

KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan ilaçlı mahlül mutlaka basınçlı pülverizatör ile tatbik edilmelidir.

UYGULAMA ZAMANI VE SAYISI :

Hıyar (sera) Kırmızı Örümceği: Yapılan sayımlarda yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek isabet ederse mücadeleye karar verilir. Tek uygulama yeterlidir.

Armut Pysillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. dönem nimflerin görülmeye başlandığında ilaçlama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlamaları yapılabilir.

Şeftali Dut Kabuklu Biti : Yaz mücadelesi olarak ilaçlamalar yapılır. İlk larva çıkışında birinci ve bu ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: EOS-800 Kükürt, Captan ve Folpet aktif maddeleri içeren ilaçlar ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise EOS-800 uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. EOS-800 tek başına kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EOS-800 isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre sınıflandırılmamış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EOS-800'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip insektisitlerle dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye edilir.