



ADAMA

# COSWEL® 250 WG

 ADAMA

**COSWEL®  
250 WG**

**TEK YÖN**

NARENCİYE - BAĞ - CEVİZ  
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMİYEN ALANLAR

FLIGHT :	B 858	GATE :	07
SEAT :	26 B	TIME :	10:25

**1. SINIF**

  
NO. 0000000000000000

**1. SINIF**

**COSWEL®  
250 WG**

  
NO. 0000000000000000

**COSWEL® ile  
Temiz Bahçeye Gel**

Adama Kalitesiyle!

COSWEL® ADAMA'nın marka tescilli ticari ürünüdür.



**Dinle ▶ Anla ▶ Paylaş**

[ADAMA.COM/TURKEY](http://ADAMA.COM/TURKEY)



HERBİSİT

# COSWEL® 250 WG

COSWEL® 250 WG, dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkış öncesi toprağa uygulanan, toprağın uzun süre temiz kalmasını sağlayan yeni bir herbisittir. Özellikle herbisitlere karşı dayanıklılık kazanmış, güçlü yabancı otların mücadelesi için tavsiye edilir.

## Etki Mekanizması

İçeriğindeki flazasulfuron aktif maddesi seçici ve sistemik hareket eden bir herbisittir. Yabancı otların hem kökleri ve hem de yaprakları yoluyla alınır. Flazasulfuron yabancı otlarda 3 önemli aminoasitin (valine, isoleucine, leucine) inhibitörü olup amino asitlerin biosentezini engeller. Uygulamadan bir kaç saat sonra yabancı otlarda hücre bölünmesi, büyüme ve gelişme durur. Daha sonraki günlerde önce yapraklarda renk kaybı sonra solma ve kuruma görülür. Uygulamadan yaklaşık 20 gün sonra ise yabancı otlar tamamen yok olur. Üretim sezonu boyunca toprak yüzeyinin yabancı ot açısından temiz olduğu görülmektedir. Ekstra kimyasal yada fiziksel mücadeleye gerek duyulmaz. 5 yaş üzeri omca ve ağaçlarda kullanılmalıdır.

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Bağ*	Yapışkan kazayağı ( <i>Chenopodium botrys</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Bazot ( <i>Heliotropium europaeum</i> ) Duvar arpacı ( <i>Hordeum murinum</i> ) Yabani marul ( <i>Lactuca serriola</i> ) Gelincik ( <i>Papaver rhoeas</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Kanarya otu ( <i>Senecio vulgaris</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Demirdiken ( <i>Tribulus terrestris</i> ) Işrgan otu ( <i>Urtica urens</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	20g/da Çıkış Öncesi	-
Narenciye	Tilki kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) Dev horoziböğü ( <i>Amaranthus palmeri</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Horoziböğü ( <i>Amaranthus albus</i> ) Püsküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> ) Çoban çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Sarı papatya ( <i>Chrysanthemum segetum</i> ) Pire otu ( <i>Coryza canadensis</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Benekli darıcan ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Boz ot ( <i>Heliotropium europaeum</i> ) Duvar arpacı ( <i>Hordeum murinum</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Hakiki papatya ( <i>Matricaria chamomilla</i> ) Küçük başaklı kuş yemi ( <i>Phalaris minor</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Türp otu ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ) Kanarya otu ( <i>Senecio vulgaris</i> ) Kirpi darı ( <i>Setaria verticillata</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) Meryem diken ( <i>Silybum marianum</i> ) Işrgan otu ( <i>Urtica urens</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	20g/da Çıkış Öncesi	-
Ceviz	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Tarla sarmasığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Pire otu ( <i>Coryza canadensis</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Demirdiken ( <i>Tribulus terrestris</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	20g/da Çıkış Öncesi	120 Gün
Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Adı eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> ) Horoziböğü ( <i>Amaranthus albus</i> ) Turna gagası ( <i>Geranium dissectum</i> ) Tilki kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) Pire otu ( <i>Coryza canadensis</i> )	20g/da Çıkış Sonrası Yabancı Otların 2-4 yapraklı dönemi	-

\*Bağ alanlarında yalnızca dormant (uyku) döneminde kullanılır. Gözler uyandıktan sonra kullanılmamalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  
Folkart Time-Kazım Dirik Mah. Ankara Cad.  
296 sok no:8 1. Blok Kat:5 Daire 515 Bornova İzmir  
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44  
www.adama.com/turkey  
facebook.com/adamaturkiye  
adama\_turkiye

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Buradaki bilgiler tanıtım amaçlıdır ve zaman içerisinde eklemeler ya da değişiklikler olabilir. Bu nedenle en güncel bilgiler ürünün etiketinde olan bilgiler olduğu unutulmamalıdır. Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.