

İmalat tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:

Ruhsat Tarihi ve Numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	17.5 ml/da (Larva)	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	17.5 ml/da	
	Dikenlikurt (<i>Earias insulana</i>)	20 ml/da	
Elma	Yaprak galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	17.5 ml/100 L su	14 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12.5 ml/100 L su (Yumurta)	14 gün
Armut	Yaprak galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	17.5 ml/100 L su	14 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12.5 ml/100 L su (Yumurta)	14 gün
Ayva	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12.5 ml/100 L su (Yumurta)	14 gün
Şeftali	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml/100 L su	14 gün
	Doğu meyvegüvesi (<i>Cydia molesta</i>)	17.5 ml/100 L su	14 gün
Kayısı	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml/100 L su	14 gün
	Doğu meyvegüvesi (<i>Cydia molesta</i>)	17.5 ml/100 L su	14 gün
Erik	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml/100 L su	14 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 ml/da (Larva)	14 gün
Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)	14 gün
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)		
	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	15 ml/da	
*Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	15 ml/100 L su (Yumurta)	3 gün (sofralık) 28 gün (şaraplık)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

RYNO-A 200 SC®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	28	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

200 g/l Chlorantraniliprole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. İlaç kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız. Bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

Yutma: Kusturmayın. Ağzı iyice yıkayın. Bolca su içirin. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Ciltle Temas: Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın. Derhal sabun ve bol su ile yıkayın.

Gözlerle Temas: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

NET MİKTARI:

Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

İÇİNDEKİLER

Chlorantraniliprole

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH208: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501: İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin. Suları ürün ya da kabı ile kirliletmeyin. (Yüzey suları yakınlarında uygulama ekipmanlarını temizlemeyin/Çiftlik ve yollardan gelen suların kanalizasyona bulaşmasını önleyin).

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- İpek böceklerine etkisi olduğu için, ilaçlama anında ilacın rüzgarla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı

ve puskurme sistemini anřurarak tım paraların yıkanmasını saėıayınız. Yıkama iřlemını su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA řEKLİ:

Pamuk: Pamukta yeřilkurt (*Helicoverpa armigera*) ve **Pamuk yaprakkurdu** (*Spodoptera littoralis*)’na karřı mücadelede zararlının herhangi bir dölüne karřı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldıėı dönemde ilalama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluėuna baėlı olarak gerekirse 10-14 gün aralıkla ilalama tekrarlanmalıdır.

Dikenlikurt (*Earias insulana*): Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduėunda, koza sürveyinde ise %10 bulařık koza varsa ilalama yapılmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde ikiden fazla RYNO-A 200 SC uygulaması yapılmamalıdır.

Elma, Armut yaprak galeriėüvesi (*Leucoptera scitella*)’ne karřı, yaprak başına 4 veya daha fazla canlı larva ve parazitlenme oranı ok düşükse ilalama yapılır.

Elma: Elma içkurdu (*Cydia pomonella*)’na karřı, ilalamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. RYNO-A 200 SC ile bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her döle ait larva ıkıřı süresince aėaları ilalı bulundurarak yumurtadan ıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Armut ve Ayva: Elma içkurdu (*Cydia pomonella*)’na karřı tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz. İlacın etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1. dölle karřı ilalama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karřı da zararlı ilalamayı gerektirecek yoğunlukta olduėu takdirde aynı řekilde ilalamalara devam edilmelidir. Bu ilalamalar diren ile ilgili bölümde belirtilen kurallara baėlı kalınarak farklı etki mekanizmasına sahip ilalar ile yapılmalıdır. Elma, Armut ve Ayvada sezon içinde ikiden fazla RYNO-A 200 SC uygulaması yapılmamalıdır.

řeftali, Kayısı: řeftali ėüvesi (*Anarsia lineatella*) ve **Doėu meyveėüvesi** (*Cydia molesta*) ile mücadelede en iyi etki için ilalama zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriř olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin ıkıřı görüldükten 10 gün sonra ilalama yapılır. Kullanılan ilacın etki süresi yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilalama yapılabilir. Zararlı yoğunluėuna baėlı olarak ilalama 14 gün ara ile tekrarlanmalıdır. RYNO-A 200 SC bařka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. řeftali ve kayısıda sezon içinde ikiden fazla RYNO-A 200 SC uygulanmamalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. řTİ.

RYNO-A 200 SC®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	28	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

200 g/l Chlorantraniliprole

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) řartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandıėında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hořgörü (tolerans) sınırları dışında bir deėiřiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluřabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60. Industrial Zone Beer Sheva
8410001, İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. řTi.

ınarlı Mahallesi, řehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40

Erik: řeftali ėüvesi (*Anarsia lineatella*) ile mücadelede en iyi etki için ilalama zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriř olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin ıkıřı görüldükten 10 gün sonra ilalama yapılır. Zararlı yoğunluėuna baėlı olarak ilalama 14 gün arar ile tekrarlanmalıdır. RYNO-A 200 SC bařka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Erikte sezon içinde ikiden fazla RYNO-A 200 SC uygulanmamalıdır.

Patates: Patates böceėi (*Leptinotera decemlineata*)’ne karřı en iyi etki için ilalama zararlının yumurtalarının açıldıėı veya bitkide ilk zararların görüldüėü dönemde yapılmalıdır. Patateste sezon içinde ikiden fazla RYNO-A 200 SC uygulanmamalıdır.

Mısır: Mısır koankurdu (*Sesamia spp.*) ve **Mısır kurdu** (*Ostrinia nubilalis*)’na zararlının ilk yumurtalarının görölmesinden itibaren 15 gün aralıkla 2 ilalama yapılır. Ek ilalamaların gerekli olduėu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ilalar kullanılmalıdır.

Bozkurt (*Agrotis ipsilon*, *Agrotis segetum*) zararlısı ile mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayrı yerde üçer metrelik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduėu tarlalarda ilalama yapılmalıdır. Mısırdaki sezon içinde aynı yerde ikiden fazla RYNO-A 200 SC uygulaması yapılmamalıdır.

Baė: Salkım ėüvesi (*Lobesia botrana*)’ne karřı yapılacak ilalamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eřeyssel ekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artıřın devam etmesi etkili sıcaklıklar toplamı, birinci dölde 95-100 günderece, ikinci dölde 450-460 günderece, üçüncü dölde 970-980 gündereceye ulaşması ve bitki fenolojisi; birinci dölde iek tomurcuėu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve baėda ilk yumurta görölmeden ilalamaya karar verilir. Her dölle karřı bir ilaleme yapılır. Baėda sezon içinde sofraklık üzümelerde 2, řaraplık üzümelerde 1’den fazla RYNO-A 200 SC uygulaması yapılmamalıdır.

RYNO-A 200 SC İlalamanın ardından, bitki üzerinde ila kurumasından 1-2 saat sonra yaėan yaėıřlardan etkilenmez. İlalamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

DİREN İLE İLGİLİ BİLGİ

RYNO-A 200 SC ® isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları diren gelişimini teřvik etmektedir. Bu nedenle diren gelişimini geciktirmek için RYNO-A 200 SC ® ile aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiėi durumlarda ise farklı bir etki mekanizmasına sahip (Grup 28 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIřABİLİRLİK DURUMU:

Diėer bitki koruma ürünleri ile karıřtırılması tavsiye edilmez. Karıřıma ihtiya duyulması halinde bir ön karıřım testi yapılması önerilir.

@ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. řTi.’nin tescilli ticari markasıdır.