

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 02/10/2014 ve 9852

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

| Bitki Adı | Kontrol Ettiği Yabancı Otlar | Uygulama Dozu | Uygulama Zamanı |
|-----------|--|---------------|---|
| Mısır* | Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) | 300 ml/da | Çıkış öncesi, mısır ekildikten sonra, yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır. |
| | Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) | 250 ml/da | Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancı otların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır. |
| | Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) | 300 ml/da | Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancı otların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır. |

*Şeker ve Cin mısırında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TREK-P®

Süspo-Emülsiyon (SE)

| | | | |
|------|----|----|-----------------------------|
| GRUP | C1 | K1 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|------|----|----|-----------------------------|

270 g/l Terbutylazine ve 64 g/l Pendimethalin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

YUTMA: Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Bol su içirin. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

CİLTLE TEMAS: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL: 114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

| | |
|-------------|--------------------------------|
| İÇİNDEKİLER | Terbutylazine Pendimethalin |
|-------------|--------------------------------|



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

EUH208 Pendimethalin, 1,2-Benzisothiazolin-3-one içerir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçindekileri / kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Suları ürün ya da kabı ile kirliletmeyin (Yüzey suları yakınlığında uygulama ekipmanlarını temizlemeyin/Çiftlik ve yollardan gelen suların kanalizasyona bulaşmasını önleyin)
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zararlıdır, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Gece don tehlikesi altında olan tarlalar ve çiğ ya da ıslak koşullarda kullanılmamalıdır. Don ya da aşırı ıslaklıktan dolayı zayıflamış, zarar görmüş ya da seyrek alanlarda ve bitki stres altında olduğu dönemlerde uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında toprağın nemli olduğundan emin olunuz. Uygulamadan sonra uzun süre kuru hava şartları bitki koruma ürününün etkinliğinin azalmasına sebep olabilir. Aşırı taşlı ve çakıllı topraklara uygulamayınız. Su birikmiş veya su birikmesine meyilli tarlalarda uygulamayınız. Uygulamadan sonra toprak işlenmesi yapmayınız. Organik madde oranı %10'nun üstünde olan topraklarda uygulamayınız.

Ekim ve çıkış öncesi herbisitlerinin nemli toprağa uygulanması ya da uygulamadan sonra yağmurla ya da sulamayla aktive edilmesi gereklidir.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Herhangi bir nedenle ilaçlanan tarla bozulduğunda; toprak 15 cm işlenerek buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya, bezelye, mısır, yerfıstığı ve şaşırtılan bitkiler ekilebilir. Diğer bitkiler için 5 ay beklenmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TREK-P isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C1 ve Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için TREK-P'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 ve Grup K1 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

®ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TREK-P®

Süspo-Emülsiyon (SE)

| | | | |
|------|----|----|-----------------------------|
| GRUP | C1 | K1 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|------|----|----|-----------------------------|

270 g/l Terbutylazine ve 64 g/l Pendimethalin

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Agan Ltd.
P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirik Mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No:515
Bornova/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40