



ADAMA

AGİL EXTRA® 100 EC

**Dar Yapraklı Yabancı Otlara
Daha Hızlı, Daha Etkili
Çözüm**



Geniş Spektrumlu Yabancı Ot Kontrolü



HERBİSİT

Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY



HERBİSİT



Agil Extra® 100 EC

Agil Extra® 100 EC

Agil Extra® 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır.

AVANTAJLARI?

- Hızlı etki
- 1 saat sonra yağın yağmurdan yıkanmaz
- Zor kontrol edilen otlara mükemmel etki
- Yayıcı-yapıştırıcı ilavesi gerekmez
- Düşük aktif madde miktarı ile çevreye dost
- Yıllık ve çok yıllık otların kontrolünde kullanım - geniş spektrum



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyaş 20-40 cm iken	90 gün
Patates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	50 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde, Kanyaş 20-40 cm iken	28 gün
*Bağ	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	
Şeker Pancarı	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	
Kırmızı Mercimek	Kısıryabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	60 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	90 gün
Soğan	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kuş yemi = Yumuşak başlıklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	35 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	
Ayçiçeği	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	56 gün
Domates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da	Çıkış sonrası	56 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75 ml/da	Çıkış sonrası	56 gün
Kanola	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpekdişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kuş yemi = Yumuşak başlıklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Tavşan bıyığı = Salkım otu (<i>Poa annua</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Yabancı otların kardeşlenme devresinde	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ADAMA

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Kazimdirik Mah. Ankara Cad. 296 Sok. No:8
Folkart Time 1. Blok Kat:5 D: 515, 35100,
Bornova / İZMİR

www.adama.com/turkey



facebook.com/adamaturkiye



[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.

