

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 02.12.2020 / 11744

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi
Şekerpancarı	<b>Yatık sirken</b> ( <i>Chenopodium vulvaria</i> ) <b>Sirken</b> ( <i>Chenopodium album</i> ) <b>Uzun süpürge otu</b> ( <i>Descurania sophia</i> )	<b>Çıkış sonrası</b> <b>200 ml/da</b> Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemi
Çim	<b>Tavşan bıyığı</b> ( <i>Poa annua</i> )	<b>Çıkış sonrası</b> <b>400 ml/da</b> Yabancı otun 4-6 yapraklı dönemi

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# ESTRELLA® 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	N	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	---	-----------------------------

**500 g/l ETHOFUMESATE**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**GENEL BİLGİLER:** Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Bolca su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**CİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ile sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**GÖZLERLE TEMAS:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER	Ethofumesate
-------------	--------------



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

### ZARARLILIK İFADELERİ

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ

**P102** Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

**P280** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

**P501** İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Bahçalara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

### **BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Şekerpancarında:** ESTRELLA® 500 SC yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde uygulanır. Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

Normal şartlar altında birçok şekerpancarı çeşidi ESTRELLA® 500 SC'ye çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken bitki koruma ürünlerine karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük sıcaklıklar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştirileceği için stres altındaki şekerpancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

**Çim alanlarında:** ESTRELLA® 500 SC çim sahası makine ile 5 cm yükseklikten biçildikten 4-5 gün sonra, çim alanlarına kaplama olarak uygulanmalıdır. Uygulama esnasında Tavşan bıyığı ve çimin 4-6 yapraklı dönemlerinde olmasına özen gösterilmelidir.

### **EKİM NÖBETİ:**

Uygulama yapıldıktan 3 ay sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Takip eden ürünler için mutlaka 15-20 cm derinliğinde toprak işlenmesi yapılmalıdır.

### **DİRENÇ YÖNETİMİ:**

ESTRELLA® 500 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup N olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ESTRELLA® 500 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen uygulama sayısını aşmayız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

### **KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

**ADAMA TURKEY® Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.**



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# ESTRELLA® 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	N	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	---	-----------------------------

500 g/l ETHOFUMESATE

### **DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### **FİRMA BEYANI:**

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisini altındadır.

### **ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:**

**Adama Ağan Ltd.**

P.O. Box 262, Ashdod, 7710201 İsrail

### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Kazımdirik Mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No:515

Bornova/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40