

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 11.09.1996 / 3001

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyaş 25-40 cm iken	90 gün
Patates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	50 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde, Kanyaş 20-40 cm iken	28 gün
*Bağ	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	-
Şekerpancarı	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	-
Kırmızı Mercimek	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	60 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	90 gün
Soğan	Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kuş yemi =Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	35 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	-
Ayçiçeği	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken.	56 gün
Domates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da 75 ml/da	Çıkış sonrası Çıkış sonrası	56 gün 56 gün
Kanola	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpekdişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kuş yemi =Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Tavşanbıyığı = Salkım otu (<i>Poa annua</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Yabancı otların kardeşlenme devresinde	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AGİL® EXTRA 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	A	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	---	----------------------------

100 g/l Propaquizafop

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. İlacın yutulması halinde mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde; temiz havaya çıkarınız. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Derhal doktor çağırınız.

Yutulması halinde; kişinin bilinci açık ise ağzını iyice yıkayınız. Kusturmayınız. Derhal doktor çağırınız.

Ciltle teması halinde; Kirli tüm giysi ve ayakkabılarınızı çıkartınız. Hemen bol su sabunla yıkayınız. Gerekirse bir doktora danışınız.

Gözle teması halinde; Bkz. önlem ifadeleri P305+P351+P338

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER	Propaquizafop
-------------	---------------



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

EUH208 Propaquizafop içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile en az 15 dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P331 Kusturmayın.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz, 35 °C'nin üzerinde depolamayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Poaceae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. AGİL EXTRA 100 EC dar yapraklı yabancıotların yapraklarından süratle alınır ve yabancı otların stolon ve rizom gibi toprakaltı aksamlarına taşınır. AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir ancak dar yapraklı yabancı otlar uygulama anında çıkmış olmalıdır. AGİL EXTRA 100 EC ilaçlaması sırasında yabancı otların aktif büyüme devresinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. İlaçlamada iyi bir kaplama yapılması lazımdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: AGİL EXTRA 100 EC tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkilerine olumsuz bir etki yapmaz. AGİL EXTRA 100 EC bileşiminde zaten bulunduğu için uygulamada ‘ayrıca bir yayıcı yapıştırıcı’ madde kullanma gereği yoktur.

AGİL EXTRA 100 EC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AGİL EXTRA 100 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AGİL EXTRA 100 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AGİL® EXTRA 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	A	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	---	----------------------------

100 g/l Propaquizafop

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

ADAMA AGAN LTD.

Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kazımdirik Mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No:515

Bornova/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40