

İMAL TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

ŞARJ NUMARASI:

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 06.05.2021 / 11918

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı                              | Zararlı Organizma Adı                                                                                   | Uygulama Dozu                                                       | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Turunçgiller (Limon Portakal Greyfurt) | Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması<br>( <i>Phytophthora citrophthora</i> ) | 200 g/100 L su                                                      | 14 gün                                 |
|                                        | Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü<br>( <i>Phytophthora citrophthora</i> )            | 300 g/100 L su<br>Meyveler ilaçlı suya 3 dakika süreyle daldırılır. |                                        |
| Armut*                                 | Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı<br>( <i>Erwinia amylovora</i> )                     | 400 g/100 L su                                                      | 14 gün                                 |
| Hıyar                                  | Kabakgillerde mildiyö<br>( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                                          | 200 g/100 L su                                                      | 3 gün                                  |
| Kavun                                  |                                                                                                         |                                                                     |                                        |
| Soğan                                  | Soğan mildiyö<br>( <i>Peronospora destructor</i> )                                                      | 150 g/100 L su                                                      | 14 gün                                 |
| Domates (Sera)                         | Domates mildiyö<br>( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                    | 250 g/100 L su                                                      | 7 gün                                  |

\*Her ilaçlamadan önce ağaçlardaki hastalıklı kısımlar dezenfektana batırılmış bir alet ile kesilerek uzaklaştırılmalıdır.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# EUROSMART® 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

|      |      |                         |
|------|------|-------------------------|
| GRUP | P 07 | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|------|------|-------------------------|

%80 FOSETYL-AL

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bitki koruma ürünü kuruyuncaya kadar insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adale kasılması görülür.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Ağız iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**CİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**GÖZLERLE TEMAS:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

**ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL: 114**

NET MİKTARI:

AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| İÇİNDEKİLER | Fosetyl-Aluminyum |
|-------------|-------------------|



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/ kabı Ulusal çevre mevzuatına göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Suları ürün ya da kabı ile kirliletmeyin (Yüzey suları yakınlarında uygulama ekipmanlarının temizlemeyin /Çiftlik ve yollardan gelen suların kanalizasyona bulaşmasını önleyin).
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**EUROSMART® 80 WG**

Suda Dağılabilen Granül (WG)

|      |      |                         |
|------|------|-------------------------|
| GRUP | P 07 | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|------|------|-------------------------|

**%80 FOSETYL-AL**

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

Adama Makhteshim Ltd.

P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

#### ÜRETİM TESİSİ:

Kollant S.r.l

Via Ponte Giulio, 72, 33085 Maniago (PN), İtalya

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kazımdirik Mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No:515

Bornova/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:**

Meyve enfeksiyonuna karşı:

**1.uygulama:** Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

**2.uygulama:** Havalarda yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonuna karşı: Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğine kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

**Turunçgillerde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü:** Meyveler bitki koruma ürünlü suya 3 dakika süre ile daldırılır.

**Armutta ateş yanıklığı: Çiçek dönemi uygulamaları: Tahmin-uyarı modellerinin (Maryblyt Version 4.3 veya BIS 95) uygulandığı yörelerde çiçek dönemi uygulamaları:** Kullanılan modele göre enfeksiyon riski uyarısı yapıldığında en geç 24 saat içinde ruhsatlı preparatlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçeklenme dönemi içinde ikinci bir uyarı yapıldığı takdirde ilaçlama tekrarlanmalıdır. Aksi takdirde ilaçlamalara son verilmelidir. Ayrıca kültürel önlemlerde bahsedildiği gibi, bahçe devamlı kontrol altında tutulmalı, şiddetli sürgün ve dal enfeksiyonları görüldüğünde hastalıklı kısımlar 30-40 cm aşağıdan kesilip çıkarılmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

**Tahmin-uyarı modeli uygulanmayan yörelerde çiçek dönemi uygulamaları:** Çiçeklenme başlangıcından (beyaz rozet) itibaren ılık (günlük ortalama sıcaklık 15°C ve üzeri), yağmurlu ve nemli koşullar devam ediyorsa, 5'er gün ara ile ilaçlama yapılmalıdır. Çiçek petal yapraklarının dökülmesiyle birlikte çiçek enfeksiyon riski ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak, çiçeklenme dönemi veya çiçeklenme sonrası aktif sürgün gelişiminin devam ettiği dönemde don, dolu, kum fırtınası gibi ağaçta yaralanmaya neden olan iklim olayları gerçekleşirse 18 saat içinde ilaçlama yapılmalıdır.

**Domates mildiyözü:** Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**Hıyar-Kavun kabakgillerde mildiyö:** Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

**Soğan mildiyözü:** Kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. Esas olarak günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanmalıdır.

**EUROSMART 80 WG hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.**

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

EUROSMART® 80 WG isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup P 07 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EUROSMART® 80 WG'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup P 07 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



**ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**EUROSMART® 80 WG**

**Suda Dağılabilen Granül (WG)**

|      |      |                         |
|------|------|-------------------------|
| GRUP | P 07 | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|------|------|-------------------------|

**%80 FOSETYL-AL**