

GENEL BİLGİLER:

Kullanılması:

METHOMEX 90 SP suda eriyebilir toz formülasyonda, pamuk, tütün, soya çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir. METHOMEX 90 SP ile, zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. METHOMEX 90 SP 'yi sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen üründe kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız.

Kullanıldığı Bitki Ve Zararlılar

Bitki	Zararlı	Doz Ve Dönem	Hasat ile son ilaçlama arasındaki süre (gün)
Tütün (fidelik döneminde)	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>) Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	55 g/da (nimf ve ergin)	21
Pamuk	Yeşil Kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) *	80 g/da Larva	7
Soya	Yeşil Kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	80 g/da Larva	14

* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

İlacın Hazırlanması Ve Uygulanması: İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını 1/4 veya 1/2 'ye kadar su ile doldurun. METHOMEX 90 SP 'yi ilaçlama tankına koyun, mekanik ve hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Methomex 90 SP ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Methomex 90 SP herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. METHOMEX 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsulü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri METHOMEX 90 SP yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

ÖNEMLİ: Kullanmadan önce zarfı açmayın. Tekrar kullanmayın, boş ambalajı gömün. İlacı karıştırırken, tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken Methomyl buhar ve sisine karşı korunmak için, koruyucu elbise, gözlük ve maske kullanın. Hergün temiz elbise giyin. Kullandıktan sonra, yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın. Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

BU PAKETTE SUDA ERİYEĞİLE POŞET İÇİNDE METHOMEX 90 SP MEVCUTTUR. KULLANIM SIRASINDA PAKETİ DİKKATLİCE AÇIN VE EL DOKUNMADAN, ISLATMADAN, HEMEN, POŞETİ KİSMEN SU İLE DOLU İLAÇLAMA APARATININ DEPOSUNA ATIN. POŞET AMBALAJ SUDA TAMAMEN ERİR. İLACIN ERİMESİ İÇİN KARIŞTIRMA DÜZENİNİ ÇALIŞTIRIN VE DEPOYU SU İLE TAMAMLAYIN.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. METHOMEX 90 SP

Suda Eriyebilir Toz (SP)
İnsektisit (Böcek ilacı)
% 90 Methomyl içerir.

S-methyl-N-[(methylcarbomyl)oxy] thioacetimidate

GRUP	1A	İNSEKTİSİT
------	----	------------

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ.
 - MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİĞARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE 10 GÜN SÜRE İLE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ANTİDÖTÜ VE İLK YARDIM:

ATROPİNE antiodotudur. Acil ihtiyaçlarda 0,5 mg atropine tabletleri için doktora danışın. Şüpheli zehirlenmelerde hangi şartlarda olursa olsun doktora görünün. Eğer yutulmuşsa 1-2 bardak su için ve boğazın arka tarafına doğru parmakla veya bir şeyle dokunarak kusmayı sağlayın. Hasta kimseye veya kusan kimseye ağızdan bir şey vermeyin ve doktor çağırın. Teneffüs edilmiş ise hastayı bu sahadan uzaklaştırın. Sırt üstü yatırarak sakın tutun. Hasta nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin. Şayet ikaz belirtileri görülürse (ikaz belirtileri aşağıda verilmiştir), doktor gelmeden önce 2,5 tablet (herbiri 0,5 mg.) ATROPİNE yutturulur. Bu işleme boğaz kuruyuncaya kadar her 10-15 dakikada bir devam edilir. Doktor gelinceye kadar lüzumlu miktarda içmeye devam edilir. İlacın göze bulaşması halinde göz kapağını açık tutarak hafif akan bir su ile 15 dakika boyunca yıkayınız. Deriye bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız ve gerekirse tıbbi müdahale yapınız.

DOKTORUN DİKKATİNE:

Zehirlenme belirtileri: Methomyl zehirlenmelerinde anticholinesterase aktivite ile ilgili halsizlik, baş ağrısı, bulanık görme, bulantı, mide krampları, göğüs sıkışması, göz bebeklerinin büzülmesi, adale titremesi, terleme ve nabız düşmesi gibi etkiler meydana gelir.

Tedavi: Tedavi için ATROPİNE SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1.2-2 mg dozunda 10-30 dakikada bir, iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir. Suni teneffüs veya oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer cholinesterase inhibitörlerinden hiçbiri kullanılmamalıdır. Morfin veya 2-PAM kullanmayın. Bununla beraber Methomex 90 SP ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi, ATROPİNE SÜLFAT tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ
(UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

Net Miktar :
Azami perakende satış fiyatı :

T+ Çok Toksik

N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER	Methomyl
-------------	----------

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALARI :

R23 Solunması halinde toksiktir.

R28 Yutulması halinde çok toksiktir.

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S22 Tozlarını solumayın.

S28 Cilt ile temasında derhal bol sabun ve su ile iyice yıkayın.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S63 Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

ETİKETİN DEVAMIDIR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

METHOMEX 90 SP isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için METHOMEX 90 SP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamamın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

METHOMEX 90 SP yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Methomex 90 SP ilaçlama tankına konulmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

METHOMEX 90 SP

Suda Eriyebilir Toz (SP)

İnsektisit (Böcek ilacı)

% 90 Methomyl içerir.

S-methyl-N-[(methylcarbonyl)oxy] thioacetimidate

GRUP	1A	İNSEKTİSİT
------	----	------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz. İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, nemli olmayan ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz. Boş ilaç ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız. Boş ambalajları ya da ilaç fazlasını su kaynaklarından uzak bir yerde toprağa gömünüz ya da usulüne göre imha ediniz.

İLAÇLAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ:

İlaçlamadan hemen sonra gerekli koruyucu önlemleri alarak ilaçlama aletinin pompası, hortum ve boruları, meme ve süzgeçler de dahil olmak üzere tüm parçalarını temiz su ile yıkayınız. Atık suyu akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ:

Bal arılarına, kuşlara, balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir. Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın. Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız.

ALICININ DİKKATİNE FİRMA BEYANI:

Adama Turkey bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar Flogaz'ın kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Flogaz hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. ADAMA TURKEY BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

İMALATÇISI:

Adama Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40