



## PLEMAX®

İnsektisit (Böcek İlacı)  
Süspansiyon Konsantre (SC)  
240 g/l Indoxacarb ve 80 g/l Novaluron içerir.



0,5 LT

0,10LT

0,25 LT

1 LT



Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.  
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3  
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY  
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44  
[www.adama.com/turkey](http://www.adama.com/turkey)  
[facebook.com/adamaturkiye](https://facebook.com/adamaturkiye)



## PLEMAX®

Indoxacarb

Novaluron



**Maça 2 Farkla  
Başlayın!**

Fındık kurdu tavsiyesi geldi



[ADAMA.COM/TURKEY](http://ADAMA.COM/TURKEY)



INSEKTİSİT


PLEMAX®

PLEMAX®

Maça 2 Farkla Başlayın!

## ÖZELLİKLERİ:

- İki farklı aktif maddenin karışımı ile özel olarak geliştirilmiş yenilikçi bir ürün
- Hızlı, etkin ve uzun süre etkili çözüm
- Hızlı, etkin ve uzun süre etkili çözüm
- Direnç yönetiminde avantaj sağlar



Plemax®, 80 g/l Novaluron ve 240 g/l Indoxacarb aktif maddelerinin mükemmel karışımından oluşan süspansiyon konstantre formülasyonunda geniş spektrumlu bir insektisittir.

Plemax®, elma iç kurdu, patates böceği, yeşilkurt ve domates güvesi mücadelesinde üreticilerin etkili sonuç almasını sağlar.

Plemax®, içeriğindeki iki farklı etki mekanizmasına sahip aktif maddeler ile hem kitin sentezi inhibitörü olarak çalışır ve zararlıların deri değiştirmesini engelleyerek ölümüne sebep olur, hem de sodyum iyonlarının sinir hücreleri içerisine girmesini durdurarak zararlıyı felç eder ve ölümüne sebep olur.



## KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı      | Zararlı Organizma Adı                                 | Uygulama Dozu   | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|----------------|---|-----------------|--|
| Elma           | Elma içkurdu<br>( <i>Cydia pomonella</i> )            | 20 ml/100 l su  | 28 gün                                 |
| Patates        | Patates böceği<br>( <i>Leptinotarsa decemlinata</i> ) | 20 ml/da        | 14 gün                                 |
| Armut          | Elma içkurdu<br>( <i>Cydia pomonella</i> )            | 20 ml /100 l su | 28 gün                                 |
| Pamuk          | Yeşilkurt<br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )          | 25 ml/da        | 14 gün                                 |
| Domates (Sera) | Domates güvesi<br>( <i>Tuta absoluta</i> )            | 20 ml /100 l su | 3 gün                                  |
| Zeytin         | Zeytin güvesi<br>( <i>Prays oleae</i> )               | 20 ml /100 l su | 35 gün                                 |
| Fındık         | Fındık kurdu<br>( <i>Curculio mucum L.</i> )          | 20 ml /100 l su | 35 gün                                 |

