



Traxos[®] 050 EC



Fark Atar... |



HERBİSİT

Traxos® 050 EC

Traxos® 050 EC, ekonomik öneme sahip tek yıllık dar yapraklı yabancı otları, farklı büyüme dönemlerinde ve popülasyon yoğunluklarında kontrol eder.

Dar yapraklı yabancı otlardaki, ilaçlama sonrası ana belirtiler:

- İlk olarak yapraklardan bitki içine alınır
- Büyüme hemen durur
- 2 - 3 hafta içinde sararmayı müteakip kurumalar gözlenir.

ESNEK ve KOLAY Kullanım;

Buğdayın erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprak dönemine kadar güvenle kullanılabilir.

Yüksek formülasyon kalitesi sayesinde uygulama sonrasında hızlıca bitki tarafından yaprak içine alınır ve bitki bünyesinde taşınır. Bu hem yağmura karşı dayanıklılığı artırır hem de yabancı ot kontrolünde yüksek etki sağlar.

Toprakta kalıcılığı yoktur. Bu özelliği ile bir sonraki ekimi yapılacak bitki için risk teşkil etmez.



KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Dar Yapraklı Yabancı Otlar	Uygulama Dozu
Buğday	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Karaçayır (<i>Lolium perenne</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	90 ml/da Çıkış Sonrası

Traxos® 050 EC Syngenta Türkiye firması adına ruhsatlı olup ADAMA Türkiye tarafından satılmaktadır.
Traxos® 050 EC Syngenta Türkiye firmasının tescilli markasıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

www.adama.com/turkey

facebook.com/adamaturkiye

[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Buradaki bilgiler tanıtım amaçlıdır ve zaman içerisinde eklemeler ya da değişiklikler olabilir. Bu nedenle en güncel bilgiler ürünün etiketinde olan bilgiler olduğu unutulmamalıdır.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.