

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ÇELTİK	Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dip otu (<i>Lindernia dubia</i>)	200 ml/da Ekim öncesi	-
	Baraj otu (<i>Diplachne fusca</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dip otu (<i>Lindernia dubia</i>)	150 ml/da Erken çıkış sonrası	-
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	200 ml/da Çıkış öncesi	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AQUAFIT®

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	F4, 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	--------	-----------------------------

360 g/l Clomazone

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

GENEL BİLGİLER: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

SOLUMA: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

YUTMA: Kusturmayın. Ağız iyice yıkayın. Bol su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ÇİLTLE TEMAS: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Semptomlara göre tedavi uygulayın.

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Clomazone
-------------	-----------

UYARI KELİMESİ:--

ZARARLILIK İFADELERİ

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P280: Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın

P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

• Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

• İlaçlama aletinin iyice temizlenmesini sağlayınız.

• Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.

• Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.

• Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çeltik

Ekim Öncesi: Toprak hazırlığı bittikten sonra hazırlanmış tavalara Aquafit belirtilen dozda toprak yüzeyine uygulanır. Aquafit uygulandıktan sonra su verilerek çeltik ekimi yapılır.

Erken Çıkış Sonrası: Aquafit çeltiğin 1-2 yapraklı olduğu erken çıkış sonrası dönemde suyu boşaltılmış tavalara uygulanır. İlaçlamadan sonra en geç 1-2 gün içerisinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Aquafit'in etki şekli rezidüeldir. Toprakta etkili ve yeni çıkış yapacak olan yabancı otlara etkilidir. Aquafit uygulamasından sonra çıkış yapan yabancı otlarda beyazlaşma şeklinde etkisini gösterir, bu süre 7-21 gün arasında değişmektedir.

Patates dikiminden sonra, yabancı otlar çıkış yapmadan, 1-2 gün içinde uygulanmalıdır. Toprağın keseksiz olmasına dikkat edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

AQUAFIT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre; "Grup F4, 13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **AQUAFIT** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısı aşılmamalıdır. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F4, 13 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

®ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AQUAFIT®

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	F4, 13	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	--------	-----------------------------

360 g/l Clomazone

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA

ADAMA AGAN LTD.

P.O. Box 262, Ashdod, 7710201 İsrail

ÜRETİM TESİSİ:

Sipcam S.p.A

Via Vittorio Veneto, 81-26857

Salerano sul Lambro (LO), **İtalya**

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çınarlı Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3 Kat:8/806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40