

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 26/05/2015 ve 10259

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi
Hububat	Kanavcı otu (<i>Adonis spp.</i>) Kandamlası (<i>Adonis flammea</i>) Karamuk (<i>Agrostemma githago</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Siğirdili (<i>Anchusa leptopylla</i>) Papatya (<i>Anthemis spp.</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Sürünücü çan çiçeği (<i>Campanula rapunculoides</i>) Küçük pıtrak (<i>Caucalis platycarpus</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	Kardeşlenme dönemi başlangıcında 160 ml/da
	Güneş diken (<i>Centaurea solstitialis</i>) Pelemir (<i>Cephalaria syriaca</i>) Farekulaklı boynuz otu (<i>Cerastium perfoliatum</i>) Sarı mum çiçeği (<i>Cerinth minor</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Ak hindiba (<i>Chondrilla juncea</i>) Yabani hindiba (<i>Cichorium intybus</i>) Hazeran (<i>Consolida anthoroidea</i>) Yabani karanfil (<i>Dianthus anaticolicus</i>) Avrupa dönbabası (<i>Erodium hoefftianum</i>)	Kardeşlenme dönemi sonunda 200 ml/da
	Sütleşen (<i>Euphorbia microsphaera</i>) Tarla atkuyruğu (<i>Equisetum arvense</i>) Anadolu şahteresi (<i>Fumaria kralikii</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Adi şahtere (<i>Fumaria vaillantii</i>) Turnagagası (<i>Geranium spp.</i>) Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Mürdümük (<i>Lathyrus spp.</i>) Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Yabani mürdümük (<i>Lathyrus aphaca</i>) Yabani ebegümeci (<i>Malva sylvestris</i>) Taş yoncası (<i>Melilotus indica</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çobanedeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)	Karadeniz Bölgesi'nde geç dönemde 300 ml/da (Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.)



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DİSCOLO® AMİN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUP | O | HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

500 g/l 2,4-D Aside eşdeğer 2,4 D Amin tuzu

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 14 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: İlaç ağız yoluyla alındığında kusma, ishal, reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür. Nabız hızlı atar bazı olaylarda ölüm görülebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde karaciğer ve böbreklerde hasar görülmüştür. Temas ettiği deride ve gözde arazlar belirebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

SÖLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

YUTMA: Ağız çalkalayın. Bolca su içirin. Gerekteğinde hemen tıbbi yardım alın.

ÇİLTLE TEMAS: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

GÖZLERLE TEMAS: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ: Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayınız. Gecikmiş reaksiyon olasılığına karşı medikal gözlem yapılmalıdır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)*İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Dimetilamonyum 2,4-diklorofenoksiasetat
-------------	---



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Hububat	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Muhabbet çiçeği (<i>Reseda lutea</i>) Kanarya otu (<i>Senecio vernalis</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Yemlik (<i>Tragopogon bupththalmoides</i>) Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>) Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Yavşan otu (<i>Veronica persica</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	
Mısır	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek Marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	Çıkış sonrası 200 ml/da Mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DİSCOLO AMİN isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için DİSCOLO AMİN'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O hariçi) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışma ihtiyaç duyulması halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DİSCOLO® AMİN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUP	O	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	---	----------------------------

500 g/l 2,4-D Aside eşdeğer 2,4 D Amin tuzu

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıkla zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Sebze, meyve, bağ, süs bitkileri ve diğer geniş yapraklı bitkilere fitotoksiktir.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Tatbikattan sonra ilaçlama aleti sodalı su ile iyice yıkanmalıdır.
- Tahıl dışında kültür bitkilerine zarar verebildiğinden dolayı, ilaçlı mahlül ve buharının komşu bitkilere fitotoksik etki yapmaması için çok dikkatli olunmalıdır.
- Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletler ile ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Rüzgâr hızı 16 km/h'den fazla olduğunda ilaçlamaya ara verilmelidir.
- İlaçlama yapılan günlerde hava sıcaklığı 10 °C -25 °C arası olmalıdır.
- İlaçlamadan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağması halinde ilaçlama tekrarlanmalıdır.
- Dondan veya uzun süreli kuraklıktan sonra, çiğ olduğu veya yağış beklenen kapalı havalarda, bulutlu günlerde ilaçlama yapmayınız.
- Şeker hastalarını ilaçlama işinde çalıştırmayınız.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece teslim sırasında firma garantisini altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

Adama Manufacturing Poland S.A.

Ul.Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polonya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti

Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40